

НОВЫЯ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЯ

(HEMIPTERA HETEROPTERA)

РУССКОЙ ФАУНЫ.

B. E. Яковлева.

Fam. Tingididae.

Gen. ORTHOSTIRA Fieb.

1. O. acutangula. n. sp.

Körper länglich, schmal. Unterseite, Kopf und Pronotum schwarz; Kopfdorne gelblich; Halbdecken, Processus und Pronotum-Seiten schmutzigweiss; Rippen bleichbräunlich. Fühler gelblich, Endglied braun. Pronotum-Seiten breit blattartig, mit drei Reihen irregulärer Maschen. Halsecke lang, spitz. Rückenkiele blattartig. Halsblase gewölbt. Randfeld der Decken mit zwei Reihen Maschen, Mittelfeld schmal, lanzettlich. Membran vollkommen ausgebildet. Beine gelblich. L. $2\frac{3}{4}$ mm. — Sarepta.

Туловище снизу, а также голова и переднеспинка черного цвета; надкрылья, processus и листоватые отростки переднеспинки грязноватобурьные, съ бледнобуро-ватыми ребрами клеточекъ. Усики, кромъ послѣдняго сустава, ноги и длинные головные шипы—желтоватые; послѣдний суставъ усиковъ бурый. Боковые края переднеспинки широкіе, листоватые, въ три ряда неправильныхъ клеточекъ, съ боковъ округленные; кпереди сильно вытянутые и образующіе острый уголъ, достигающій до половины головы; средній и боковые кили листоватые, въ одинъ рядъ клеточекъ; шейный пузырь приподнятый кверху, трехугольный, достигающій половины головы. Наружные края надкрыльевъ довольно широкіе, у основанія и въ концѣ въ два ряда клеточекъ, а по срединѣ только въ одинъ рядъ. Среднее поле надкрыльевъ узкое, ланцетовидное. Перепонка полная, перекрещающаяся. Все туловище продолговатое, узкое.
Дл. $2\frac{3}{4}$ мм.

Видъ этотъ ближе всего походитъ на *O. gracilis* Fieb., но отличается отъ него, и отъ всѣхъ другихъ видовъ *Orthostira*, шейными углами переднеспинки вытянутыми въ острѣ и вполнѣ образованной перепонкой.

Одинъ экземпляръ найденъ былъ А. Беккеромъ, въ окрестностяхъ Сарепты.

2. *O. paradoxa* n. sp.

Körper, Kopf, Fühlerendglied und Halsblase schwarz; Fühler, Kopfdorne und Beine rost-röthlich; Halbdecken und Pronotum schmutzig-weiss. Kopf gross, glänzend, grobpunctirt; Pronotum-Seiten vorn verschmälert, mit zwei Reihen regelmässiger Maschen; Halsblase sehr

gross, kugelförmig, glänzend, grobpunctirt; Rückenkiel blattartig niedrig, Seitenkiele kiel-förmig. Randfeld der Decken linear, mit einer Reihe Maschen. Membran fehlt. L. 2 mm.

Sarepta.

Туловище, голова, послѣдній суставъ усиковъ и шей-вый пузырь чернаго цвѣта; усики, головные шипы и ноги буроватокрасныя; надкрылья и переднеспинка грязнобѣловатыя, съ блѣднобурыми ребрами клѣточекъ. Голова большая, черная, блестящая, довольно грубо пунктированная; боковые края переднеспинки округлен-ные, листоватые, въ два ряда правильныхъ клѣточекъ, спереди постепенно съуживающіеся; вмѣсто шейнаго пузыря, въ первой половинѣ переднеспинки помѣщается особый отростокъ въ формѣ правильнаго шара, чернаго цвѣта, весьма блестящій и покрытый рѣдкимъ но силь-но развитымъ пунктиромъ. Средній киль низкій, въ одинъ рядъ очень мелкихъ клѣтокъ, боковые кили въ видѣ бѣловатыхъ кантиковъ. Наружный край надкрыль-евъ узкій, въ одинъ рядъ клѣточекъ. Надкрылья про-длговатыя, безъ перепонки. Дл. 2 мм.

Эта оригинальная форма отличается отъ прочихъ ви-довъ *Orthostira* особымъ образованіемъ шейнаго пузы-ря, имѣющаго правильный шарообразный видъ и зани-мающаго всю переднюю часть переднеспинки.

Одинъ экземпляръ изъ Сарепты, отъ А. Беккера.

Gen. *Galeatus* Curt.

Для опредѣленія видовъ этого рода, свойственныхъ русской фаунѣ, прилагаю при семъ слѣдующую таблицу:

1. Боковые кили переднеспинки листоватые, прямые. 2.
№ 1. 1880. 9

— Боковые кили листоватые, изогнутые въ видѣ чаши. 4.

2. Голова не вооруженная; наружное поле надкрыльевъ узкое, съ семью клѣтками, расположеными въ одинъ рядъ.

G. inermis Jak.

— Голова вооруженная шипами. 3.

3. Шипы на головѣ короткіе, не достигающіе конца носа; виѣшній уголъ надкрыльевъ, у основанія ихъ, тупой, широко округленный. Туловище овальное.

G. brevispinus n. sp.

— Шипы длинные, превышающіе длину головы. Виѣшній уголъ надкрыльевъ, у ихъ основанія, острый. Туловище продолговатое, съ краями надкрыльевъ параллельными.

G. Perspicuus Jak.

4. Боковые края переднеспинки въ два ряда клѣточекъ. Головные шипы бѣлаго цвѣта.

G. Komaroffii n. sp.

— Боковые края переднеспинки въ одинъ рядъ-клѣточекъ. Головные шипы черноватые. 5.

5. Туловище продолговатое, съ краями надкрыльевъ параллельными, которые образованы изъ 16 клѣточекъ сильно развитыхъ въ поперечномъ направлении. Шейный пузырь весьма маленький, такъ что вся голова остается открытой.

G. angusticollis Reut.

— Туловище овальное; въ наружномъ полѣ надкрыльевъ бываетъ отъ 7 до 11 клѣточекъ. Шейный пузырь прикрываетъ болѣе или менѣе голову. 6.

6. Шейный пузырь небольшой, достигающей только до половины головы; въ наружномъ полѣ надкрыльевъ помѣщается до 11 клѣточекъ. Переднеспинка и надкрылья безъ черныхъ пятенъ.

G. spinifrons Fall. .

— Шейный пузырь очень большой, такъ что конецъ его выдается гораздо даѣе головы. Переднеспинка и надкрылья съ черными пятнами. . . . 7.

7. Шейный пузырь одинаковой высоты съ среднимъ килемъ. Наружный край надкрыльевъ уже боковыхъ отростковъ переднеспинки и состоять изъ 6 клѣточекъ.

G. maculatus H. Sff.

— Шейный пузырь гораздо ниже средняго киля переднеспинки. Наружные края надкрыльевъ весьма широкіе, развитые болѣе чѣмъ боковые отростки переднеспинки, и состоять изъ 9 клѣточекъ.

G. decorus n. sp.

3. *G. brevispinus* n. sp.

Oberseite glasartig, weisslich, ungefleckt; Körper schwarz. Beine und Fühler roströthlich. Kopf mit fünf kurzen Stacheln besetzt. Pronotum-Seiten breit blattartig, mit vier grossen Maschen; Halsecke spitz verlängert; Seitenkiel des Pronotum aufstehend blattartig. Decken oval, am äuseren Grundwinkel breit zugerundet; Deckenrandfeld mit 8 — 9 querparallelen Maschen. L. 2 $\frac{3}{4}$ mm. — Sarepta.

Туловище чернаго цвѣта, надкрылья же и всѣ листоватые прилатки переднеспинки свѣтлые, полуупрозрачные; ноги и усики буроватокрасные, только послѣдній суставъ усиковъ на концѣ черноватый; усики и ноги покрыты длинными блѣдоватыми волосками. Голова вооружена короткими, тонкими шипами. Боковые края переднеспинки широкіе, листоватые; передній заостренный ихъ уголъ далеко выдается передъ головой; на плечевыхъ углахъ они широко закруглены; клѣтки расположены въ одинъ рядъ и ихъ не болѣе четырехъ, не имѣющихъ никакихъ пятенъ. Шейный пузырь большой овальный, далеко выдающійся надъ головой, такъ что острый конецъ его достигаетъ до третьяго сустава усиковъ; сзади онъ переходитъ въ средній киль, листовой формы, вершина котораго, если глядѣть сбоку, совершенно прямая, ровная и гораздо ниже вершины шейнаго пузыря; боковые кили листоватые, менѣе развитыя чѣмъ средніе. Какъ шейный пузырь, такъ и кили имѣютъ поперечныя ребра клѣтокъ буроваточернаго цвѣта. Наружный край надкрыльевъ у основанія глубоко вырѣзанъ и образуетъ виѣшній уголъ широко округленный; далѣе переходитъ въ широкое поле съ однимъ рядомъ поперечныхъ клѣтокъ отъ 8 до 9, съ ребрами почти параллельными; наружный край надкрыльевъ однако гораздо уже листоватыхъ прилатковъ переднеспинки и клѣтки въ немъ развиты болѣе въ продольномъ направленіи чѣмъ въ поперечномъ. Ребра клѣтокъ наружнаго поля блѣдныя, желтоватыя. Среднѣе поле надкрыльевъ высоко поднято, въ видѣ неправильнаго бугра, средина котораго образуетъ глубокую впадину; это вѣдутѣе окружено клѣтками, ребра которыхъ темнобураго, почти чернаго цвѣта. Боковые края наружнаго поля надкрыльевъ округленные. Дл. 2 $\frac{3}{4}$, мм.

Одинъ экземпляръ изъ Сарепты, отъ А. Беккера.

4. G. Komaroffii n. sp.

Körper, Kopf und Pronotum oben schwarz; Kopfdorne lang, weiss. Seitenkiel des Pronotum aufstehend, schalenförmig, Pronotum-Seiten breit blattartig mit zwei Reihen Maschen. Oberseite glasartig, weiss, ungefleckt. Beine und Fühler bleich roströthlich. L. 2 $\frac{1}{2}$, mm. — Derbent.

Голова, туловище и переднеспинка сверху черного цвета; голова вооружена длинными бълыми шипами; усики светлорыжевые, покрытые волосками; вся поверхность гладкая, безволосая, кроме киляй переднеспинки, покрытыхъ довольно длинными, стоячими волосками. Листовые части переднеспинки и надкрыльевъ — стекловидныя, полуирозрачныя. Головной пузырь большой, овальный; если глядѣть сверху, кпереди довольно сильно сдавленный съ боковъ и далеко выдающійся надъ головой. Средний киль переднеспинки высокий, выше головного пузыря, въ два ряда клѣтокъ; двѣ предпослѣднія клѣтки и ребра ихъ буроватого цвета; боковые кили очень высокіе, шарообразно выщуклые и плотно со-прикасающіеся между собой по срединѣ; мелкие клѣтки ихъ реберъ буроватыя, кроме основныхъ. Боковые края переднеспинки широкіе, листоватые, сзади округленные; передний, заостренный ихъ уголъ нѣсколько выдается передъ головой; клѣтки расположены въ два ряда; въ наружномъ, крайнемъ ряду онъ мелкія и ихъ помѣщаются отъ 7 до 8, внутренняя клѣтки крупныя, изрѣдка дѣляющіяся на двѣ. Какъ листовые края переднеспинки, такъ и надкрылья безъ пятенъ, ребра же ихъ блѣднаго буроватожелтаго цвета. Наружный край надкрыльевъ у основанія глубоко вырѣзанъ, такъ что вырѣзка эта об-

разуетъ почти прямой уголъ; далѣе наружный край переходить въ широкое поле, съ длинными, поперечными клѣтками въ одинъ рядъ, ограниченными почти параллельными ребрами; очень рѣдкіе изъ клѣтокъ раздѣлены на двѣ поперечными ребрами; всѣхъ клѣтокъ бываетъ до 10. Боковые края надкрыльевъ почти прямые, кзади слегка расширяющіеся и широко округленные на концѣ. Среднее поле надкрыльевъ слабо приподнято кверху, съ глубоко вдавленными клѣтками, ребра которыхъ окрашены въ бурый цвѣтъ. Ноги блѣдно желтоватыя. Дл. $2\frac{1}{2}$ мм., а безъ надкрыльевъ $1\frac{1}{2}$ мм.

Два экземпляра изъ окрестностей Дербента доставлены мнѣ А. В. Комаровымъ, въ честь которого мною и названъ описываемый видъ.

5. *G. decorus* n. sp.

Körper und Schenkel rothbraun, Schienbeine und Fühler roströthlich. Kopf mit fünf langen Stacheln besetzt. Glasartig, mit schwärzlichem, grossen Fleck auf den Rippen des Pronotum und Deckenrandfelde. Seitenkiele des Pronotum schmal, schalenförmig, Pronotum-Seiten breit, blattartig mit drei grossen Maschen. Decken breitoval, am äusseren Grundwinkel zugespitzt; Deckenrandfeld mit 9 Maschen. L. 3 mm. — Chwalynsk (Saratow. Guv.).

Весь стекловидный, прозрачный, съ большими черными пятнами на концахъ поперечныхъ реберъ очень широкихъ боковыхъ долей переднеспинки и надкрыльевъ. Шейный пузырь узкій, длинный, достигающій основанія третьаго сустава усиковъ; если смотрѣть въ профиль, онъ гораздо ниже средняго киля идущаго вдоль

Processus, а этотъ послѣдній почти одинаковой высоты съ боковыми килями. (У *G. maculatus* H. Sff. шейный пузырь одинаковой высоты съ среднимъ килемъ, боковые же значительно ихъ выше.) Боковые кили довольно узкіе, согнуты съ внутренней стороны въ видѣ чашки, или ложки; средній киль высокій, постепенно опускающейся кзади. Пятно съ каждой стороны пузыря, большое продолговатое пятно на боковомъ килѣ и пятно на среднемъ, а также весь задній конецъ его черноватаго цвѣта. Боковые края переднеспинки листоватые; передній шейный уголъ ихъ заостренъ, далеко выдается передъ головой и достигаетъ конца первого сустава усиковъ; сзади они широко округлены и высоко приподняты; поперечныхъ реберъ три, изъ нихъ концы двухъ первыхъ украшены продолговатыми черноватыми пятнами. Наружный край надкрыльевъ сильно вырѣзанъ у основания, такъ что образуетъ довольно острый уголъ, къ вершинѣ притупленный; крайнее поле очень широкое; стороны его параллельныя, сзади широко округленныя; поперечныхъ реберъ на немъ до девяти, считая съ двумя короткими, находящимися въ суженной части основания; изъ нихъ четыре среднихъ ребра своими концами сближаются къ наружному краю и имѣютъ общее черное пятно; всѣхъ черныхъ пятенъ на крайнемъ полѣ четыре. Среднее поле надкрыльевъ wysoko поднято и состоитъ изъ крупныхъ клѣтокъ неправильной формы, средина которыхъ вдавлена внутрь; ребра этихъ клѣтокъ несутъ узкія, темные пятна. Туловище и бедра ногъ красноватобураго цвѣта, основанія ногъ, голени и усики рыжеватые; послѣдній суставъ усиковъ черный. Голова вооружена длинными шипами. Все туловище гладкое, безволосое, только третій и четвертый суставы усиковъ покрыты длинными желтоватыми волосками. Дл. 3 мм.

Одинъ экземпляръ этого вида найденъ былъ мною въ Хвалынскомъ уѣздѣ, Саратовской губерніи, въ березовомъ лѣсу.

Gen. **Monanthia** Lep. et St. F.

(S. Gen. **Tropidochila** Fieb.)

Для отличія описываемыхъ видовъ, отъ ближайшаго къ нимъ—*M. pilosa*, прилагаю таблицу.

1. Боковой край надкрыльевъ съ однимъ рядомъ клѣточекъ. Усики краснобурые, съ весьма короткими прилегающими волосками. Боковой край переднеспинки килеватый. Щетинки рѣдкія, толстые, прямые.

M. caucasica n. sp.

— Боковой край надкрыльевъ съ двумя или тремя рядами клѣточекъ. Усики покрыты длинными стоячими волосками; боковые края переднеспинки узконінейные, листоватые. Щетинки мягкая, тонкая, густыя, съ вершинами загнутыми въ крючекъ. . . .

2.

2. Боковой край надкрыльевъ съ двумя рядами клѣтокъ. Усики чернаго цвѣта, третій суставъ ихъ въ вершинѣ красноватобураго цвѣта; волоски, покрывающіе усики, почти такой же длины, какъ и на надкрыльяхъ.

M. tenuicornis n. sp.

— Боковой край надкрыльевъ съ тремя рядами клѣтокъ. Усики рыжіе; волоски ихъ покрывающіе короче, чѣмъ на остальномъ туловищѣ.

M. pilosa Fieb.

6. *M. Caucasica* n. sp.

Körper länglich, bleichbräunlich. Oberseite dicht schuppenartig behaart und stark zerstreut beborstet. Fühler röthlichbraun, Endglied schwärzlich; Glied 3 doppelt länger als 4. Seitenrand des Pronotum kielförmig; Halsblase niedrig vorn abgestutzt. Decken schmal, Randfeld linear, mit einer Reihe viereckiger Maschen; Randkiel gelblich, Querrippen schwarz. Unterseite filzig weissbehaart, Beine roströthlich, Klauenglied und Klauen schwarz. L. 3 mm.— Derbent.

Туловище продолговатое, бледнобурое; вся наружная сторона густо покрыта прилегающими чешуйвидными волосками; все ребра переднеспинки и надкрыльевъ имъютъ кромъ того длинныя, прямостоячія, сильныя по рѣдкія щетинки. Тупые шипы на головѣ оканчиваются такими же щетинками. Усики довольно толстые, красноватобурого цвета, кромъ послѣдняго сустава, который темнобурого, почти черного цвета, съ рыжеватымъ основаниемъ; третій суставъ ихъ вдвое длиннѣе четвертаго, который въ свою очередь равняется первымъ двумъ взятымъ вмѣстѣ; усики кромъ послѣдняго сустава, покрытаго длинными бѣловатыми волосками, кажутся гладкими, вслѣдствіе того, что одѣвающіе ихъ волоски очень коротки и плотно прилегаютъ къ суставамъ. Боковые края переднеспинки въ видѣ невысокаго плотно прилегающаго ребра; средній и боковые ребра ея передъ концомъ бурыя. Шейный пузырь спереди прямо обрѣзанъ, килеватый, едва приподнятый къ верху. Надкрылья узкія, боковой край ихъ

линейный, въ одинъ рядъ клѣточекъ, правильной четырехугольной формы; наружное ребро бокового края тонкое, желтоватого цвѣта, поперечные же ребра клѣточекъ толстыя, черного цвѣта. На надкрыльяхъ и перепонкѣ неправильно раскидано нѣсколько темныхъ пятнышекъ. Нижняя сторона блѣднобурая, густо покрытая прилегающими волосками въ видѣ войлока. Брюшко темнобурое; ноги рыжеватыя, послѣдній суставъ лапокъ и когти черныя. Дл. 3 мм.

Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Дербента, полученъ мною отъ А. В. Комарова.

7. *M. tenuicornis* n. sp.

Oberseite bleich graugelb, lang bewimpert. Fühler dünn, schwarz, Glied 3 röthlichbraun, am Grunde schwärzlich, doppelt länger als 4. Seitenkiel des Pronotum linear, gerade. Deckenrandfeld schmal blattartig, mit zwei Reihen Maschen; Oberseite der Decken mit schwarzen Querstrichen. Schenkel schwarz, Schienbeine gelblich, am Grunde schwärzlich. L. $3\frac{1}{2}$ mm.—
Sarepta.

Очень походить на *M. pilosa* Fieb. Усики тонкие, черного цвѣта, третій суставъ красноватобурый, къ основанию чернѣющій; онъ вдвое длиннѣе четвертаго, который равенъ первымъ двумъ суставамъ взятымъ вмѣстѣ. Усики покрыты весьма длинными, блѣдоватыми, стоячими волосками, нѣсколько согнутыми къ переди; длина волосковъ почти такая же, какъ и на остальномъ туловищѣ. Шейный пузырь килеватый, едва приподнятый и къ переди слегка вырѣзанный; боковые края переднеспинки прямые, узколинейные; ребра ея блѣдоватыя,

отороченный съ боковъ черными полосками. Боковые края надкрыльевъ узкіе, листоватые, въ два ряда клѣточекъ; какъ по этимъ краямъ, такъ и по всѣмъ надкрыльямъ неправильно раскиданы тонкія поперечныя полоски чернаго цвѣта. Бедра чернаго цвѣта, голени желтоватыя, къ основанию постепенно темнѣющія и около сочлененій съ бедрами почти темнобурыя. Вся наружная сторона блѣднаго сѣроватожелтаго цвѣта; переднеспинка, сзади шейнаго пузыря, буроватая. Дл. $3\frac{1}{2}$, мм.

(S. Gen. **Physatochila** Fieb.).

8. **M. distinguenda** n. sp.

Körper lѣnglichoval; ganz br nlichgelb, unbehaart; F hler und Beine r thlichgelb, F hlerendglied und Kopf schwarz. Pronotum-Seiten vorn verschm lert, mit blasig aufgetriebenem Rand, Halsblase hoch, halbkugelig; R ckenkiel durchlaufend, Seitenkiele kurz. Deckenrandfeld breit, am Grunde mit zwei, am Ende mit drei Reihen irreg l rer Maschen; Rippen der Maschen fast alle schwarz. Deckenmitte, Processus-Ende und Membran-Grund schwarz. L. 4 mm. — Sarepta.

Все насѣкомое продолговатоovalной формы и буроватожелтаго цвѣта, непокрытое волосками; усики и ноги красноватожелтыя, кроме послѣдняго сустава усиковъ, который чернаго цвѣта. Голова черная, съ сильными шипами, передняя пара которыхъ сближается своими концами. Переднеспинка сильно съуженная къ переди, съ боковыми краями вздутыми, пузырчатыми, не

сближающимися между собою, такъ что средина переднеспинки остается свободной; во всю длину ея идеть срединное ребро, продолжающееся на шейный пузырь, довольно высокій и имѣющій, если смотрѣть съ боку, полукруглую форму; боковыя ребра почти параллельныя, сливающіяся впереди съ пузирчатыми краями переднеспинки; всѣ ребра ея низкія, въ видѣ канта, такъ что не образуютъ ни одного ряда клѣточекъ. Надкрылья правильно развитыя, съ широкими наружными краями, состоящими, въ основной половинѣ, изъ двухъ рядовъ, а въ задней — изъ трехъ рядовъ весьма неправильныхъ клѣточекъ, большая часть которыхъ чернаго цвѣта. Большое черноватое пятно четырехугольной формы занимаетъ средину corium, такъ что углами своими захватываетъ конецъ processus, наружные края corium и основаніе перепонки. Дл. 4 мм.

Видъ близкій къ *M. simplex* H. Sff., но отличающійся отъ послѣдняго многими существенными признаками, какъ-то: формой переднеспинки, боковыя вышукости которой не сходятся по срединѣ, а оставляютъ послѣднюю свободной, вслѣдствіе чего среднее ребро pronotum является цѣльнымъ; формою шейнаго пузыря; правильнымъ развитіемъ corium; широкимъ наружнымъ краемъ надкрыльевъ и, наконецъ, характерною окраскою.

Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Сарепты, отъ А. Беккера.

(S. Gen. *Catoplatus* Spin.)

9. *M. dilatata* n. sp.

Ganz gelbweiss, Kopf und Fühler schwarz,
Fühlerglied 3 dünn, röthlichbraun, am Ende
gelb, doppelt so lang als Glied 4, Endglied so

lang als Glied 1 und 2 zusammen. Decken breit, Randfeld mit drei Reihen kleiner Maschen. Abdomen gelb oder bräunlich. Schenkel bräunlich, Schienbeine gelblich. Füsse und Klauen schwarz. L. 4 mm.—Derbent.

Все туловище, кроме центральныхъ частей груди, и надкрылья—желтоватобѣлые. Голова, лапки и усики черного цвѣта, только третій суставъ усиковъ красноватобурый съ свѣтло желтоватой вершиной. Первый суставъ усиковъ массивный, толще всѣхъ остальныхъ, второй короче его и тоньше, третій вдвое длиннѣе послѣдняго сустава, самый тонкій, всюду ровный, только на самой вершинѣ замѣтно расширеній; съ боку этого расширения прикрѣпленъ четвертый суставъ, который равенъ по длини первому и второму суставу взятымъ вмѣстѣ. Голова черная съ тремя бѣловатыми шинами, сидящими въ передней ея части; изъ нихъ боковые вдвое длиннѣе средняго. Переднесинника кзади сильно расширенная съ тремя сильными киями, изъ которыхъ боковые доходятъ до шейнаго пузыря; этотъ послѣдний имѣеть почти полукруглую форму, съ переди прямо обрѣзанъ. Надкрылья широкія, крайнее поле ихъ состоитъ изъ трехъ рядовъ каѣточекъ. Ноги буроватыя, болѣе или менѣе свѣтлые, голени желтоватыя, иногда къ основанию темнѣющія. Брюшко бываетъ иногда буроватое, обыкновенно же свѣтло желтаго цвѣта. Да. 4 мм., ширина надкрыльевъ почти 2 мм.

Приналежитъ къ подроду *Catoplatus* Spin., небогатому видами и вообще похожъ на *M. albida*, *M. Egungii*, *M. Navipes* и *M. Olivieri*, но отличается отъ всѣхъ шириной крайняго поля надкрыльевъ и формою усиковъ, а также ихъ цвѣтомъ.

Открытъ А. В. Комаровымъ въ окрестностяхъ Дербента, въ количествѣ трехъ экземпляровъ.

Fam. Capsidae.

Gen. ORTHOTYLUS Fieb.

10. 0. *parvulus* Reut. in litt.

Ganz bleich gelblichgrün; Oberseite dicht weiss-zottig behaart. Fühler dünn, rostgelblich, Glied 3 und 4 bräunlich. Pronotum sehr kurz, fast gleichlang als der Kopf. Membran ganz bleich-bräunlich, ohne Flecken; Zellrippen und meist die Zellen rostgelblich. Beine gelblichgrün, Fussglieder bräunlich, Klauen schwarz. Schienbeindorne lang, bräunlich. L. $2\frac{3}{4}$ mm. (σ); 3 mm. (φ). — Astrachan.

Весь однообразного светлого желтовато-зеленого цвета; у сухихъ экземпляровъ голова, часть переднеспинки, щитка и ноги часто бываютъ совершенно желтаго цвета. Наружная сторона покрыта длинными, почти стоячими, блѣдоватыми волосками, очень ломкими. Перепонка однообразного блѣдно-буроватаго цвета, сильно опализывающая; иногда она бываетъ безцветная, полупрозрачная; ребра ея кѣтокъ, а часто и самыя клѣтки, буроватаго цвета. Усики нѣжные, рыжеватые, послѣдние суставы бурѣющіе и покрыты замѣтными блѣдоватыми волосками. Бедра такого же цвета, какъ и все туловище, равно какъ и голени, или покрайней мѣрѣ основаніе ихъ; лапки рыжеватыя, съ черными когтями. Голени покрыты довольно сильными буроватыми щетинками. Переднеспинка весьма короткая, почти втрое короче ширины ея заднаго края и почти равной длины съ головой. Дл. $3\frac{3}{4}$ mm. (σ), 3 mm. (φ). Астрахань, въ августѣ, на солончаковыхъ растеніяхъ; въ 1877 году найд.

день былъ мною только одинъ экземпляръ; въ 1878 же году попадались нерѣдко.

Gen. **Campylomma** Reut.

11. **C. viridula** n. sp.

Oberseite bleich bläulichgrün, glänzend, fast durchsichtig, fein braun behaart. Unterseite grün. Die Fühler sind bei den Männchen weniger stark als bei den Weibchen; ♂ — Fühler schwarz, Glied 2 stabsförmig; Glied 1 und 2 oben und 3 — 4 ganz weisslich; ♀ — Fühler dünn, bleichgelblich, Wurzelglied grün, unterseits mit schwarzem Fleck; Glied 2 am Grunde schwarz. Membran bleichbräunlich, Zellrippen bläulichgrün. Beine grünlich weiss, Schenkel dicht schwarz gesleckt, Schienbeine aus schwarzen Puncten schwarzbedornt. Brustmitte schwarz. L. 2 $\frac{1}{4}$ mm. — Astrachan, Sa-
repta.

Снизу яркозеленаго цвѣта, сверху однообразно блѣдный, голубоватозеленый, блестящій, съ полуупрозрачными надкрыльями, густо покрытый весьма нѣжными буроватыми волосками. Усики образованы и окрашены различно у самца и самки, но второй суставъ ихъ всегда на четверть короче ширины переднеспинки; у ♂ второй суставъ усиковъ массивный, одинаковой толщины по всей своей длине, весь чернаго цвѣта, равно какъ и первый суставъ; вершины ихъ и оба послѣдніе сустава блѣдоватые; у ♀ усики тонкіе, первый суставъ ихъ яркозеленаго цвѣта, съ чернымъ пятномъ на внутренней сторонѣ сустава и черной щетинкой, второй

суставъ, также какъ и слѣдующіе, блѣдно желтоватые, только у основанія втораго находится черное кольцо. Широкій центръ среднегруди блестящаго чернаго цвѣта. Перепонка блѣдоватая, опализирующая, съ слабымъ дымчатымъ оттенкомъ; мембральныя ребра такого же цвѣта, какъ и вся наружная поверхность. Ноги такого же цвѣта, какъ у *C. Verbasci* H. Sff. Дл. $2\frac{3}{4}$ мм.

Отличается отъ *C. verbasci*, къ которому близокъ, зеленымъ цвѣтомъ нижней стороны туловища, цвѣтомъ и формою усиковъ, а также однообразнымъ цвѣтомъ наружной поверхности.

Въ 1877 году найденъ мною въ Астрахани въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ; въ 1878 г., въ теченіи іюня мѣсяца, летѣли во множествѣ, по вечерамъ, на свѣтъ огня и затѣмъ нерѣдко попадались мнѣ въ Сарептѣ, въ концѣ іюня, па ветлахъ (*Salix*.)

Астрахань
23 августа 1878 г.
