

общаго цвѣта. Брюшко зеленое, съ желтыми широкими краями у живыхъ экземпляровъ, каковой цвѣтъ совершенно исчезаетъ у мертвыхъ насѣкомыхъ. Ноги грязноватожелтые, съ болѣе темными концами голеней; бедра передъ вершиной густо покрыты мелкими, черноватыми точками. Дл. $5\frac{1}{2}$ мм.

Новый видъ по общему habitus и по цвѣту туловища очень похожъ на *A. viridis* Jak., отъ котораго однако отличается съ перваго взгляда строеніемъ задней пары ногъ умѣренно развитыхъ и не вооруженныхъ шипами, а также сильными ребрами на переднеспиннѣ и щиткѣ. Отъ *A. Lethierryi* Stål отличается цвѣтомъ туловища, болѣе вытянутою его формою, болѣе узкою переднеспинкою и формою головы.

Для отличія всѣхъ трехъ видовъ *Agraphopus*, свойственныхъ русской фаунѣ, можетъ служить слѣдующая таблица:

1. Hinterbeine lang, Schenkel stark und bewehrt.

A. viridis Jak.

1. Hinterbeine von gewöhnlicher Form; Hinterschenkel unbewehrt 2

2. Körper grün. Pronotum breiter als lang. *A. ornatulus* n. sp.

2. Körper gelbbraunlich. Pronotum so lang als breit.

A. Lethierryi Stål.

Описываемый видъ найденъ мною въ Іюль 1879 г. на Кавказѣ, въ окрестностяхъ г. Петровска.

Fam. Capsidae.

10. *Trigonotylus brevipes* n. sp.

Bleichgrün, bräunlich gestreift und sehr fein schwarz behaart. Kopf kaum länger als breit, Nacken mit Querleiste. Pronotum breiter als lang, Hinterrand fein geschweift. Fühlerwurzelglied bleichgrün, kürzer als das Pronotum, schwarz an-