

цвѣта, покрытая мелкими черными точками; одна точка на носовомъ валикѣ, въ продольномъ ряду, по срединѣ головы, отъ двухъ до трехъ точекъ крупнѣе прочихъ и затѣмъ два поперечныхъ ряда на затылкѣ болѣе мелкихъ точекъ, изъ коихъ каждая несетъ черную щетинку. Усики довольно толстые первый суставъ ихъ такого же цвѣта, какъ голова съ двумя черными точками на внутренней сторонѣ; остальные суставы зеленоваторыжіе; второй суставъ равный по длинѣ третьему довольно толстый, ровный и гладкій; третій суставъ тонкій у вершины, постепенно расширяется къ основанію и съ внутренней стороны густо усаженъ длинными бѣлыми волосками, расположенными правильнымъ рядомъ, какъ у бородки пера; послѣдній суставъ гладкій, короткій, равняющійся одной трети третьяго сустава. Переднеспинка и щитокъ одноцвѣтные, безъ пятенъ, только сзади вздутій переднеспинки (bucculae) проходитъ узкая, черная полоска. Перепонка свѣтлая, полупрозрачная, съ темнобурой узкой оторочкой; ребра ея клѣтчатъ бѣловатая. Ноги желтоватозеленая, съ черными лапками; бедра покрыты черными пятнами и точками, раскиданными безъ всякаго порядка; голени также съ рѣдкими черными точками и такого же цвѣта шипиками; концы ихъ черноватые. Дл. $5\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$ мм.

Отъ *A. setulosus* Меу. описываемый видъ отличается незначительной величиной, отсутствіемъ черныхъ пятенъ на переднеспинкѣ и щиткѣ и формою усиковъ, третій суставъ которыхъ своеобразно украшенъ волосками въ видѣ пера.

Два экземпляра этого вида найдены были г. Беккеромъ подъ Сарептой.

12. *Macrocoleus tibialis* n. sp.

Ganz orangegelb, sehr fein weiss behaart. Membran durchsichtig, Zellrippen orangegelb. Fussglied am Ende, Klauen und Schienbeindorne schwarz. — Sarepta.