

Все туловище и конечности однообразнаго яркооранжевожелтаго цвѣта, покрыты очень вѣжными бѣловатыми волосками. Шипики на голеняхъ, концы лапокъ и когти чернаго цвѣта. На головѣ между глазами проходить поперечная бороздка. Второй суставъ усиковъ короче задняго края переднеспинки. Перепонка совершенно прозрачная, безцвѣтная, съ ребрами влѣтокъ такого же цвѣта, какъ и все туловище.

Очень близокъ къ *M. chrysotrichus* Fieb. и *M. aurantiacus* Fieb., но у перваго вида шипики на голеняхъ буроватожелтые, а у втораго поверхность покрыта черными волосками.

Найденъ г. Беккеромъ подъ Сарептой.

13. *Plagiognatus rufinervis* n. sp.

Ganz rostbräunlich, Kopf braun, Stirnschwiele schwarz, Nacken mit 2 Flecken. Fühler roströthlich, Glied 1 ganz, Glied 2 am Grunde ringförmig schwärzlich. Pronotum gelbbraun, Vorderrand kielförmig, weisslich; Bucculae quer, schwarz. Kopf und Pronotum glänzend. Schildgrundwinkel mit röthlichem Fleck. Corium am Ende weisslich, Cuneus und Zellrippen röthlich; Membranzelle bleich bräunlich. Beine roströthlich, Schenkel unten grob braun punctirt, Schienbeine sehr fein schwarz punctirt und stark bedornt, Schienbeinende und Füße schwärzlich. L. 3 mm. — Sarepta.

Весь буроваторыжій. Голова темнобурая, носовой валикъ черный, на затылкѣ два свѣтлыхъ пятна, сливающихся между собою. Усики рыжіе, первый суставъ ихъ и кольцо у основанія втораго — черноватые; второй суставъ значительно длиннѣе задняго края переднеспинки, послѣдняя желтоватобурая, передній килеватый край ея свѣтлѣе, почти бѣловатый; вздутія переднеспинки (bucculae) сливаются въ одно общее ши-