

Черный, полублестящій, покрытый серебристобѣлыми короткими волосками въ видѣ чешуекъ и длинными черными щетинками. Усики черного цвѣта, первый суставъ ихъ блѣднобуроватожелтый, равняющійся половинѣ длины головы, покрытый нѣжными, рѣдкими, черноватыми волосками; за ними же, но болѣе длинными волосками покрыты и остальные суставы, но на второмъ они гуще расположены, чѣмъ на прочихъ; усики вообще тонкіе, такъ что второй не толще перваго, послѣдніе же два нитевидные. Хоботокъ рыжій, кромѣ послѣдняго сустава, который черного цвѣта. Переднеспинка покрыта нѣжными поперечными морщинками. На задней части щитка проходитъ замѣтное тупое ребро. Надкрылья полныя, значительно длиннѣе туловища, перепонка темнобурая, одноцвѣтная, съ черными ребрами клѣтокъ. Во внѣшнемъ углу надкрыльевъ, при ихъ основаніи, проходитъ желтая полоска; ноги рыжія, только основаніе задней пары, концы голеней и лапки черного цвѣта; бедра, особенно задней пары, покрыты рядами черныхъ, довольно рѣдко раскиданныхъ точекъ. Дл. 6 мм.

Два экземпляра этого вида получены мною изъ окрестностей Владивостока.

### 3. *Camptotylus Reuteri* n. sp.

Grün, bleich marmorirt und weiss gesprenkelt; Halbdecken anliegend fein weisslich behaart. Fühler dünn, länger als der Körper, grünlich; Wurzelglied länger als der Kopf, am Grunde bräunlich, ein Mittelpunkt innen schwarz, Glied 2 drei oder viermal länger als 1, am Grunde schmal schwarz, ein Mittelring braun. Halbdecken grünlichweiss, Mittelbinde und Cori-