

4. *C. aphidoides* n. sp.

Körper schmal, parallel, grün, weiss gesprenkelt. Oberseite fein schwarz behaart. Fühler viel länger als der Körper, grünlichgelb; Wurzelglied (♀) länger als der Kopf und Pronotum zusammen, ganz schwarz, Glied 2 am Grunde schmal schwarz, am Ende bräunlich. Halbdecken grün, in dem Hinterwinkel des Corium ein mattschwarzer Punct. Beine grünlich, schwarz punctirt und bedornt; Schenkel oberseits mit durchlaufenden schwarzen Streifen; Füße schwarz. L. 3 mm. — *Petrowsk.*

Туловище узкое, съ краями почти параллельными, зеленого цвѣта; на головѣ и переднеспинкѣ нѣсколько симметрическихъ пятенъ и точекъ почти бѣлаго цвѣта, пропадающихъ у сухихъ экземпляровъ. Усики (♀) почти въ два раза длиннѣе всего туловища, зеленоватожелтые; первый суставъ ихъ длиннѣе головы и переднеспинки вмѣстѣ взятыхъ, весь черного цвѣта; второй суставъ въ два съ половиною раза длиннѣе перваго, съ черноватымъ кольцомъ у основанія и бурой вершиной; послѣдніе суставы бурые; изъ нихъ третій усаженъ съ нижней стороны длинными стоячими волосками, въ видѣ бородки пера. У ♀ усики гораздо тоньше и короче, такъ что первый суставъ нѣсколько короче переднеспинки и головы, взятыхъ вмѣстѣ, а третій суставъ не имѣетъ перистыхъ волосковъ. Надкрылья зеленого цвѣта съ большимъ чернымъ пятномъ у мембранальнаго шва. Перепонка свѣтлая, прозрачная, сильно опализирующая, ребра ея блѣднозеленоватыя, оттѣненные бурымъ какъ съ внутренней, такъ и съ внѣшней стороны; конецъ перепонки съ широкой, бурой полосой. Какъ