

надкрылья, такъ и остальная поверхность покрыты черными волосками, очень ломкими. Ноги зеленныя, кромѣ лапокъ, которыя чернаго цвѣта, голени покрыты большими черными точками и такого же цвѣта длинными щетинками; бедра съ верхней и нижней стороны съ черными продольными полосами, а съ внѣшней стороны съ нѣсколькими черными точками; по верхнему краю идетъ рядъ черныхъ щетинокъ. Дл. около 3 мм., шир. $\frac{3}{4}$ мм.

Въ окрестностяхъ Петровска, на Кавказѣ, изрѣдка, въ теченіе Іюля на *Tamarix*, вмѣстѣ съ личинками во всѣхъ стадіяхъ развитія.

5. *Orthotylus Elcagni* n. sp.

Bleich bläulichgrün, ziemlich dicht weisslich-behaart. Fühlerglied 2 um $\frac{1}{4}$ länger als Hinterrand des Pronotum; Augen gross, gewölbt (♂). Cuneus am Grunde mit orangegelbem Fleck. Membran glashell, Zellrippen grünlich. L. 4 — $4\frac{1}{2}$ mm. — *Petrowsk (Kaukasus)*.

Однообразнаго, весьма блѣднаго голубоватозеленаго цвѣта, довольно густо покрытый короткими бѣловатыми волосками. Самцы отличаются отъ самокъ крупными, очень выпуклыми глазами и нѣсколько болѣе утолщенными усиками, второй суставъ которыхъ только на четверть длиннѣ задняго края переднеспинки. Перенонка безцвѣтная, полупрозрачная, иногда къ концу съ буроватымъ оттѣнкомъ; ребра ея, а также все поле окруженное этими ребрами такого же зеленоватаго цвѣта, какъ и все туловище. На cuneus, у основанія его, оранжевое пятно. Голени съ бѣлыми шипиками; концы голеней и лапокъ, а также когти желтоваты. Сухіе