

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАУНЫ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХЪ РОССИИ И СОСѢДНХЪ СТРАНЪ.

B. E. Яковлева.

## V.

### ОПИСАНИЕ НОВЫХЪ ВИДОВЪ ИЗЪ СЕМ. Capsidæ.

#### 1. *Calocoris albonotatus* n. sp.

Ganz mattschwarz, fein gräulich behaart. Wurzelglied der Fühler hellbraun, Glied 2 schwarz, allmälig verdickt, Glied 3 braun, am Grunde gelbröthlich. Schnabel schwarz. Pronotum und Schild schwarz, gewölbt, sehr fein querunzeilig; Vorderrandkiel des Pronotum weiss. Halbdecken schwarz, Corium-Mitte und Clavusgrund mit weisslicher Querbinde; Membran braun, Rippen schwarz. Beine schwarz, Schenkelende und Füsse roströthlich, Schienbeine schwarzbraun. L. 7 $\frac{1}{2}$ , mm. — N. Persien.

Весь черный, матовый, покрытый нѣжными сѣроватыми волосками. Первый суставъ усиковъ свѣтлобурый, къ вершинѣ постепенно темнѣющій, второй суставъ чернаго цвѣта, постепенно и замѣтно утолщающійся къ

вершина, третий суставъ бурый съ свѣтлоказнымъ основаніемъ. Хоботокъ чернаго цвѣта. Переднеспинка сильно выпуклая, особенно въ задней своей половинѣ, весьма нѣжно поперечноморщиноватая, полого вырѣзанная передъ щиткомъ и съ боковыми краями почти прямыми, тонкое шейное кольцо бѣлаго цвѣта. Щитокъ черный, весьма нѣжно поперечноморщиноватый, сильно выпуклый, съ глубокой поперечной бороздкой у основанія и съ тупымъ, округленнымъ концомъ. Clarus чернаго цвѣта, согнутъ черный же съ двумя поперечными бѣльми полосами по срединѣ, которыя отъ наружнаго края идутъ внутрь нѣсколько вкось и внизъ до шва отдѣляющаго clarus; cuneus черный, широкое основаніе его образуетъ поперечную полосу желтоватобѣлаго цвѣта. Перепонка одноцвѣтная, темнобурая, вся весьма мелкоструйчатая, кромѣ клѣтокъ, которыя ограничены черными ребрами. Ноги чернаго цвѣта, бедра рыжевато-красныя, лапки, кромѣ послѣдняго сустава и когти рыжеватыя; голени темнобурыя, почти черныя. Дл.  $7\frac{1}{2}$  мм.

Одинъ экземпляръ найденъ былъ Г. Ф. Христофоромъ на южномъ берегу Каспійскаго моря.

## 2. *Orthocephalus funestus* n. sp.

Schwarz, silberweiss schuppenartig behaart und schwarz beborstet. Fühler sehr dünn, schwarz, fein zerstreut, schwärzlich behaart, Wurzelglied halb so lang als der Kopf, bleich-bräunlichgelb; Schnabel rostgelb, Endglied schwarz. Pronotum fein querrunzelig. Membran ganz schwarzbraun, Rippen schwarz, Beine rostgelb, Schenkel zerstreut schwarz punc-tiert. — *Vladivostok.*

Черный, полублестящий, покрытый серебристобѣльми короткими волосками въ видѣ чешуекъ и длинными черными щетинками. Усики чернаго цвѣта, первый суставъ ихъ блѣднобуроватожелтый, равняющійся половинѣ длины головы, покрытый вѣжными, рѣдкими, черноватыми волосками; за ними же, но болѣе длинными волосками покрыты и остальные суставы, по на второмъ они гуще расположены, чѣмъ на прочихъ; усики вообще тонкие, такъ что второй не толще первого, послѣдніе же два нитевидные. Хоботокъ рыжій, кромѣ послѣдняго сустава, который чернаго цвѣта. Переднеспинка покрыта вѣжными поперечными морщинками. На задней части щитка проходитъ замѣтное тупое ребро. Надкрылья полныя, значительно длиннѣе туловища, перепонка темнобурая, одноцвѣтная, съ черными ребрами клѣтокъ. Во вѣнчномъ углу надкрыльевъ, при ихъ основаніи, проходитъ желтая полоска; ноги рыжія, только основаніе задней пары, концы голеней и лапки чернаго цвѣта; бедра, особенно задней пары, покрыты рядами черныхъ, довольно рѣдко раскиданныхъ точекъ. Дл. 6 мм.

Два экземпляра этого вида получены мною изъ окрестностей Владивостока.

### 3. *Camptotylus Reuteri* n. sp.

Grün, bleich marmorirt und weiss gesprenkelt; Halbdecken anliegend fein weisslich behaart. Fühler dünn, länger als der Körper, grünlich; Wurzelglied länger als der Kopf, am Grunde bräunlich, ein Mittelpunct innen schwarz, Glied 2 drei oder viermal länger als 1, am Grunde schmal schwarz, ein Mittelring braun. Halbdecken grünlichweiss, Mittelbinde und Cori-

umende dunkelgrün, oder gelbgrün; Cuneus grün, am Grunde grünlichweiss, in dem Hinterwinkel des Corium ein matt schwarzer grosser Punct. Membran weisslich, durchscheinend, die Zellen grünlichweiss; ein Fleck im Hinterwinkel der grossen Zelle und Membranende bräunlich; in der Mitte ein schwarzbrauner querer Randfleck. Beine grünlich, schwarz punctirt und bedornt; Hinterschenkel oberseits sehr grob schwarz punctirt-gefleckt, fast marmorirt.

Schienbeine grünlichweiss, Klauenglied am Ende und Klaue—schwarz. L. 2 mm.—*Astrachan, Sarepta.*

Зеленый, съ различными пятнами и полосками болѣе свѣтлыхъ оттѣнковъ. На головѣ и переднеспинкѣ нѣсколько парныхъ пятенъ блѣднозеленоватаго, почти бѣлаго цвѣта, выступающихъ весьма рѣзко у живыхъ экземпляровъ. Усики зеленоватые, тонкіе, длиннѣе всего туловища; первый суставъ толще прочихъ и длиннѣе головы, такого же яркозеленаго цвѣта, какъ и все туловище; основаніе его буроватое, посрединѣ же съ внутренней стороны находится черное пятно въ формѣ полукольца, которое несетъ черный шипъ; второй суставъ болѣе чѣмъ втрое длиннѣе первого, блѣднозеленоватый, къ вершинѣ нѣсколько бурѣющій; у основанія его узкое черное кольцо; такое же кольцо, только бураго цвѣта, находится и посрединѣ этого сустава; послѣдніе два сустава блѣднобуроватозеленые. Щитокъ зеленый съ блѣдоватыми пятнами въ основныхъ углахъ. Надкрылья блѣднозеленоватыя (почти блѣдоватыя у сухихъ экземпляровъ); на этомъ фонѣ болѣе темный зе-

леный цвѣтъ образуетъ двѣ широкихъ поперечныхъ полосы, одну на концѣ *cogium*, передъ *cuneus*, а другую посерединѣ, которая захватываетъ и заднюю часть *clavus*. Между этими полосами раскидано нѣсколько пятнышекъ, такого же цвѣта. Иногда темнозеленый цвѣтъ рисунковъ замѣняется желтоватозеленымъ. *Cuneus* у основания зеленоватобѣлый, а задняя его половина ярко-зеленая. На концѣ *cogium*, возлѣ средины мембранныаго шва, помѣщается матовочерное круглое небольшое пятнышко (или, вѣрнѣе, крупная точка). Надкрылья покрыты прилегающими бѣловатыми волосками. Перепонка свѣтлая, прозрачная (у живыхъ съ зеленоватымъ оттенкомъ); ребра ея клѣтокъ бѣловатыя или блѣдновеленоватыя; вѣнчній уголъ большой клѣтки, также какъ и широкій конецъ перепонки—буроватые, на вѣнчнемъ краю перепонки, ниже *cuneus*, помѣщаются поперечное темнобурое пятно—иногда четырехугольной формы, иногда болѣе или менѣе полуокруглое; пятно это всегда рѣзко выражено. Брюшко сверху и снизу, также какъ и вся нижняя сторона туловища, зеленая. Ноги зеленоватыя, голени свѣтлѣе, у задней пары почти бѣлые; бедра и голени всѣхъ паръ ногъ покрыты черными точками и сильными черными же шипиками. Бедра задней пары очень развитыя, сплющенныя съ боковъ; на наружной и верхней сторонѣ ихъ крупныя черные пятна такъ густо расположены, что сливаясь между собою образуютъ черную сѣтку; верхняя сворона бедръ несетъ рядъ черныхъ шипиковъ. Лапки сильныя, конецъ послѣдняго сустава и когти чернаго цвѣта. Дл. 2 мм.

Во множествѣ осенью на Ташагіхъ, въ Астрахани, Сарептѣ и въ окрестностяхъ Петровска (на Кавказѣ.)

4. *C. aphidoides* n. sp.

Körper schmal, parallel, grün, weiss gesprenkelt. Oberseite fein schwarz behaart. Fühler viel länger als der Körper, grünlichgelb; Wurzelglied (♀) länger als der Kopf und Pronotum zusammen, ganz schwarz, (Glied 2 am Grunde schmal schwarz, am Ende bräunlich. Halbdecken grün, in dem Hinterwinkel des Corium ein mattschwarzer Punct. Beine grünlich, schwarz punctirt und bedornt; Schenkel oberseits mit durchlaufenden schwarzen Streifen; Füsse schwarz. L. 3 mm. — Petrowsk.

Туловище узкое, съ краями почти параллельными, зеленаго цвѣта; на головѣ и переднеспинкѣ нѣсколько симметрическихъ пятенъ и точекъ почти бѣлаго цвѣта, пропадающихъ у сухихъ экземпляровъ. Усики (♀) почти въ два раза длиннѣе всего туловища, зеленоватожелтые; первый суставъ ихъ длиннѣе головы и переднеспинки вмѣстѣ взятыхъ, весь чернаго цвѣта; второй суставъ въ два съ половиною раза длиннѣе первого, съ черноватымъ кольцомъ у основанія и бурой вершиной; послѣдніе суставы бурые; изъ нихъ третій усаженъ съ нижней стороны длинными стоячими волосками, въ видѣ бородки пера. У ♀ усики гораздо тоныше и короче, такъ что первый суставъ нѣсколько короче переднеспинки и головы, взятыхъ вмѣстѣ, а третій суставъ не имѣть церистыхъ волосковъ. Надкрылья зеленаго цвѣта съ большимъ чернымъ пятномъ у мембранныаго шва. Переонка свѣтлая, прозрачная, сильно опализывающая, ребра ея блѣдиозеленоватыя, оттѣненныя бурымъ какъ съ внутренней, такъ и съ виѣшней стороны; конецъ переонки съ широкой, бурой полосой. Какъ

надкрылья, такъ и остальная поверхность покрыты черными волосками, очень ломкими. Ноги зеленые, кромъ лапокъ, которыя черного цвѣта, голени покрыты большими черными точками и такого же цвѣта длинными щетинками; бедра съ верхней и нижней стороны съ черными продольными полосами, а съ виѣшней стороны съ нѣсколькими черными точками; по верхнему краю идеть рядъ черныхъ щетинокъ. Дл. около 3 мм., шир.  $\frac{3}{4}$  мм.

Въ окрестностяхъ Петровска, на Кавказѣ, изрѣдка, въ теченіе Іюля на Тамагихъ, вмѣстѣ съ личинками во всѣхъ стадіяхъ развитія.

### 5. *Orthotylus Eleagni* n. sp.

Bleich bläulichgrün, ziemlich dicht weisslich-behaart. Fühlerglied 2 um  $\frac{1}{4}$ , länger als Hinterrand des Pronotum; Augen gross, gewölbt(♂). Cuneus am Grunde mit orangegelbem Fleck. Membran glashell, Zellrippen grünlich. L. 4— $4\frac{1}{2}$  mm. — Petrowsk (Kaukasus).

Однообразнаго, весьма блѣднаго голубоватозеленаго цвѣта, довольно густо покрытый короткими блѣдоватыми волосками. Самцы отличаются отъ самокъ крупными, очень выпуклыми глазами и нѣсколько болѣе утолщенными усииками, второй суставъ которыхъ только на четверть длиннѣе заднаго края переднеспинки. Перенонка безцвѣтная, полупрозрачная, иногда къ концу съ буреватымъ оттенкомъ; ребра ея, а также все поле окруженнное этими ребрами такого же зеленоватаго цвѣта, какъ и все тулowiще. На cuneus, у основанія его, оранжевое пятно. Голени съ бѣлыми шипиками, концы голеней и лапокъ, а также когти желтоватые. Сухie

экземпляры значительно измѣняютъ свой первоначальный цвѣтъ и впадаютъ то въ желтоватозеленый, то въ желтый, причемъ мембранныя клѣтки и ребра ихъ дѣлаются почти безцвѣтными. Дл. 4 — 4 $\frac{1}{2}$  мм.

Видъ этотъ стоитъ ближе всего къ *O. diaphanus* Kirb., но отличается отъ него цвѣтомъ туловища и надкрыльевъ, окрашенными мембранными клѣтками, пятнами на cuneus и болѣе короткимъ вторымъ суставомъ усиковъ.

Въ окрестностяхъ Петровска (на Кавказѣ) нерѣдко, въ теченіе Июня и Июля на *Eleagnus angustifolius*, вмѣстѣ съ личинками въ разныхъ степеняхъ развитія.

VI.

## НОВЫЙ ВИДЪ ИЗЪ р. *Heterogaster* Schill.

Въ европейской фаунѣ извѣстны четыре вида *Heterogaster*; въ настоящей замѣткѣ предлагается описание нового, пятаго вида, свойственнаго средиземноморской области, именно южному берегу Каспійскаго моря.

Для отличия всѣхъ видовъ *Heterogaster* между собою, можетъ служить слѣдующая табличка:

1) Fühler ganz schwarz; alle Schenkel schwarz, ihre Enden weissgelblich. Oberseite sehr fein behaart.

*H. Nepetae* Fieb.

- 1) Fühler verschiedenfarbig. . . . . 2  
 2. — Alle Schenkel schwarz; Fühler schwarz, Glied 2 ganz, Wurzelglied am Ende, Glied 4 am Grunde und Ende—röhlichgelb; Schienbeine schwarz, mit zwei gelblichweissen breiten Mittelringen. Oberseite sehr fein behaart. . . . . *H. semicolon* Fieb.

2. — Schenkel, besonders die mittleren und hinteren, gelbweiss, oder rostgelblich, schwarzgefleckt. . . . 3.

3. — Oberseite lang weisslich behaart; Fühler roströthlich, Wurzelglied schwarz. . . . *H. Urticae* Fab.

3. — Oberseite fein, kurz behaart. . . . . 4.

4. — Schienbeine gelb, am Grunde mit breitem schwarzen Ring, vor dem Ende bräunlich. Fühler dünn, Wurzelglied schwarz, oben gelb, Glied 2 — 3 gelb, am Grunde und oberen Hälfte schwarz. Oberseite anliegend behaart.

*H. Artemisiae* Schill.

4. — Schienbeine gelbweisslich, mit drei schmalen, schwarzen Ringen. Fühler ziemlich dick, Fühlerglieder bräunlich, am Grunde schwärzlich, Wurzelglied schwarz, oben bräunlich. Oberseite fein abstehend behaart.

*H. distincta* n. sp.

**Heterogaster distincta** n. sp.

Kopf, Vordertheil des Pronotum, Schild und Hinterleib schwarz. Schenkel weissgelblich, Endhälften oben schwarz; Schienbeine gelbweisslich, am Grunde, in der Mitte und am Ende ein schwarzer Ring. Fühler stark, Fühlerglieder bräunlich, am Grunde allmälig schwärzlich, Glied 1 schwarz, oben bräunlich. Connexivum weisslich, am Grunde schwarz. Schildrand und Spitze weisslich. L.  $5\frac{1}{2}$  mm. —  
*Schachrud* (Persien).

Описываемый видъ и по общему habitus, и по величинѣ очень похожъ на *H. artemisiae*, но отличается отъ послѣдняго нѣсколькими существенными признаками, главнѣйшіе изъ которыхъ указаны выше. Кромѣ

того, переднеспинка *H. distincta* короче и шире, чѣмъ у *H. artemisiae*, пунктиръ же на задней ея половинѣ рѣже и грубѣе; надкрылья безъ чернаго пятна во внутреннемъ углу сорium и хоботокъ весь бѣловатый, кроме конца послѣдняго сустава.

Одинъ экземпляръ этого вида былъ найденъ Г. Ф. Христофоромъ въ 1878 г., въ Шахрудѣ.

## VII.

### О р. *Enoplops* Am. Serv. РУССКОЙ ФАУНЫ.

Въ фаунѣ Россіи до сихъ поръ извѣстны лишь три вида этого рода, которые всѣ относятся къ группѣ съ короткими шипами на головѣ, у основанія усиковъ. Только одинъ изъ видовъ этого, вообще небогатаго представителями, рода, именно *E. Scapha* Fab. можетъ быть отнесенъ къ числу общераспространенныхъ, хотя и онъ всюду встрѣчается рѣдко и обыкновенно по одиночкѣ, остальные же, сколько извѣстно, занимаютъ ограниченную площадь распространенія; такъ *E. discigera* Kti., встрѣчается только на Кавказѣ (нахожденіе этого вида въ Восточной Сибири я считаю сомнительнымъ), а *E. Heinzii* Osch. въ Туркестанскомъ краѣ.

При осмотрѣ коллекціи Э. А. Эверсмана, принадлежащей нынѣ Русскому Энтомологическому Обществу въ Петербургѣ, мною была найдена новая форма этого рода, принадлежащая къ свойственной Россіи группѣ съ короткими шипами на головѣ, происходящая изъ Зонгаріи, безъ болѣе точнаго обозначенія мѣстности; описание этой формы здѣсь предлагается.

#### *Enoplops Eversmanni* n. sp.

Körper schmutzig röthlichbraun, fein gekörnt.  
Fühler schwärzlich, Wurzelglied graubraun,

Glied 2 ganz, 3 am Grunde braunroth schwarz-punctirt. Pronotum-Seiten und Halbdecken-Rand am Grunde weissgelblich. Connexivum bräunlich, schwarz punctirt und rostgelblich quer gefleckt, fast marmorirt. Bauch oben rostgelb, ohne Flecken; Körper unten und Beine bleich lehmfarbig, stellenweise fein schwarz punctirt. Kopf fast so breit als lang. Fühlerglied 1 kaum länger als der Kopf und so lang als Glied 3, Glied 2 fast  $\frac{1}{3}$  so lang als 1; Glied 2 und 3 geflügelt erweitert. Fühlerhöcker sehr klein. L. 12 mm. — *Songarei* (Eversmann).

Туловище продолговато-овальное. Голова съ краями параллельными, почти одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ширину; шипикъ у основанія усиковъ небольшой, нѣсколько загнутый кверху; на концѣ носа находится до четырехъ такихъ же шиповъ расположенныхъ въ одинъ рядъ. Первый суставъ усиковъ трехгранный, нѣсколько изогнутый, длиннѣе головы, второй на  $\frac{1}{3}$  длиннѣе первого, листоваторасширенный отъ самаго основанія, къ вершинѣ нѣсколько съуживающійся и на концѣ вырѣзанный; третій нѣсколько болѣе расширенный, на вершинѣ косо срѣзанный, одинаковой длины съ первымъ; послѣдній суставъ, значительно меньше прочихъ, веретенообразной формы. Переднеспинка сильно съуженная кпереди, съ выдающимися въ видѣ шиповъ шейными углами; боковые края ея кпереди глубоко вырѣзаны, плечевые углы широко округленные. Щитокъ равносторонний. Надкрылья равной длины съ брюшкомъ, боковые края котораго немного выдаются изъ-подъ надкрыльевъ. Туловище грязнаго, красновато-бураго цвѣта, мелкозернистое. Боковые края головы, переднеспинки и основанія надкрыльевъ бѣловатожел-

ты; голова сверху съ черноватыми полосками, также какъ передняя часть переднеспинки и плечевые углы. Connexivum буроватый, окраины его и пялсныя пятна посерединѣ рыжеватыя. Усики черноватые, первый суставъ съроватобурый, второй и основаніе третьаго буроватокрасные съ черными пятнами; съ внутренней стороны усики окрашены свѣтлѣе. Брюшко сверху оранжеваго цвѣта, безъ пятенъ. Туловище снизу и ноги блѣднобуроватые; одноцвѣтныя, только на бедрахъ замѣтны слабые, буроватые пятна въ видѣ колецъ; послѣдній суставъ лапокъ и когти темнобурые. Дл. 12 мм., шир. 5 мм.

Видъ этот по цвѣту туловища и величинѣ похожъ на *E. Scapha*, а по формѣ усиковъ на *E. Heinzii*, отличаясь отъ послѣдняго короткою головою; цвѣтомъ брюшка, отсутствіемъ черныхъ пятенъ которыхъ у *E. Heinzii* покрываютъ всю наружную поверхность туловища и ноги, а также менѣе выдающимся connexivum. Для отличія новаго вида отъ прежде известныхъ можетъ служить слѣдующая табличка:

1. — Fühlerglied 2 von gewöhnlicher Form, Glied 3 nach oben erweitert; Wurzelglied kürzer als der Kopf.

E. Scapha Fab.

2. — Fühlerglied 3 ganz erweitert. . . . . 3

2. — Fühlerglied 3 spatelförmig, am Grunde dünn.

*E. discigera* Kti.

**E. discigeru**: Kt.

3. — Bauch oben rostgelb; Kopf so breit als lang.

*E. Eversmanni* n. sp.

**3. Bauch oben schwarz; Kopf viel länger als breit.**

E. Heinzii Osch.

VIII.

НОВЫЕ ВИДЫ РУССКО-АЗИАТСКОЙ ФАУНЫ.

1. *Strachia conspicua* n. sp.

Körper länglichoval, oben schwarzgrün metallisch, unten gelblichweiss. Kopf dreieckig, vorn sehr verschmälert und länger als breit; Jochstücke vorstehend, weiss gerandet; Kopf mit solchem Flecke vor den Augen und im Nacken. Fühler schwarz, Glied 2 fast doppelt länger als 3. Schnabel gelblichweiss, Endglied schwarz. Pronotum vorstehend. Schild schwarz, Seitenfleck und Mittellinie weisslich, die Spitze orangegelb; Seitenfleck oben hakenförmig. Halbdecken schwarz, Randfeld breit weiss, in der Mitte des Corium ein weisslicher Fleck, Corium-Ende weiss und orange mit schwarzem Flecke. Membran metallischgrün, weiss gesäumt. Bauch oben orangegelb, am Ende schwarz; Connexivum weiss, mit kleinen Grundflecken. Bauchseiten mit schwarzem Querstrich auf jeder Stigma; ein Randfleck im Grundwinkel jeder Schiene—schwarz, klein. Beine weisslich mit schwarzen Streifen, die Füsse schwarz. L. 5½—7 mm.—*Bik-Baula* (Kirgisen-Steppe).

Сверху черного цвета, съ слабо-блестящимъ, металлически-синеватозеленымъ отливомъ, снизу светлого, желтовато-белого цвета. Голова трехугольной формы, кпереди значительно суженная и несколько более развитая въ длину, чѣмъ въ ширину; скапловые отростки

съ боковъ сильно приподняты кверху; голова, взятая съ глазами вмѣстѣ, шире передняго края переднеспинки. Снизу голова вся бѣловатая, кромѣ черной полоски вдоль сколовыхъ пластинокъ (*bucculae*), сверху чернаго цвѣта, съ сильно развитымъ бѣлымъ рисункомъ, именно: окраины сколовыхъ отростковъ какъ съ внѣшней, такъ и съ внутренней стороны, продолговатоовальное пятно на затылкѣ, достигающее иногда конца носа (*tylus*), окраины глазъ и косая выпуклая полоска идущая отъ передняго края сложныхъ глазъ къ простымъ глазкамъ—бѣловатаго цвѣта. Усики черные, причемъ второй суставъ почти вдвое длиннѣе третьяго и нѣсколько длиннѣе четвертаго. Хоботокъ желтовато-бѣлаго цвѣта, послѣдній суставъ черный. Переднеспинка длиннѣе кпереди съуженная, съ боковыми краями прямыми, завороченными кверху; черная средина ея раздѣляется широкой продольной полосой бѣлаго цвѣта, иногда не достигающей передняго края и болѣе узкой поперечной полоской такого же цвѣта; кромѣ того въ переднемъ углу переднеспинки на черномъ фонѣ помѣщается бѣлое изолированное пятно; у многихъ экземпляровъ бѣлый цвѣтъ преобладаетъ надъ чернымъ и тогда послѣдній остается лишь въ видѣ полосъ вдоль передняго и бокового краевъ переднеспинки и двухъ небольшихъ пятенъ посерединѣ. Щитокъ черный, съ оригинальнымъ расположениемъ бѣлаго рисунка, сразу отличающаго этотъ видъ отъ всѣхъ прочихъ, а именно: вдоль щитка идетъ полоска бѣлаго цвѣта, сливающаяся съ оранжево-бѣлымъ концомъ щитка; по бокамъ щитка идутъ довольно широкія полоски, загибающіяся въ углахъ щитка внутрь въ формѣ удочекъ; у экземпляровъ съ болѣе развитымъ бѣлымъ рисункомъ, боковые полосы сливаются, передъ широкими бѣлыми концами щитка, съ продольной полосой, образуя ниже

мѣста своего соединенія два небольшихъ черныхъ пятнышка. Рисунокъ надкрыльевъ очень похожъ на рисунокъ у *S. picta*, съ тою только разницею, что у описываемаго вида вдоль вѣшняго края clavis проходитъ всегда болѣе или менѣе широкая полоса бѣлого цвѣта. Перепонка съ сильнымъ металлически-зеленымъ отливомъ и широкой бѣлой оторочкой. Брюшко сверху оранжевое, на концѣ чернаго цвѣта, connexivum бѣлый, съ небольшими черными пятнами въ основныхъ углахъ сегментовъ; снизу брюшко все бѣловатое, съ черными пятнышками въ основныхъ углахъ брюшныхъ колецъ и около дыхальца. Ноги бѣловатыя бедра съ верхней стороны имѣютъ по двѣ черныхъ полоски, голени съ внутренней и вѣшней сторонъ также съ черными полосками. Лапки сплошна чернаго цвѣта. Дл.  $5\frac{1}{2}$ —7 мм.

Видъ этотъ открытъ В. А. Баласогло, во время поѣздки его въ Туркестанъ, въ приэмбенскихъ степяхъ (урочище Бикъ-Баула).

## 2. *Arocatus maculifrons* n. sp.

Roth und schwarz, oben dicht, sein rostgelblich behaart; unten sehr fein weisslich behaart. Kopf oben roth, ein Fleck im Nacken, Stirn-  
schwiele am Ende, Fühler, Schnabel und Kopf unterseits—schwarz. Pronotum grob punctirt,  
roth, mit schwarzem Fleck in der Mitte. Schild schwarz, Pronotum und Schild mit durchlau-  
fender Mittellinie. Halbdecken schwarz, Seiten-  
streif und Membrannath roth. Membran rauch-  
braun. Brust und Beine schwarz, Bauch und  
Connexivum roth. After schwarz. Bauchseiten  
unten mit schwarzem, breiten Streif. L.  $6\frac{1}{2}$   
mm.—Wladivostok.

Ярко-красного цвета, сверху густо покрытый нѣжными рыжеватыми волосками; снизу волоски блѣловатые. Голова сверху красного цвета; большое круглое пятно на лбу, конец носового валика, бугорки поддерживающие усики, самые усики, хоботок и голова снизу (кромѣ окраинъ около глазъ)—черного цвета. Переднеспинка весьма крупно пунктирована, съ большими черными пятномъ посерединѣ, трапециoidalной формы, не достигающимъ заднаго края, который совершенно гладкій (безъ точекъ) и въ задней своей части раздѣленнымъ пополамъ продольнымъ ребромъ красного цвета. Щитокъ довольно длинный, съ высокимъ ребромъ посерединѣ; основаніе щитка съ глубокой поперечной бороздкой, кромѣ того по бокамъ ребра находятся два продольныхъ углубленія, трехугольной формы, дно коихъ густо пунктировано, тогда какъ остальная части щитка гладкія; весь щитокъ черного цвета, только высокое продольное ребро и конецъ его красные. Надкрылья красного цвета, но посерединѣ corium проходитъ широкая черная продольная полоса, которая оставляетъ свободными только окраины надкрыльевъ; clarus кромѣ основанія и заднаго шва—черного цвета; виѣшний уголъ corium, передъ мембраннымъ швомъ—черноватый. Перепонка дымчато-бураго цвета, съ более свѣтлыми окраинами. Грудь и ноги черного цвета, брюшко красное, равно какъ и connexivum сверху; по бокамъ брюшка снизу проходитъ по широкой черной полосѣ; средина пятаго сустава и генитальный аппаратъ черного цвета. Дл.  $6\frac{1}{2}$  mm.

Одинъ экземпляръ этого вида полученъ былъ мною изъ окрестностей Владивостока.

3. *Dimorphopterus thoracicus* n. sp.

Pechschwarz, sehr fein grau behaart. Fühler kurz, Glied 1 und 2 roströthlich, 3 und 4 schwarz; Endglied sehr gross, spindelförmig, so lang als Glied 2 und 3 zusammen. Pronotum fast quadrat, vorn viel erweitert, ziemlich grob punctirt; Hinterrand rostbräunlich. Kopf und Pronotum fein glänzend, Schild und Hinterleib matt. Die Halbdecken-Rudimente graubraun. Beine rostbräunlich, Schenkel schwärzlich, am Ende bleich. L.  $3\frac{1}{2}$  mm.—*Vladivostok.*

Черного цвета, съ зачатками надкрыльевъ. Усики едва длиннѣе головы и переднеспинки взятыхъ вмѣстѣ; первые два сустава ихъ рыжеватые; послѣдніе черные; четвертый суставъ очень большой, веретенообразный, равный длиною двумъ предъидущимъ взятымъ вмѣстѣ. Переднеспинка почти квадратнаа, болѣе расширенная къ переднему, чѣмъ къ заднему концу, довольно грубо пунктированная, черного цвета, съ широкой буроваторыжей поперечной полосой по заднему краю. Голова и переднеспинка полублестящія покрытыя стоячими сѣровато-желтыми волосками. Щитокъ черный матовый; брюшко матовое, кажущееся сѣроватымъ отъ множества волосковъ, густо одѣвающихъ его какъ сверху, такъ и снизу. Connexivum черный, узкій, наружный край его иногда красноватобурый. Зачатки надкрыльевъ рыжеватостѣрьые въ два раза длиннѣе щитка и достигающіе только до половины первого брюшного кольца. Ноги рыжеватыя, бедра темнѣе, особенно у первой пары, гдѣ они почти черныя, кромѣ вершины Дл.  $3\frac{1}{2}$  мм.

Окрестности Владивостока.

4. *Drymus parvulus* n. sp.

Körper schwarz, oben fein punctirt. Pronotum breiter als lang, vorn viel verschmälert. Halbdecken röthlichbraun, Clavus-Nath mit gelbem Fleck. Membran rauchbraun, Grundwinkel und Rippen am Ende weisslich. Hinterleib unten sehr fein dicht punctirt und gelb völlig behaart. Beine schwarz; Vorderschienbeine gerade. L. 3 mm.—*Vladivostok.*

Черного цвета, небольшой величины, переднеспинка значительно суженная спереди и более развитая в ширину чём в длину, вся черного цвета, кроме плечевых угловъ, которые бываютъ иногда красновато-бурые; вся поверхность ея, также какъ головы и щитка, весьма нѣжно и густо пунктирована. Надкрылья красноватобурыя, съ желтоватымъ пятномъ на клавальномъ швѣ. Перепонка едва длиннее брюшка, дымчатобураго цвета, основной уголъ ея и концы реберь бледноватые. Нижняя сторона туловища черного цвета, причемъ брюшко весьма густо пунктировано мельчайшими точками и покрыто желтоватымъ пушкомъ. Ноги гладкие, черные; переднія голени прямые, почти безъ расширій на концѣ. Дл. 3 мм.

Окрестности Владивостока.

5. *Eremocoris angusticollis* n. sp.

Oberseite und Beine lang abstehend grau behaart. Fühler braun, Endglied gelblich. Schnabel rostgelblich. Pronotum schwarz, vorn verschmälert, Seitenrand geschweift, Hinterhälften

grob punctirt. Schild schwarz, grob punctirt.  
Halbdecken sein punctirt, Coriumrand am Grunde  
gelblich. Membran rauchbraun, im Aussen-  
grundwinkel ein weisslicher Fleck. Schenkel  
röhlichbraun, Schienbeine und Füsse gelblich;  
Vorderschenkel unten mit grossem Zahn, äussere  
Kante kleinzähnig. Schienbeine ohne Dorne L.  
 $4\frac{1}{2}$  — 5 mm.— *Vladivostok.*

Вся наружная поверхность и ноги покрыты довольно длинными прямо-стоячими съроватыми волосками. Голова довольно большая, нѣсколько болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширину. Усики бурые, кромѣ послѣдняго сустава, который желтоватый. Хоботокъ рыжевато-желтый. Переднеспинка съуженная кпереди, съ явственной вырѣзкой передъ плечевымъ угломъ; задняя ея половина грубо пунктирована; вся черного цвѣта, боковые, килеватые края ея красноватобурые. Щитокъ черный, грубо пунктированный, средина его выщуклая въ видѣ трехугольной площадки, переходящей къ концу щитка въ ребро. Надкрылья слабѣе и рѣже пунктированы чѣмъ переднеспинка и щитокъ, бураго цвѣта; наружный край у основания почти до половины желтоватый. Перепонка съ бѣлыми пятнами у наружного края мембранального шва. Бедра красноватобураго цвѣта, голени и лапки желтоватые; бедра передней пары снизу, съ вѣшней стороны, усажены рядомъ мелкихъ ровныхъ зубчиковъ, которыхъ насчитывается болѣе двѣнадцати; на внутреннемъ ребрѣ нижней стороны бедра сидить одинъ большой зубецъ. Голени передней пары изогнуты и на концѣ расширенныя. На всѣхъ вообще голеняхъ шипиковъ нѣть. Дл.  $4\frac{1}{2}$ —5 мм.

Окрестности Владивостока.

6. *Pirates concolor* n. sp.

Ganz schwarz, matt, sehr fein grauweiss behaart und schwarz beborstet. Fühlerglied 3 und 4 weiss, am Grunde schwärzlich. Vorderschenkel unten dicht abstehend weiss behaart und weiss bewimpert. Brust silberweiss behaart. L. 13 mm. — *Wladiwostok*.

Весь черный, матовый, только переднеспинка слабо блестящая, покрытый весьма мелкими съроватобѣлыми волосками, которые на груди становятся серебристыми и черными щетинками, которых всего длиннѣе на голениахъ. Бедра передней пары снизу густо покрыты бѣловатыми стоячими волосками и такого же цвѣта щетинками; губчатая подошва переднихъ ногъ достигаетъ до половины голеней. Усики черные, третій и четвертій суставы ихъ бѣлаго цвѣта съ черноватымъ основаниемъ. Простые глаза довольно большие, темновишина ваго цвѣта. Дл. 13 мм.

Окрестности Владивостока.

7. *Sigara Sahlbergii* n. sp.

Oben schwärzlichgrau, glänzend, sehr fein behaart. Kopf  $1\frac{1}{2}$  mal breiter als Pronotum, bleichgelblich, mit braunem Mittelstreif. Pronotum quer, viermal breiter als lang, ganz sehr fein querrunzelig; vorn ein stumpfer Knoten. Grundhälften des Clavus bleich gelblich; Corium dicht, grob punctirt, mit vier durchlaufenden schwarzen, vertieften Streifen. Körper unterseits bleichgelblich. L.  $2\frac{1}{2}$  mm. — *Amur*.

Сверху буроватосъраго цвѣта, довольно густо покрытый весьма короткими волосками, блестящій. Голова въ полтора раза шире переднеспинки, свѣтложелтоватая, съ бурой полосой посерединѣ, достигающей затылка, который дугообразно вырѣзанъ и имѣеть черноватый бугорокъ посерединѣ. Перенес спинка короткая, попечная, развитая въ ширину почти въ четыре раза болѣе чѣмъ въ длину; передній край ея посерединѣ возвышенъ въ видѣ небольшаго, но широкаго бугорка; вся она покрыта чрезвычайно нѣжными поперечными струйками и одноцвѣтная; иногда бываетъ окрашена свѣтлѣе надкрыльевъ. *Clarus* съ свѣтлымъ, желтоватымъ основаниемъ, оттѣненнымъ съ внутренней стороны широкой, черноватой полосой; кромѣ того черныя полосы идутъ вдоль его швовъ внутренняго и вѣшняго; онъ весь гладкій, только вдоль внутренняго шва идетъ рядъ сильныхъ точекъ. Надкрылья густо и сильно пунктированы, съ четырьмя черными продольными полосами, достигающими до перепонки и соединяющими ея на концѣ. Эти черныя полосы нѣсколько углублены, такъ что свѣтлые промежутки между ними имѣютъ видъ выпуклыхъ широкихъ реберъ. Нижняя сторона туловища блѣднопалевая. Да.  $2\frac{1}{2}$  милли.

Нѣсколько экземпляровъ съ р. Амура.

Астрахань.  
1880 г.