

НОВЫЕ ВИДЫ ИЗЪ СЕМ. Capsides.

В. Е. ЛЕВЛЕВА.

1. *Calocoris suturalis* n. sp.

Bleich, bräunlichgelb, kurz goldgelb behaart. Kopf und Pronotum glänzend, zerstreut lang abstehend behaart, Halbdecken und Körper matt. Kopf glatt, rostgelblich, Stirnschwiele mit grossem schwarzen Fleck. Fühler dünn, rostgelb; Schnabelendglied schwärzlich. Pronotum rostgelblich, auf der Mitte mit zwei schwarzen Flecken, hinten fein und zerstreut punctirt; Vorderrandkiel des Pronotum sehr schwach. Schild, Clavus innen und Innenwinkel des Corium braun. Membran bräunlich, Zellrippen schwärzlich, die kleine Zellrippe rostgelb. Unterseite gelblich, mit schwarzer durchlaufender Mittellinie und zwei Seitenstreifen. Beine gelblich, Schienbeine bleich, schwarz bedornt. Schenkel braunschwarz punctirt-gefleckt. L. mm. *Nikolsk* (Amur).

Свѣтлый, буровато-желтый, покрытый золотистыми волосами. Голова и переднеспинка блестящая, покрытая рѣдкими, но довольно длинными, полустоячими волосками; надкрылья матовыя, бабъ и остальные части туловища. Голова гладкая, рыжаго цвѣта съ большимъ чернымъ пятномъ на