

носовомъ валикѣ. Усики одноцвѣтные, рыжіе, покрытые мчайшимъ пушкомъ; второй суставъ по всей своей длинѣ ной толщины, или едва замѣтно утолщается кверху; тр и четвертый суставы почти одинаковой толщины со вторъ Хоботокъ рыжій, послѣдній суставъ его черноватый. Це неспинка къ заду слабо и рѣдко пунктированная, съ очень кимъ шейнымъ бѣльцомъ, рыжеватаго цвѣта, съ двумя ными пятнами на срединѣ. Щитокъ, клавальный шовъ: внутренній уголъ согіумъ—бурого цвѣта, остальные же ч надкрыльевъ блѣднаго буровато-желтаго цвѣта, какъ и все ловище. У нѣкоторыхъ экземпляровъ темнобурый цвѣтъ ще и надкрыльевъ выраженъ не ясно. Перепонка бурова мелко-струйчатая, а часть ея заключающаяся въ клѣтк довольно грубо морщинистая; внѣшнее ребро мембранальн клѣтокъ темнобурое (темнѣ общаго фона перепонки), в реннее же — рыжаго цвѣта; брюшко желтоватое, вдоль по срединѣ идетъ болѣе или менѣ развитая полоса черн цвѣта, а по бовамъ правильный рядъ черныхъ полосоеъ. Н рыжеватыя, голени свѣтлѣе; бедра покрыты буровато-черн пятнами и точками, разбросанными безъ всякаго поря, голени одноцвѣтныя, съ чернымъ ободкомъ на концѣ и сильными черными шипиками, которые изрѣдка раскидан на бедрахъ. Послѣдній суставъ лаповъ на концѣ и къ черноватые. Дл. 6 мм. Нивольскъ, на Амурѣ.

Видъ этотъ стоитъ ближе всего къ *C. ticinensis* и *C. kei*, отличающаясь отъ нихъ совершенно инымъ цвѣтороспе ніемъ, какъ то присутствіемъ чернаго пятна на носу, т нымъ щиткомъ и такимъ же клавальнымъ швомъ и т. д.

2. *C. fulvus* n. sp.

Ganz rostgelb, glänzend, Oberseite abstehead g behaart. Kopf roströthlich, Stirnschwiele am Ende shchwä lich. Fühler ziemlich dicht abstehead behaart, rostge