

### 3. *Macrotylus attenuatus* n. sp.

Ganz grün, oben dicht schwarz behaart, unten sehr fein weisslich behaart. Kopf länger als breit, Fühler bleich, Glied 3 und 4 bräunlich, Wurzelglied und Glied 2 am Ende, Glied 2 und 3 am Grunde, schwarz. Glied 2 gleichlang als 3, kaum länger als Hinterkopf und viel kürzer als Hinterrand des Pronotum. Schildspitze und Clavusende bisweilen schwärzlich. Membran durchsichtig, am Ende bräunlich, mit drei schwarzen Flecken; Zellrippen bleichgrünlich. Beine grünlich, Schienbeine am Grunde und Füße am Ende schwarz; Hintersehenkel oberseits bräunlich; Schienbeine fein schwarz bedornt. Klauen sehr klein. L.  $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{4}$  mm. *Sarepta*.

Весь однообразнаго яркозеленаго цвѣта; (сухіе экземпляры принимаютъ желтоватый оттѣнокъ, особенно на головѣ и переднеспинкѣ); сверху густо покрытый короткими, черными, а снизу мельчайшими бѣловатыми волосками. Голова нѣсколько болѣе развита въ длину, чѣмъ въ ширину, съ выгнутой лобной частью. Усики довольно толстые, бѣловатаго цвѣта, послѣдніе два сустава блѣднобуроватые; первый суставъ короткий, не достигающій конца головы, второй едва длиннѣе ширины головы и на  $\frac{1}{3}$  короче задняго края переднеспинки; третій равенъ длиною второму, но нѣсколько его тоньше и вдвое длиннѣе четвертаго; первый суставъ съ чернымъ кольцомъ передъ вершиной, широкое основаніе втораго и третьяго суставовъ, а также вершина втораго — чернаго цвѣта. Надкрылья покрыты равномерно черными волосками; перепонка свѣтлая, полупрозрачная, въ концу слегка бурбующая; ребра ея клѣтокъ блѣднозеленныя (у сухихъ экземпляровъ почти бѣловатыя); клѣтки внутри буроватыя; въ основномъ углу перепонки, а также по внѣшнему краю ея, непосредственно подъ синеус, по рѣзкому, черному, небольшому пятну;