

Усики черного цвѣта, первый суставъ ихъ, а равно хоботокъ рыжеватожелтые. Переднеспинка трапециoidalной формы, впереди слабо сжуженная, съ боковыми краями почти прямыми; задняя треть ея и боковые, узколистоватые края рыжеватые. Щитокъ весь черного цвѣта. Надкрылья съ укороченной перепонкой, буроваторыжя, къ концу постепенно чернѣющія. Брюшко совершенно черного цвѣта. Ноги рыжя; кольцо на вершинѣ задняго бедра и основанія голени средней и задней пары черноватые. Первый суставъ задней пары лапокъ длиннѣе остальныхъ двухъ суставовъ взятыхъ вмѣстѣ. Дл. 4 м. м.

Одинъ мужской экземпляръ этого вида открытъ былъ А. В. Комаровымъ въ окрестностяхъ Батума.

9. *Calocoris sanguineus* n. sp.

Körper blutroth; Halbdecken und Extremitäten schwarz. Tylus, ein Strich im Nacken, zwei Flecken auf dem Vordertheil des Pronotum, Hinterrand des Pronotum, Brustmitte und Bauch unten—schwärzlich. Fühler dünn, Glied 2 oben sehr fein verdickt, Glied 3 bräunlich, am Grunde weisslich. Oberseite grob punctirt und quengerunzelt. Vorderrandkiel des Pronotum stark, breit. Membran und Zellrippen schwarzbraun. L. $8\frac{1}{2}$ mm.—*Batum* (Transkaukasien).

Туловище розовокраснаго цвѣта; надкрылья, усики, хоботокъ и ноги—черныя; носовой валикъ (tylus), полоска на затылкѣ, два небольшія пятна въ передней части переднеспинки, оторочка задняго ея края, средняя груди и брюшко снизу—черноватые. Усики тонкіе, второй суставъ на вершинѣ слабо утолщающійся, тре-