

тій бураго цвѣта, съ бѣловатымъ основаніемъ. Передне-спинка покрыта грубымъ пунктиромъ и поперечными морщинами; передній край ея съ широкимъ кольцомъ. Надкрылья густо пунктированы, такъ что точки часто сливаются между собою; перепонка и ея ребра однообразнаго темнубураго цвѣта. Дл. $8\frac{1}{2}$ м. м.

Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Батума, отъ А. В. Комарова.

10. *Pachytoma nigrita* n. sp.

♂ Ganz schwarz, matt, dicht silberweiss behaart und schwarz gewimpert. Fühler dünn, schwarz, Wurzelglied zerstreut schwarz beborstet, Glied 2 fadenförmig, Glied 3 und 4 gleichlang, sehr fein und lang abstehend behaart. Pronotum vorn sehr verengt, dicht fein querge-runzelt. Halbdecken parallel, Membran schwarz-braun, Zellrippen schwarz. Beine schwarz, Schenkelende und Schienbeine oberseits rost-gelblich, schwarz bedornt. L. $3\frac{1}{2}$ mm.—*Oren-burg*.

♂ Весь черный, матовый, покрытый серебристобѣлыми чешуевидными волосками и черными стоячими щетинками. Усики тонкіе, особенно послѣдніе суставы, чернаго цвѣта; основной суставъ покрытъ рѣдкими, но очень сильными черными щетинками, преимущественно съ внутренней стороны; второй суставъ ровной толщины по всей своей длинѣ, почти нитевидный и едва толще остальныхъ двухъ суставовъ; послѣдніе три сустава, кромѣ мельчайшаго свѣтлаго пуха, покрыты еще рѣдкими, длинными полустоячими волосками, очень тонкими и сѣроватаго цвѣта; второй суставъ самый длин-