

ный, третій на одну треть его короче и ровень четвертому. Щеки и узкія кольца вокругъ глазъ желтоватобѣлыя; на затылкѣ между глазами замѣтны два черныхъ гладкихъ пятнышка. Переднеспинка сильно суженная кпереди, густо покрыта поперечными мелкими струйками. Надкрылья полныя, съ боковыми краями параллельными; перепонка темнобурая, съ черноватымъ ребромъ большой клѣтки и оторочкой вокругъ него; внутренняго ребра малой клѣтки незамѣтно. Ноги черныя, вершина бедръ и внѣшняя сторона голеней рыжеватая; иногда голени кромѣ основанія и вершины совершенно рыжія, съ черными точками, песущими черные же шипики, расположенными по внѣшней сторонѣ. Самка неизвѣстна. Дл.  $3\frac{1}{2}$  м. м.

Два экземпляра этого вида найдены В. А. Баласогло въ Оренбургской губерніи.

#### 11. *Anapus longicornis* n. sp.

♂ Schwarz, matt, silberweiss schuppenartig behaart und schwarz beborstet. Fühler rostgelb, Wurzelglied schwarz, am Ende sehr verdickt und stark beborstet, Glied 2 dünn, etwas länger als Hinterrand des Pronotum. Schild und Pronotum sehr fein querrunzelig. Membran schwärzlich, Rippen schwarz. Beine schwarz, Schenkelende und Schienbeine von aussen rostgelblich. L. 3 mm.—*Orenburg*.

♂ Чернаго цвѣта, матовый, покрытый серебристыми чешуевидными волосками. Голова черная, съ выпуклыми большими глазами, вокругъ которыхъ нѣтъ свѣтлыхъ круговъ, какъ у *A. Kirschbaumi* Stål; щеки бѣловато-желтыя. Усики свѣтлорыжіе, основной суставъ черный, къ концу значительно утолщенный, съ сильными, чер-