

kurz bedornt, Schienbeine am Grunde und Füsse bräunlich, Schenkel fein schwarz punc-tirt, Klauen kaum sichtbar. L. 4 mm.—*Sarepta*.

Однообразного, блѣднозеленоватаго цвѣта, съ по-верхностью покрытою черными стоячими волосками; снизу туловище одѣто очень нѣжными, едва замѣтными, блѣдоватыми волосками. Голова болѣе развита въ длину, чѣмъ въ ширину, съ черноватыми пятнами у основания носового валика. Усики довольно толстые, рыжеватые, покрытые весьма нѣжными и короткими блѣдоватыми во-лосками; первый суставъ съ темнобурой вершиной; ос-нованіе втораго и третьяго суставовъ слегка буроватое; второй суставъ нѣсколько длиннѣе задняго края перед-неспинки. Всѣ части надкрыльевъ блѣднозеленоватыя; наружный край *corium*, надъ *cuneus*, рыжій; перепонка свѣтлобуроватая, съ бѣлыми ребрами кѣтокъ; внутрен-ность кѣтокъ, а также полоска виѣ ихъ и боковой наружный край перепонки темнобурого цвѣта. Ноги зеленоватыя, голени покрыты мельчайшими волосками и очень короткими, едва замѣтными шипиками; кольцо у основанія голеней и лапки буроватыя. Съ наружной стороны бедра несутъ рядъ слабыхъ черноватыхъ пят-нышекъ. Когти почти незамѣтны. Дл. 4 мм. Сарепта, въ одномъ экземплярѣ.

15. *Oncotylus affinis* n. sp.

Bleich grünlich, oben schwarz, unten sehr fein weisslich behaart. Kopf so lang als breit, Au-gen fein gewölbt. Fühler ziemlich stark, sehr fein schwarz behaart, Glied 2 bleich rostgelblich, viel länger als der Hinterrand des Pro-notum. Halbdecken weisslich, Membran bleich;