

16. *O. plumicornis* n. sp.

♂ Strohgelb, oben schwarz bedornt; Halbdecken weiss behaart, Bauch grünlich, sehr feingelb behaart. Fühler und Beine fein und dicht schwarz behaart. Beine ohne Flecken, Schienbeinende und Dorne schwarz; Füsse schwarz. Fühler ziemlich stark, Glied 1 und 2 strohgelb, Glied 3 schwarzbraun, am Grunde bleichgelb, Endglied bräunlichgelb; Glied 2 viel länger als Hinterrand des Pronotum, Glied 1 und 4 gleich lang; Glied 3 unten regelmässig lang behaart. L. 5 mm. — *Sarepta*.

♂ Соломенножелтаго цвѣта, мѣстами съ зеленоватымъ оттѣнкомъ; брюшко зеленоватое, кромѣ генитальныхъ суставовъ, которые яржежелтаго цвѣта. Наружная сторона покрыта черными, сильными щетинками, надкрылья сверхъ того имѣютъ еще короткіе бѣловатые волоски; на брюшкѣ снизу волоски очень короткіе, желтоватые. Усики и ноги покрыты довольно густо очень короткими нѣжными, черными волосками, а голени сверхъ того и черными щетинками; ноги безъ пятенъ, концы голеней и лапки темнубураго, почти чернаго цвѣта. Усики довольно толстые, первые два сустава соломенножелтаго цвѣта, кажущагося нѣсколько темнѣе противъ общаго цвѣта туловища, отъ густаго покрова черныхъ волосковъ; суставъ третій темнубурый съ свѣтложелтымъ кольцомъ у основанія; четвертый—бураватожелтый; во всю длину третьяго сустава, съ нижней его стороны, идетъ правильный рядъ очень длинныхъ волосковъ, расположенныхъ въ видѣ бородки пера; второй суставъ гораздо длиннѣе ширины задняго