

края переднеспинки, третій на одну треть его короче, четвертый же равенъ длиною первому. Дл. 5 мм.

Одинъ мужской экземпляръ изъ Сарепты; отличается отъ всѣхъ другихъ видовъ перообразнымъ расположеніемъ длинныхъ волосковъ на третьемъ суставѣ усиковъ, которое встрѣчается еще только въ одномъ родѣ, именно у *Anoterops* (*A. pennicornis* Jak.), описанномъ мною недавно изъ той же мѣстности.

17. *Atractotomus nigratarsis* n. sp.

♀ Schwarz, matt. Fühlerglied 1 und 2 schwarz, dicht schwarz langbehaart; Glied 2 massiv, spindelig, Glied 3 und 4 dünn, weisslich, am Grunde bräunlich. Schenkel schwarz, Schenkelende und Schienbeine bleich rostgelblich, schwarz bedornt; Schienbeinende und Füsse schwarz. L. $3\frac{1}{2}$ mm.—*Orenburg*.

♀ Туловище чернаго цвѣта; первые два сустава усиковъ черные, густо покрыты такого же цвѣта длинными прилегающими волосками, второй суставъ массивный, веретенообразной формы, причѣмъ наиболѣе сильное утолщеніе его приходится ближе къ верхнему концу; остальные два сустава весьма тонкіе бѣловатаго цвѣта, съ буроватымъ основаніемъ. Надкрылья буроватые, къ наружному краю темнѣющія, иногда совершенно черныя; ребра перепонки слѣтлобурья, клѣтки внутри и пятно снаружи, у малой внутренней клѣтки, свѣтлѣе общаго фона перепонки. Бедра чернаго цвѣта, вершины ихъ и голени блѣднорыжеватые; концы голеней и лапки чернаго цвѣта; голени безъ черныхъ точекъ; и покрыты нѣжными черными шипиками. Дл. $3\frac{1}{2}$ мм.

Отъ всѣхъ другихъ видовъ этого рода *A. nigratar-*