

Leucopterum Reut.

Hem. Gymn. Eur. II p. 259.

L. candidatum Reut.

Hem. Gymn. Eur. 1879. II, p. 260. 2.

Дербентъ (Беккеръ). Недавно описанный новый родъ, исключительно свойственный южнорусской фаунѣ.

L. transversum n. sp.

Ganz grün, oben dicht silberweiss — unten sehr fein gelb-behaart. Kopf so lang als breit, sehr dicht filzig behaart. Augen gross. Fühler weisslich, dünn, Glied 2 am Ende bräunlich, so lang als Hinterrand des Pronotum. Halbdecken bleich, am Ende bräunlich-grün; Cuneus weisslich, aussen gelb. Membran bleichbräunlich, Zellrippen weisslich, unter dem weissen Aussengrundwinkel ein brauner Randfleck. Schnabel weisslich, Wurzelglied am Ende — braun. Beine weisslich, fein behaart und lang weiss beborstet; Hinterschenkel am Ende bräunlich, schwärzlich punctirt. Klauen-glied und Klauen braun. L. 4—4 $\frac{1}{2}$ mm. — Derbent.

(♀) Яркозеленый, сверху густо покрытый серебристобѣлыми волосками, снизу же весьма нѣжными и очень короткими желтоватобѣлыми волосками. Голова большая, развитая одинаково какъ въ длину, такъ и въ ширину, съ очень выпуклыми большими глазами, покрытая густыми, въ видѣ войлока, волосками. Усики бѣловатые, тонкие, второй суставъ къ вершинѣ слегка бурѣющій и равный по длини заднему краю переднеспинки. Голова, также какъ и переднеспинка густаго, яркозеленаго цвѣта; ширина послѣдней лишь на половину болѣе длины; боковые ея края прямые. Щитокъ яркозеленый, съ желтоватымъ основаниемъ. Надкрылья блѣдно-зеленоватыя, на концѣ ихъ, вдоль мембранального шва, захватывая послѣднюю третью clavus'a, проходитъ широкая, зеленоватобурая полоса, покрытая черными волосками, тогда