

Auchenocrepis Fieb.

A. Reuteri Jak.

Баку (X). — Петровскъ, изрѣдка на Tamarix.

Campylomma Reut.

C. lucida Jak.

Agalliaestes—Jak., Тр. Русс. Энт. Общ. IX. стр. 228. 6.

Campylomma—Reut., Нем. Gymn. Eur. I. p. 54. 3. et II. p. 296.

C. viridula Jak., Bull. Mosc. 1880. I. p. 143. 11.

♂. Ganz grünlich, Brustmitte schwarz. Augen sehr gross; Abstand zwischen beiden Augen so breit als Durchmesser des Auges. Fühlerglied 2 um $\frac{1}{3}$ kürzer als Hinterrand des Pronotum.

Объ описанныя мною формы, какъ я убѣдился при точномъ сличеніи, составляютъ лишь цвѣтотыя разности одного и того же вида; тоже самое полагаетъ и Рейтеръ, видѣвшій экземпляры описанныхъ мною разновидностей. Съ Кавказа я имѣю лишь одинъ экземпляръ этого вида, — изъ Куруша, въ Астраханской же губерніи годами встрѣчается во множествѣ.

C. simillima n. sp.

Oberseite bleich bläulichgrün, schwarz beborstet und fein weisslich behaart. L. $2\frac{3}{4}$ mm.

♂ Unterseite ganz schwarz. Fühler schwarz, Wurzelglied am Ende weisslich, Glied 3 und 4 schmutziggelb; Glied 2 stabförmig, dick, halb so kurz als Hinterrand des Pronotum. Augen mässig gross; Abstand zwischen beiden Augen viel breiter als Durchmesser des Auges.

♀ Unterseite grünlich. Fühler dünn, schmutzigweiss; Wurzelglied und Glied am Grunde breit schwarz.

Блѣднаго зеленоватобѣлаго цвѣта, съ поверхностью покрытою сильными, черными волосками и болѣе нѣжными бѣловатыми. Самцы отъ самокъ отличаются цвѣтомъ туловища