

# ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЯ (Hemiptera heteroptera)

КАВКАЗСКАГО КРАЯ.

В. Е. ЯКОВЛЕВА.

## II.

Два года тому назадъ въ XII томѣ Трудовъ Русскаго Энтомологическаго Общества былъ напечатанъ мною списокъ полужестокрылыхъ Кавказскаго края, заключавшій въ себѣ перечень 460 видовъ, т. е. такого количества ихъ, которое, по моему мнѣнію, составляетъ не болѣе трети того, что должно встрѣчаться въ фаунѣ Кавказа. Вновь накопившійся матеріалъ позволилъ мнѣ приступить къ составленію дополнительного списка, который увелииваетъ теперь число кавказскихъ видовъ до 600.

Матеріалы послуживши мнѣ для составленія предлагаемаго списка состояли, главнымъ образомъ, изъ двухъ статей д-ра Хорвата о закавказскихъ полужестокрылыхъ и коллекціи собранной мною въ окрестностяхъ г. Петровска (Дагестанской области), гдѣ я экскурсировалъ въ продолженіи почти двухъ мѣсяцевъ.

Д-ръ Хорватъ составилъ свои списки полужестокрылыхъ по коллекціямъ собраннымъ въ Закавказии гг. Шнейдеромъ и Ледеромъ; кроме того, ему же, при посредствѣ г. Радде,

переданы были для описанія наскъомыя этого отряда изъ Кавказскаго Музея въ Тифлісѣ \*).

Кромѣ нѣсколькихъ видовъ, д-ръ Хорватъ нашолъ много таихъ, мѣстонахожденіе которыхъ на Кавказѣ не было до него никѣмъ констатировано. Всѣ мѣстонахожденія полужестокрылыхъ, приведенныхыхъ д-ромъ Хорватомъ въ своихъ спискахъ, отмѣчены въ предлагаемой статьѣ буквою (X.).

Что касается до моей поѣздки въ Петровскъ, то я не могу назвать ее особенно удачной, таѣ какъ, не смотря на мои почти ежедневныя и очень усердныя экскурсіи въ теченіи двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, число найденныхъ мною видовъ не превышало 150. Правда, сарентскіе энтомологи, гг. Христоффъ и Беккеръ, посѣщавшіе прежде эту мѣстность, предупреждали меня о замѣчательной бѣдности фауны въ окрестностяхъ Петровска, но я не придавалъ ихъ свидѣтельству особаго значенія, тѣмъ болѣе, что Петровскъ давно уже привлекалъ меня, какъ промежуточный пунктъ между фаунами двухъ оригинальныхъ областей — степной и горной. Впрочемъ, помимо бѣдности фауны, неудача моего сбора зависѣла также отъ времени года, такъ какъ мнѣ пришлось прожить въ Петровскѣ съ половины іюня до половины августа, когда растительность кругомъ города была выжжена солнцемъ и истреблена саранчей и другими прямокрылыми.

Характеръ мѣстности въ окрестностяхъ Петровска весьма разнообразный; самый городъ расположень на невысокомъ холмѣ, идущемъ по берегу моря, на протяженіи двухъ или трехъ верстъ; за этимъ холмомъ растягивается широкая долина, ограниченная къ западу высокими отрогами кавказскихъ горъ, покрытыхъ почти сплошь колючимъ держидеревомъ (*Palyurus*) и низкорослымъ дубомъ. Въ этой долинѣ расположены городскіе фруктовые сады. Верстахъ въ двухъ

\* ) Dr. Horwath, 1) Beitrag zur Hemipteren-Fauna Transcaucasiens (Isis 1878).  
— 2) Hemipterologisches aus Transcaucasien (Isis 1879).

къ съверу отъ Петровска, начинаются сыпучие пески, образующие берегъ моря; по характеру своему эти пески очень напоминаютъ барханы киргизской степи Нарынъ и точно также покрыты мѣстами травою и деревьями, между которыми преобладаетъ серебристый тополь, *Eleagnus angustifolius* и громадныя заросли *Tamarix*. За песками растягивается къ съверу необозримая, полынная степь, сливающаяся съ горизонтомъ.

Мои экскурсіи сосредоточены были главнымъ образомъ въ пескахъ, где у корней покрывающихъ ихъ растеній, преимущественно изъ сем. сложноцвѣтныхъ, я нашелъ нѣсколько интересныхъ видовъ, изъ которыхъ иные попадались въ большомъ количествѣ. Общий характеръ петровской фауны—южноевропейскій и въ частности весьма близкій къ астраханской фаунѣ, при полномъ почти отсутствіи специально кавказскихъ видовъ, если не считать таковыми нѣсколько новыхъ, которые могутъ оказаться свойственными и другимъ мѣстностямъ, въ Кавказа. Нѣкоторые виды, довольно рѣдкие въ Астраханской губерніи и попадающіеся тамъ по одиночкѣ, встрѣчались здѣсь въ большомъ количествѣ и притомъ болѣе или менѣе многочисленными колоніями; къ такимъ относятся: *Phimodera galgulina* HS., *Leprosoma inconspicuum* Bär., *Schirus dubius* Scop., *Psaedophlaeus Falleni* Schill., *Berytus geniculatus* Fieb., *Serenthia depressa* Jak., *Monanthis unicosata* MR., *Cylindromelus setulosus* HS. и нѣкоторые другие; изъ числа этихъ видовъ—*Berytus geniculatus* и *Cylindromelus setulosus* найдены въ фаунѣ Россіи впервые; очень рѣдкій и до сихъ поръ известный только изъ окрестностей Сарепты и горы Богдо видъ—*Leprosoma inconspicuum* Bär., попадался здѣсь въ пескахъ у корней растеній—десятками.

Кромѣ петровской коллекціи и списковъ д-ра Хорвата, я имѣлъ въ своемъ распоряженіи небольшое количество полужестокрылыхъ, собранныхъ многоуважаемымъ А. В. Комаровымъ, какъ въ Дербентѣ, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ Закавказья.

Виды вновь найденные на Кавказѣ и не вошедшие въ мой первый списокъ снабжены краткой синонимикой.

---

### Geocorisae.

Fam. Pentatomides.

Subf. Arthropteridae.

*Coptosoma* Lap.

*C. globus* Fab.

Баку, Еленендорфъ (Х.).

Subf. Scutelleridae.

*Odontotarsus* Lap.

*O. grammicus* L.

Бакинская губернія, Муганло (Х.).

*Phimodera* Germ.

*P. galgulina* H. S.

Петровскъ — во множествѣ въ пескахъ, у корней растеній, изрѣдка же на молочай (*Euphorbium* sp.). Всѣ особи этого вида, по глинистопесчаному цвѣту туловища и небольшой величинѣ, совершенно одинаковы съ астраханскими, и по этимъ признакамъ значительно разнятся отъ западноевропейскихъ, которыхъ гораздо крупнѣе и буроватосѣраго цвѣта.

*Eurygaster* Lap.

*E. maura* L.

Петровскъ, — только въ одномъ экземплярѣ. — Елизавет-  
таль (Х.).

*E. hottentota* Fab.

Петровскъ.— Бакинская губ., Муганло (Х.).

*E. integriceps* Osch. (in litt.).

Put., Mitt. Schw. Ent. Ges. 1880. VI. p. 1.

Этотъ, неописанный еще видъ, по свидѣтельству Пьютона найденъ былъ въ Ташкентѣ, Сиріи и на Кавказѣ; въ послѣдней мѣстности онъ былъ открытъ Ледеромъ.

*Arctocoris* Germ.

*A. lanatus* Pall.

Петровскъ — одинъ экземпляръ въ пескахъ, у корней растеній, по своей формѣ и величинѣ похожій на сарептскихъ.

*Odontoscelis* Lap.

*Q. fuliginosus* Lin.

Петровскъ — нѣрѣдко, въ началѣ юля, въ степи по сорнымъ мѣстамъ и подъ сухимъ навозомъ. — Бакинская губ. (Х.).

*O. dorsalis* Fab.

*Tetyra dorsalis* Fab., Syst. Rh. p. 139. 54.

*Arctocoris plagiatus* Germ., Zeit 1839. I. p. 48. 2. — HS., Wanz. Ins. V. p. 38 fig. 187.

*Odontoscelis plagiatus* Fieb., Eur. Hem. p. 379. 3.

*O. dorsalis* MR., Hist. pun. Fr. I. p. 24. 2.

Общеевропейскій видъ, распространеніе котораго по Россіи вовсе неизвѣстно; въ Туркестанѣ замѣченъ Ошанинъ. — Баку (Х.). Д-ръ Хорватъ полагаетъ, между прочимъ, что въ фаунѣ Европы встрѣчается только два вида этого рода, причемъ думаетъ что и установленный мною *O. hispidula* долженъ быть отнесенъ къ *O. dorsalis* Fab. Д-ръ Хорватъ ошибается вдвойнѣ; видовъ этого рода, не считая даже сомнительныхъ *O. signata* и *O. lineola*, — гораздо болѣе двухъ въ европейской фаунѣ; что же касается *O. hispidula*, то

это несомнѣнно самостоятельный видъ, очень своеобразный и извѣстный некоторымъ энтомологамъ въ натурѣ, между прочимъ д-ру Пютону, который и включилъ его въ свой каталогъ (1875 г.).

*O. minuta* Jak.

Описаніе этого вида, открытаго А. В. Комаровы мъ въ окрестностяхъ Дербента, печатается въ Bulletin des Nat. de Moscou.

*Tarisa Am.* Serv.

*T. virescens* HS.

Бакинская губернія (Х.).

*Leprosoma* Bär.

Bär., Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 386.

*L. inconspicuum* Bär.

Bär., Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 387. tab. VI. fig. 10.—Fieb., Eur. Hem. p. 396.—Bolivar, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. 1879. VIII. p. 152 tab. II. fig. 2.

Петровскъ — въ большомъ количествѣ, въ пескахъ, у корней сложноцвѣтныхъ растеній, въ теченіи іюля; все экземпляры темнѣе цвѣтомъ сарептскихъ.

Единственными мѣстонахожденіями этого вида до сихъ поръ были — Сарепта и Астраханская губернія. Въ Испаніи встречается по всей вѣроятности другой видъ, ибо, судя по рисунку данному Боливаромъ (л. с. fig. 2), онъ не имѣть ничего общаго съ *L. inconspicuum* Bär. Тождественность этого вида съ египетскимъ *L. reticulatum* HS. — вопросъ еще спорный.

*Ancyrosoma Am.* Serv.

*A. albolineatum* Fab.

Бакинская губернія, Ленкорань, Аютино (Х.).

*Derula* MR.

*D. flavoguttata* MR.

Муганло (Х.).

*Podops* Lap.

*P. inuncta* Fab.

*Cimex inunctus* Fab., Syst. Ent. p. 700. 20.

*Tetysa tangira* Fab. Syst. Rh. p. 138. 49.

*Podops inunctus* MR., Hist. pun. Fr. I. p. 106. 1.—Fieb., Eur. Hem. p. 350. 1.

Бакинская губернія (Х.). — Нѣтъ ничего невозможнаго, что эта европейская форма встрѣчается на Кавказѣ, но слѣдуетъ имѣть въ виду, что кавказской фаунѣ свойственъ другой видъ — *P. annulicornis* Jak., очень близкій къ *Inunctus*, втораго мною съ Кавказа не получалось.

Subf. Cydnidae.

*Cephalocetus* Duf.

L. Duf., Ann. Ent. Fr. 1834. III. p. 342.

*C. scarabaeoides* Fab.

*Cydnus* — Fab., Syst. Rh. p. 186. 11.

*Cephalocetus* — Sign., Ann. Ent. Fr. 1831. I. p. 39. 1. tab. I. fig. 1.

*C. histeroides* L. Duf., Ann. Ent. Fr. 1834. III. p. 347. tab. V., fig. 1.—Fieb., Eur. Hem. p. 362. 1.—MR., Hist. pun. Fr. II. p. 10. 1.

Видъ этотъ свойственный Испаніи и Алжиру, найденъ въ послѣднее время г. Млокоевичемъ на Кавказѣ; по экземплярамъ изъ этой мѣстности составлено описание этого вида Синьоре, въ его новѣйшей монографіи *Cydnides* (l. c.). Что касается до находженія *C. scarabaeoides* въ Харьковской губерніи (Труды Харьк. Общ. Исп. Прир. т. IV, стр. 71. 8), то показаніе это едва ли можетъ быть принято на вѣру.

*Cydnus* Fab.

*C. nigrita* Fab.

Мамудлы (Х.).

*Geotomus* MR.

*G. elongatus* HS.

Бакинская губ., Елизаветталь (Х.).

*Brachypelta* Am. Serv.

*B. aterrima* Först.

Тифлисъ, Александрополь, Сардарабадъ на Араксъ, Сурамъ, Елизаветталь. (Х.).

*Schirus* Am. Serv.

*S. ovatus* HS.

*Cydnus ovatus* H.S., Wanz. Ins. V. p. 96 fig. 545.

*Schirus ovatus* Fieb., Eur. Hem. p. 367. 1.—MR., Hist. pun. Fr. II. p. 51.

Коди (Х.).

Видъ этот до сихъ поръ былъ найденъ только въ европейской Турціи, Далмациі и около Сарепты.

*S. sexmaculatus* Rb.

Петровскъ—по садамъ, множество личинокъ въ различной степени развитія, въ іюль; полная насѣкомая въ концѣ іюля и августѣ. — Бакинская губ., Муганло на Алазани, Мушавери, Манглисъ (Х.).

*S. bicolor* L.

*Cimex bicolor* Lin., Fn. Svec. p. 250. 936.

*C. nubilosa* Harris, Exp. Engl. Ins. p. 90. tab. XXVI. fig. 8.

*Schirus bicolor* Fieb., Eur. Hem. p. 368. 7.

*Canthophorus bicolor* M.R., Hist. pun. Fr. II. 1. 58. 2.

Зарялъ, Манглисъ, Екатеринфельдъ, Залка (Х.).

Общеевропейский видъ, впервые замѣченный на Кавказѣ. Коленати принималъ за него другой, болѣе распространенный на югѣ, видъ — *S. sextaculatus* Ramb.

*S. dubius* Scop.

Петровскъ, — въ теченіи іюня въ пескахъ, подъ сухимъ навозомъ, многочисленными колоніями полныхъ насѣкомыхъ и личинокъ разныхъ возрастовъ, въ іюль — по одиночкѣ у корней растеній. Въ массѣ типическихъ формъ, мною было найдено три экземпляра чернаго цвѣта — var. *melanopterus* HS. Эта же разновидность замѣчена въ русской Армениі (Х.).

*S. maculipes* M.R.

*Cydnus* — M.R., Ann. Soc. Linn. Lyon 1852. p. 78.

*Schirus* — Fieb., Eur. Hem. p. 368. 6.

*Canthophorus* — M.R., Hist. pun. Fr. II p. 65. 5.

Елизаветталь (Х.).

Видъ этотъ очень близокъ къ описанному мною съ Кавказа — *S. congener* и можетъ быть д-ръ Хорватъ принялъ именно этотъ послѣдній видъ за *S. maculipes*, который до сихъ поръ известенъ только изъ южной Франціи и Италии.

*Gnathocomus* Fieb.

*G. albomarginatus* Fab.

Манглисъ, Сурамъ, Екатеринфельдъ, Ахъ-Булахъ (Х.).

*G. picipes* Fall.

Петровскъ, — нерѣдко въ пескахъ, на растеніяхъ и у ихъ корней.

*Ochetostethus* Fieb.

*O. nanus* HS.

Бакинская губернія (Х.).

Subf. Pentatomidae.

*Sciocoris* Fall.

*S. terreus* Schr.

Елизаветталь (X).

*S. macrocephalus* Fieb.

Петровскъ—не рѣдко, у корней растеній.

*S. Helferi* Fieb.

*S. Helferi* Fieb., Rhynchosotgr. p. 25. 20.—Fieb., Eur. Nem p. 361. 17. — MR.  
Hist. pun. Fr. II. p. 114. 7.

*S. lusitanica* HS., in PZ., Fn. Germ.—Gorsky, Anal. p. 67. 38.

Часто у корней растеній въ окрестностяхъ Петровска; видъ новый какъ для Кавказа, такъ и для русской фауны вообще; онъ также обыкновенъ въ Крыму, откуда его доставилъ въ большомъ количествѣ экземпляровъ М. М. Усовъ.

*Apodiphus* Spin.

*A. amygdali* Germ.

Нахичевань (X).

*Carenoplystus* Jak. (n. gen.).

*C. Fixeni* Jak. (n. sp.).

Новый родъ и видъ, описание котораго печатается въ московскомъ Bulletin, относится къ группѣ *Halyaria* Stål, заключавшей въ себѣ, въ фаунѣ Европы, только два рода—*Mustha* Am. и *Apodyphus* Spin., отъ которыхъ новый родъ отличается склеровыми отростками, вытанутыми въ очень длинные, прямые шипы и четырехсуставчатыми усиами; форма эта, напоминающая по своему habitus, *Ialla dumosa*, была открыта д-ромъ К. А. Фиксеномъ, во время путешествія его

по Кавказу въ 1875 году, около деревни Семеновки, на высотѣ 6000 футъ.

*Aelia* Fab.

*A. acuminata* L.

Баку, Манглисъ (X).

*A. Burmeisteri* Küst.

Stet. Ent. Zeit. 1852. p. 392. 3. tab. III fig. 2. — Fieb., Eur. Hem. p. 353. 6. — Fieb., Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1868. XVIII. p. 467. 2. tab. V. fig. 2.

Баку, Еленендорфъ (X),  
Западноевропейскій видъ, впервые найденный въ фаунѣ  
Россіи.

*A. rostrata* Boh.

Муганло, Манглисъ (X).

*Neottiglossa* Curt.

*N. lineolata* MR.

*Pentatoma lineolata* MR., Ann. Soc. Linn. Lyon. 1852. p. 84. — Muls., Opusc. Ent. I. p. 103. *Aeliodes* — MR., Hist. pun. Fr. II. p. 149. 3.

Манглисъ (X). — До сихъ поръ этотъ видъ былъ извѣстенъ только изъ южной Франціи и Испаніи.

*N. leporina* HS.

Баку, Манглисъ (X).

*Onydia* MR.

*O. bipunctata* Fab.

Боржомъ, Манглисъ (X).

*Eusarcoris* Hahn.

*E. inconspicuus* HS.

Елизаветталь (Х.).

*Palomena* MR.

*P. viridissima* Poda.

Мангистъ, Сурамъ (Х.).

*Agatharchus* Stål.

Enum. Hem. V. p. 57.

*A. montanus* Jak.

*Barbiger montanus* Jak., Тр. Русск. Энц. Общ. 1879. XII. стр. 40.

Два экземпляра этого вида были найдены А. Беккерсом около аула Ахты.

Название рода данное Штолемъ за годъ раньше описанія, какъ имѣющее первенство, должно замѣстить родовое название *Barbiger* (Тр. Русск. Энц. Общ. 1877. стр. 87).

*A. jalloides* Stål.

*Barbiger Saundersi* Jak., Тр. Русск. Энц. Общ. 1877. X. стр. 89. 25.  
*Agatharchus jalloides* Stål, Enum. Hem. 1876. V. p. 76, 2.

Видъ этотъ встрѣчающійся въ сѣверной Персіи, приденъ мною здѣсь лишь съ цѣлью установить его правильное синонимику. Не смотря на крайне краткую диагнозу въ данную Штолемъ, не можетъ быть сомнѣнія, что его *jalloides* тождественъ съ описаннымъ мною — *B. Saundersi*. Такъ какъ только одинъ этотъ видъ, изъ четырехъ или пяти относящихся къ этому роду, не имѣть на переднеспинкѣ щитка продольной свѣтлой полосы.

*Peribalus* MR.

*P. vernalis* Wolff.

Бакинская губернія (Х.).

*P. inclusus* Dohrn.

*Pentatoma* — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. 1860. p. 103.

*Peribalus* — MR., Hist. pun. Fr. II. p. 266.

Два экземпляра получены мною, черезъ посредство О. И. Радошковскаго, изъ окрестностей Араката. Единственное мѣстонахожденіе этого вида до сихъ поръ, было окрестности Сарепты.

*Carpocoris* Rti.

*C. melanocerus* MR.

Акъ-Булахъ (Х.) — Петровскъ только одинъ экземпляръ.

*C. verbasci* DG.

Муганская степь, Мамудлы (Х.).

*Pentatoma* Oliv.

*P. pinicola* MR.

MR., Ann., Soc. Linn. Lyon. 1852. p. 89. — Fieb., Eur. Hem. p. 336. 2 — MR.  
Hist. pun. Fr. II p. 274. 2.

*P. macrorampha* Fieb., Eur. Hem. p. 336. 1.

*P. planiuscula* Reut., Notis. Fenn. 1875. XIV. p. 328. 1.

Манглісь (Х.).

Распространеніе этого вида по Россіи мало извѣстно; онъ замѣченъ только въ Финляндіи, Лифляндіи и Московской губерніи.

*Brachynema* MR.

*B. virens* Klug.

Петровскъ — нерѣдко.

*B. signatum* Jak.

Три экземпляра изъ окрестностей Тифлиса, отъ А. Г. Севастьянова.

*Nezara Am.* S.

*N. prasina* Lin.

Ленкорань (Х.)

*Piezodorus* Fieb.

*P. incarnatus* Germ.

Петровскъ, — изрѣдка въ несвѣхъ; на *Eleagnus angustifolius*.

*Tropicoris* Hahn.

*T. rufipes* Lin.

Манглисъ (Х.).

*T. nigricornis* Reut.

Reut., Öfv. Fins. Vet. Soc. Förh. 1878—79. XXI. p. 1. 1.

Видъ, недавно описанный Рейтеромъ, изъ Имеретіи.

*Strachia* Hahn.

*S. picta* HS.

Var. *maracandica* Osch., Мамуды (Х.).

*S. dominula* Harr.

Зарьялъ (Х.).

*Acanthosoma* Grrt.

*A. haemorrhoidalis* L.

Манглисъ (Х.).

Fam. **Coreides.**

*Centrocarenus* Fieb.

*C. spiniger* Fab.

Елизаветталь, Аютино (Х) — Петровскъ.

*C. Volkemi* Put.

Put., Bull. Soc. Ent. Fr. 1878. № 17. p. 173.

*C. coroniceps* Jak., Tr. Русск. Энг. Общ. 1879. XII. p. 52.

Лагодехи (Пютой).  
Название Пютойа, какъ данное годомъ ранѣе, должно  
имѣть пріоритетъ.

*Enoplops* Am. S.

*E. scapha* Fab.

Манглисъ (Х.).

*Bathysolen* Fieb.

*B. nubilis* Fall.

Сурамъ (Х.).

*Spathocera* Stein.

*S. lobata* HS.

*Pseudophlaeus lobatus* HS., Wanz. Jns. VI. p. 6 fig. 561.

*Syromastes obscurus* Germ., Fn. Eur. p. 22. 11.

*Spathocera lobata* Stein, Berl. Ent. Z. 1860 p. 254. 2.—Fieb., Eur. Hem. p. 216. 3.—MR., Hist. pun. Fr. III. p. 101. 3.

Петровскъ — одинъ экземпляръ. — Елизаветталь (Х.).

*Pseudophlaeus* Burm.

*P. Fallenii* Schill.

Петровскъ — во множествѣ, въ теченіи всего лѣта, у корней растеній, въ пескахъ, въ степи и по предгоріямъ.

P. Waltli HS.

*Coreus Waltli* HS., Fn. Germ. p. 127. 6.

*C. hispanus* Rb., Fn. Andal. II. p. 184. 4.

*Pseudophlaeus Waltli* Fieb., Eur. Hem. p. 218. 3.—MR., Hist. pun. Fr. III. p. 86. 1.

Петровскъ — вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ, но очень рѣдко, такъ что мною найдено только четыре экземпляра. — Елизаветталь (Х.)

*Ceraleptus Costa.*

*C. gracilicornis* HS.

Петровскъ — въ одномъ экземплярѣ. Баку (Х.).

*Coreus Fab.*

*C. scabricornis* PZ.

Петровскъ — изрѣдка, по садамъ.

*C. hirticornis* Fab.

Манглисъ (Х.).

*C. hirsutus* Fieb.

Fieb., Eur. Hem. 221. 3.

Сурамъ (Х.).

*Verlusia Spin.*

*V. rhombea* L.

Петровскъ — изрѣдка, по садамъ. — Тифлисъ, Баку, Манглисъ (Х.).

*V. sinuata* Fieb.

Рѣка Храмъ (Х.).

*Gonocerus* Latr.

*G. venator* Fab.

Баку, р. Храмъ (Х.).

*Camptopus* Am. S.

*C. lateralis* Germ.

Баку, Манглисъ, Еленендорфъ (Х.). — Петровскъ.

*Alydus* Fab.

*A. calcaratus* L.

Петровскъ — изрѣдка, по садамъ.

*Stenocephalus* Latr.

*S. agilis* Scop.

Петровскъ — изрѣдка. — Баку, Мамудлы (Х.).

*S. neglectus* HS.

Баку, Манглисъ, Сурамъ (Х.).

*Corizus* Fall.

*C. abutilon* Rossi.

*Cimex abutilon* Rossi, Fn. Etr. II. p. 242. 1325.

*Coreus crassicornis* Fab., Syst. Rh. p. 201. 4.

*Rhopalus abutilon* Fieb., Eur. Hem. p. 233. 2.—MR., Hist. pun. Fr. III  
p. 115. 1.

Петровскъ — изрѣдка по садамъ. — Манглисъ, Муганская степь (Х.).

*C. crassicornis* Lin.

Акъ-Булахъ, Мушавери (Х.). — Петровскъ.

*C. hyalinus* Fab.

Бакинская губернія (Х.).

*C. capitatus* Fab.

Елизаветталь, Сурамъ (Х.).

*C. parumpunctatus* Schill.

Манглисъ (Х.).

*C. tigrinus* Schill.

Петровскъ—нерѣдко.—Елизаветталь, Зарялъ (Х.).

*Agraphopus* Stål.

*A. ornatulus* Jak.

Tr. Русск. Энт. Общ. 1880. XI. стр. 14, 9.

Этотъ красивый видъ найденъ мною въ юль 1879 г. въ окрестностяхъ Петровска, въ пескахъ, у корней растеній.

*Myrmus* Hahn.

*M. miriformis* Fall.

Петровскъ—въ одномъ экземплярѣ.

Fam. *Berytides*.

*Neides* Latr.

Hist. Nat. XII. p. 209.

*N. tipularis* L.

*Cimex*—Lin., Fn. Svec. p. 258, 973.

*Berytus*—Fab., Syst. Syst. Rh. p. 264, 1.

*Neides*—Fieb., Eur. Hem. p. 209, 3.—MR., Hist. pun. Fr. III p. 203, 1.

*N. parallelus* Fieb., Wien. Ent. Mon. 1864 p. 323.—MR., Hist. pun. Fr. III. I 207, 2.

Елизаветталь (Х.).

Общеевропейскій видъ, распространенный повсемѣстно въ Россіи, кромѣ степей.

*Berytus* Fab.

*B. geniculatus* Fieb.

Видъ этот до сихъ поръ извѣстный только изъ Швейцаріи и Франціи, встрѣчался мнѣ въ Петровскѣ — во множествѣ, въ іюлѣ, въ пескахъ, у корней растеній; кроме того одинъ экземпляръ имѣю изъ Дербента, отъ А. В. Комарова.

Fam. *Lygaeides*.

*Lygaeus* Fab.

*L. venustus* Boeb.

Петровскъ — изрѣдка по степи и садамъ. — Баку, Тифлисъ (X.).

*L. saxatilis* Scop.

Елизаветталь (X.).

*L. arnans* Rossi.

Долина р. Храма, Сурамъ (X.).

*L. Tristami* DS.

*Lygaeosoma Tristami* Dougl. et Scott, Ent. Monthly Magaz. 1868. V. p. 31, 23.  
*Lygaeus punctum* Kti., Mel. Ent. II. p. 75, 40.  
*L. affinis* Jak., Bull. Mosc. 1875. IV. p. 257. tab. I. fig. 1.

Петровскъ — изрѣдка между камнями, по предгоріямъ. — Баку, Елизаветталь (X.).

Имѣя возможность сличить сирійскіе экземпляры этого вида съ кавказскими, я убѣдился что описанный мной *L. affinis* есть настоящій — *L. Tristami*.

*L. punctatoguttatus* Fab.

Муганская степь (X.).

*Lygaeosoma* Spin.

*L. reticulatum* HS.

Петровскъ—нерѣдко, по землѣ.—Коди (Х.).

*Arocatus* Spin.

*A. melanocephalus* Fab.

Сурамъ (Х.).

*Nysius* Dall.

*N. maculatus* Fieb.

Eur. Hem. p. 168, 2.

Бакинская губернія (Х.).

Западноевропейская форма, впервые замѣченная въ фаунѣ Россіи.

*N. punctipennis* HS.

Петровскъ—изрѣдка по садамъ.

*N. senecionis* Schill.

*Heterogaster senecionis* Schill., Beitr. Zur. Ent. 1829, I. p. 87, 5. tab. VIII.  
fig. 1.

*Artheneis cymoides* Spin., Ess. H  m. p. 252. 1.

*Nysius senecionis* Fieb., Eur. p. 169, 6.—Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 23, 3.—  
Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 16, 4.

Мушавери (Х.).

Общееевропейскій видъ, распространеніе котораго по Россіи  
мало известно, такъ какъ обыкновенно смѣшиваются съ *N. Thymi* Wolff..

*N. helveticus* HS.

*Heterogaster ericae* Boh., Vet. Ak. Handl. 1849, p. 245.

*Cymus helveticus* HS., Wanz., Ins., IX. p. 208.

*Nysius obsoletus* Fieb., Eur. Hem. p. 170, 9.

*N. punctipes* Jak., Тр. Русс. Энт. Общ. 1871. VI. стр. 8, 14.

*N. helveticus* Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 23, 4. — Put., Syn. Hem. Fr. I p.  
17, 5.

Петровскъ, — очень рѣдко по садамъ.

До сихъ поръ, въ фаунѣ Россіи, видъ этотъ былъ замѣченъ въ двухъ, очень отдаленныхъ другъ отъ друга, мѣстонахожденіяхъ — въ Финляндіи и Астраханской губерніи.

*Cymus* Hahn.

*C. claviculus* Fall.

Бакинская губ., Сурамъ (Х.).

*Kleidocerus* Westw.

*K. resedae* Pz.

Сурамъ (Х.).

*Ischnodemus* Fieb.

*I. sabuleti* Fall.

Бакинская губ., Боржомъ (Х.).

*Dimorphopterus* Stål.

Ofcr. Vet. Ak. Förh. 1872. p. 44.

*D. Signoreti* Kusch.

*Ischnodemus* — Kusch., Hor. Soc. Ent. Ross. 1861. I. p. 69. tab. I. fig. 4.

Закавказье (Х.).

Другое известное мѣстонахожденіе этого вида — Астраханская губернія.

*Geocoris* Fall.

*G. grylloides* L.

*Cimex* — Lin., Fn. Svec. p. 246, 910.

*Ophthalmicus* — Fieb., Ent. Mon. p. 123, 17, tab. X. fig. 7.—Fieb., Ent. Hem. p. 175, 3.—Flor., Rr. Livl. p. 306, 1.

*Geocoris* — Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 35, 1.—Put., Sun. Hem. Fr. p. 24, 2.

Дербентъ, отъ А. В. Комарова.

Обыкновенная общеевропейская форма, распространенная по всей Россіи и въ Сибири.

*G. pubescens* Jak.

*Ophthalmiticus*—Jak., Тр. Русск. Энт. Общ. 1871. VI. p. 29, 8, tab. I. fig. 7.

Петровскъ, — два экземпляра въ пескахъ.

*G. albipennis* Fab.

Петровскъ, — у подножія горъ и въ степи, нерѣдко, небольшими колоніями въ густой травѣ.

*Artheneis* Spin.

*A. hircanica* Kti.

Екатеринфельдъ (X.).

*Microplax* Fieb.

*M. interrupta* Fieb.

Елизаветталь (X.).

*Macroplax* Fieb.

*M. fasciatus* HS.

Сурамъ (X.).

*Oxycarenus* Fieb.

*O. collaris* Muls.

Петровскъ, — обыкновеній въ пескахъ, на сложноцвѣтныхъ растеніяхъ, особенно на отцвѣтшихъ головкахъ *Centaurea* sp.

*Paromius* Fieb.

*P. leptopoides* Bär.

Екатеринфельдъ (X.).

*Rhyparochromus* Curt.

*R. hirsutus* Fieb.

Закавказье (X.).

*R. sabulicola* Th.

*Lygaeus*—Thoms., Opusc. Ent. 1870. II, p. 190, 23.

*Rhyparochromus*—Put., Syn. Hem. Fr. I, p. 52, 14.

Сурамъ, Мамудлы (X.).

*R. Lederi* Horw.

Term. Füz. 1880. IV, p. 2, 2.

Новый видъ, описанный д-ромъ Хорватомъ, по экземплярамъ, найденнымъ Ледеромъ въ Закавказье, безъ точнаго определенія мѣстонахожденія.

*R. antennatus* Schill.

*Pachymerus*—Schill., Beitr. z. Ent. I, 1829. p. 76, 18. tab. VIII, fig. 10.—Flor. Rh. Livl. p. 252. 18.

*Megalonus*—Fieb., Eur. Hem. p. 181, 11.

*Rhyparochramus*—Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 53. 1.—Put., Syn. Hem. Fr. I, p. 49, 1.

Мамудлы (X.).

*R. praetextatus* HS.

*Pachymerus*—HS. Wz. Ins. IV, p. 12. fig. 357.

*Megalonus*—Fieb., Eur. Hem. p. 181, 3.

*Rhyparochramus*—Horw. Mon. Lyg. Hung. p. 53. 6.—Put. Syn. Hem. Fr. I p. 50, 3.

Мушавери (X.)—Дербентъ (Комаровъ).

*Tropistethus* Fieb.

Eur. Hem. p. 184.

*T. holosericeus* Scholtz.

*Pachymerus*—Sch., Arb. und Veränd. 1845. p. 19, 2.

*P. sabuleti* HS., Wz. Ins. II. p. 120. fig. 201.

*Tropistethus ochropterus* Fieb., Eur. Hem. p. 184.

*T. sabuleti* Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 51. 1.

*T. holosericeus* Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 44, 1.

Дербентъ — нерѣдко, судя по количеству экземпляровъ, полученныхъ мною отъ А. В. Комарова. — Екатеринфельдъ, Сурамъ (Х.).

*Pterotmetus* Am. S.

*P. staphylinoides* Burm.

Мамудлы (Х.).

*Ischnocoris* Fieb.

*I. hemipterus* Schill.

Мамудлы (Х.).

*I. punctulatus* Fieb.

Eur. Hem. p. 180. 1. — Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 84. 2. — Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 48. 2.

Елизаветталь (Х.).

*Pionosomus* Fieb.

Eur. Hem. p. 185.

*P. varius* Wlff.

*Lygaeus*—Wolff, Icon. Cim. IV. p. 148. fig. 142.

*Macroderma*—Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 57, 1.

*Pionosomus*—Fieb., Eur. Hem. p. 185.—DS., Brit. Hem. p. 195. tab. VII, fig. 3.—Put., Syn. Hem. Fr. I, p. 48.

Петровскъ, изрѣдка въ степи, по горнымъ мѣстамъ.

*Lamprodema* Fieb.

*L. maurum* Fab.

Батумъ (А. В. Комаровъ).

*Plinthisus* Westw.

*P. pusillus* Schltz.

*Pachymerus*—Sch., Arb. und Veränd. 1846. p. 145, 20.

*Rhyparochromus coleoptratus* Sahlb., Mon. Geoc. Fenn. p. 60, 10.

*Plinthicus pucillus* Fieb., Eur. Hem. p. 178, 1.—Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 59, 1.—Horw., Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1876. p. 726, 3.

*P. latus* Reut., Notis. Fenn. 1870. XI. p. 320, 1, fig. 5.

Закавказье (X.).

*P. brevipennis* Latr.

Закавказье (X.).

*P. longicollis* Fieb.

Eur. Hem. p. 178, 5.—Horw., Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1876. p. 731. 8.—Put., Syn. Hem. Fr. I p. 46. 6.

*P. flavipes* Fer., Ann. Mus. Civ. di Genowa VI. 1874. p. 156, 158.

*P. pubescens* Fer., I. c. p. 158.

Петровскъ,—изрѣдка въ пескахъ, у корней растеній.

*Lasiosomus* Fieb.

Eur. Hem. p. 185.

*L. enervis* H.S.

*Pachymerus*—H.S., WZ. Ins. VI. p. 57, fig. 618.

*Lasiosomus*—Fieb., Eur. Hem. p. 186.—Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 61.—Put. Syn. Hem. Fr. I. p. 52.

Елизаветталь (X.).

*Stygnus* Fieb.

*S. pedestris* Fall.

Мамудлы (X.).

*S. arenarius* Hahn.

Петровскъ, довольно часто, небольшими колоніями у корней растеній, какъ въ пескахъ, такъ и по предгоріямъ.—Елизаветталь (X.).

*Peritrechus* Fieb.

*P. meridionalis* Put.

Pet. Nour. Ent. 1877. № 168. p. 117. 2.—Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 56, 5.

Закавказье (Х.).

Видъ недавно отличенный Пютономъ, встрѣчающійся въ южной Франціи и Сиріи.

*P. gracilicornis* Put.

Pet. Nouv. Ent. 1877, № 168. p. 117, 1.—Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 55, 2.

Манглісъ, Елизаветталь (Х.).

Оба эти вида впервые найдены въ фаунѣ Россіи.

*P. angusticollis* Sahlb.

Петровскъ—нерѣдко.—Бакинская губ. (Х.).

*P. geniculatus* Hahn.

Мамудлы (Х.).

*P. nubilis* Fall.

*Lygaeus nubilis* Fall., Mon. Cim. Sv. p. 65 6.

*Rhyparochromus irroratus* Curt, Br. Ent. XIII. p. 612, 22.

*Peritrechus nubilis* Fieb., Eur. Hem. p. 184, 2.—Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 66, 1.—Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 55, 3.

Бакинская губернія (Х.).

*Trapezonotus* Fieb.

*T. agrestis* Fall.

Тапарованъ, Бакинская губ. (Х.).

*T. Beckeri* Frey.

Петровскъ—въ одномъ экземпляре.—Бакинская губ. (Х.).

*T. breviceps* Jak. (n. sp.).

Батумъ (А. В. Комаровъ).

Описаніе этого вида печатается въ Московскомъ Bulletin.

*Pachymerus* Lep.

*P. Rolandri* L.

Мамудлы, Манглисъ (Х.).

*P. lynceus* Fab.

Мамудлы (Х.).

*P. consors* Horw.

*Isis*, 1878 р. 7. 99.

Одинъ женскій экземпляръ этого новаго вида найденъ былъ д-ромъ Шнейдеромъ въ Бакинской губерніи, въ маѣ; кромѣ того, известны еще два экземпляра изъ окрестностей Бруссы, въ Anatolії.

*P. phoeniceus* Rossi.

Мамудлы, Манглисъ (Х.).

*P. vulgaris* Schill.

На Ріонѣ, Манглисъ (Х.). — Петровскъ, въ одномъ экземплярѣ, у подножія горъ, между кустарниками.

*P. pineti* H.S.

Манглисъ (Х.). — Петровскъ — вмѣстѣ съ предыдущимъ, но встрѣчается чаще его.

*P. pini* L.

Мамудлы (Х.).

*P. caffer* Thunb.

Елизаветталь, Ганджа, Мамудлы, Манглисъ (Х.). — Петровскъ — обыкновененъ по садамъ.

P. quadratus Tab.

Мамудлы, Залка (Х.). Петровскъ одинъ экземпляръ въ степени.

*Beosus Am. S.*

*B. erythropterus Brull.*

Бакинская губ., на Рионѣ, Елизаветталь, Мамудлы (Х.).—Петровскъ—нерѣдко по садамъ.

*B. luscus Fab.*

Мамудлы, Мушавери (Х.)—Петровскъ, вмѣстѣ съ предыдущимъ нерѣдко.

*Ischnopeza Fieb.*

*I. scaphula Bär.*

Елизаветталь (Х.).

*Emblethis Fieb.*

*E. verbasci Fab.*

Манглисъ, Сурамъ, Мамудлы (Х.).

*E. ciliatus Horw.*

Мамудлы (Х.).

*E. arenarius L.*

Бакинская губ., Мамудлы (Х.).—Петровскъ, у корней растеній, въ пескахъ, нерѣдко.

*Eremocoris Fieb.*

*E. plebejus Fall.*

*Lygaeus plebejus Fall.*, Mon. Cim. Sv. p. 67, 11.

*Pachymerus sylvaticus* Hahn, Wz. Ins. I. fig. 33.

*Eremocoris plebejus* Fieb., Eur. Hem. p. 182. 2.—Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 89. 1.—Put., Syn. Hem. Fr. I, p. 72, 2.

Сурамъ, Аль-Булахъ (Х.).

*E. icaunensis* Pop.

*Populus*, Cat. Hém. de l'Yonne 1874. p. 28.—Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 89, 2.  
tab. 1. fig. 15.

*E. alpinus* Garb., var. *icaunensis* Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 73, 3.

Закавказье (X.).

*Drymus* Fieb.

*E. sylvaticus* Fab.

Шаттагъ, Мамудлы (X.). — Петровскъ — одинъ экземпляръ  
въ саду.

*D. brunneus* Sahlb.

Долина Алгета, Мамудлы, Мушавери, Сурамъ, Аксъ-Бу-  
лахъ (X.).

*D. pilicornis* MR.

Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 71, 6.

Мамудлы (X.).

*Scolopostethus* Fieb.

*S. affinis* Schill.

{ Мушавери (X.).

*S. pictus* Schill.

Аксъ-Булахъ (X.).

*S. decoratus* Hahn.

*Pachymerus*—Hahn, Wz. Ins. I. p. 189. fig. 71.

*Scolopostethus*—Rt., Ann. Soc. Ent. Fr. 1874. IV. p. 561, 7.—Horw., Mon. Lyg.  
Hung. p. 87, 4.—Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 75, 5.

*S. ericetorum* Leth., Cat. Hem. du Nord. 1769. p. 25.

*Lygaeus melanocerus* Thoms., Op. Ent. II. p. 202, 56.

Лайдапи (X.).

S. pilosus Reut.

*S. affinis* Fieb., Eur. Hem. p. 189. 6.

*S. pilosus* Reut., Ann. Soc. Ent. Fr. 1874. IV. p. 562, 10.—Horw., Mon. Lyg. Hung. p. 88, 5.—Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 75, 6.

Мамудлы (X.).

L. Lethierryi Jak.

Bull. Mosc. 1877. II. p. 285.—Horw., Isis. 1879. p. 95.

Мамудлы,—въ декабрѣ Ледерь нашелъ во множествѣ подъ опавшими листьями и сѣнными кучами.

*Notochilus* Fieb.

N. contractus HS.

*Pachymerus*—HS., Wz. Ins. IV. p. 97. fig. 440.

*Scolopostethus*—Fieb., Eur. Hem. p. 188, 1.

*Taphropeltus*—Horw., Mon. Lyg. Hung., p. 93. 1.

*Notochilus*—Put., Syn. Hem. Fr. I. p. 76, 2.

Елизаветталь (X.).

N. flavipes Fieb.

Бакинская губ. (X.).

Heterogaster Schill.

H. artemisiae Schill.

Петровскъ—изрѣдка по садамъ.

H. nepetae Fieb.

Мамудлы, Мантисъ (X.).

Fam. Tingitides.

Piesma Lep.

P. Laportei Fieb.

Сурамъ (X.).

P. Kolenatii Fieb.

Петровскъ — очень рѣдко по садамъ.

P. viridis Jak.

*Zostenus*—Jak.. Тр. Русск. Энт. Общ. 1871. VI. стр. 7, 7. — Тр. Русск. Энт. Общ. 1873. VII. стр. 26, 18. таб. I. фиг. 14.

Петровскъ, рѣдко въ садахъ.

Cantacader Am. S.

C. quadricornis Lep.

*Piesma*—Lep. Serv., Enc. Méth. X. p. 658.

*Cantacader*—Fieb., Eur. Hem. p. 118, 1.—Put.. Syn. Hem. Fr. p. 88, 1.

*Taphrostethus Staudingeri* Bär., Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 205. tab. 1. fig. 10.

Лайллаши (Х.).—Батумъ (Комаровъ).

Въ первомъ спискѣ кавказскихъ полужестокрылыхъ видъ этотъ опредѣленъ мною какъ *C. Staudingeri* Bär., но, по мнѣнію Плютона, установленный Беренштрунгомъ видъ есть настоящій *C. quadricornis* Lep.

Serenthia Spin.

S. depressa Jak.

*Agramma*—Jak., Bull. Mosc. 1874. II, p. 265. tab. X. fig. 6.

*A. minuta* Horw., Berl. Ent. Zeit. 1874. 333.

Видъ этотъ, извѣстный только изъ окрестностей Сарепты и въ послѣднее время найденный въ Венгріи, встрѣчался въ окрестностяхъ Петровска въ пескахъ, у корней растеній, во множествѣ, въ концѣ іюля.

Campylostira Fieb.

C. verna Fall.

Алгетъ (Х.).

*Orthostira* Fieb.

*O. musci* Schr.

Зарыядъ (X.).

*O. uniseriata* Put.

Pet Neuv. Ent. 1879. № 213 р. 297. 3.—Put., Syn. Hem. Fr. p. 94.

Соганлы-Дагъ, Сурамъ, Елизаветталь (X.).

*Dictyonota* Curt.

*D. erassicornis* Fall.

Закавказье (X.).

*Galeatus* Curt.

*G. inermis* Jak.

*Tingis*—Jak., Тр. Русск. Энт. Общ. 1874. VIII. р. 68. 150. таб. II, фиг. 8.

Дербентъ (Комаровъ).

*Tingis* Fab.

*T. pyri* Geoffr.

Соганлы-Дагъ, Сурамъ (X.).

*Eurycera* Lap.

*E. brevicornis* Jak.

Петровскъ—несколько экземпляровъ у подножія горъ.

*Monanthia* Lep.

*M. ampliata* Fieb.

HS. Wz. Ins. IV, p. 62. fig. 397.—Fieb., Ent. Mon. p. 59. 2. tab. V. fig. 10.—  
Fieb., Eur. Hem. p. 120. 3. Put., Syn. Hem. Fr. p. 108. 1.

*M. similis* D.S., Ent. M. Mag. V. p. 259. 9.

Петровскъ—редко по садамъ.—Дербентъ (Комаровъ).

*M. cardui* L.

*Cimex* — Lin., Fn. Sv. p. 247. 920.

*Monantha* — Fieb., Ent. Mon. p. 61. 3. tab. V. fig. 1.—Fieb., Eur. Hem. p. 120.

4.—Put., Syn. Hem.—Fr. p 108. 2.

Манглісъ, Мушавери (Х.).

*M. sinuata* Fieb.

Мушавери (Х.).

*M. echinopsidis* Fieb.

Петровскъ — изрѣдка въ садахъ.

*M. grisea* Germ.

Мушавери (Х.) — Петровсь — во множествѣ въ пескахъ, у корней растеній, небольшими колоніями.

*M. setulosa* Fieb.

Петровскъ — довольно часто въ іюнѣ, по предгоріямъ, на разныхъ растеніяхъ.

*M. pilosa* Fieb.

Ent. Mon. p. 79. 22. tab. VI. fig. 36.—Fieb., Eur. Hem. p. 122. 13.—Put.  
Syn. Hem. Fr. p. 114. 12.

*M. angusticollis* HS., Wz. Ins. I. p. 26. fig. 288.

Дербентъ (Комаровъ).

*M. geniculata* Fieb.

Елизаветполь, Елизаветталь, Мамудлы, Думанисъ (Х.). —  
Петровскъ — одинъ экземпляръ въ саду.

*M. Kiesenwetteri* MR.

*M. villosa* Costa, Cim. Regn. Neap. Cent. tab. VI. fig. 6.

*M. Kiesenwetteri* M R, Ann. Soc. Linn. Lyon. 1852. p. 135.—Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1874. p. 56—Put., Syn. Hem. Fr. II p. 115, 13.

Закавказье (Х.).

*M. caucasica* Jak.

Bull. Mosc. 1880. I. p. 137, 6.

Дербентъ (Комаровъ).

*M. dumetorum* HS.

HS., Wz. Ins. IV. p. 57. fig. 391.—Fieb., Ent. Mon. p. 82, 25. tab. VII. fig. 4.—Fieb., Eur. Hem. p. 125, 28.—Put., Syn. Hem. Fr. p. 120, 23.—DS. Brit. Hem. p. 246, 3. tab. IX. fig. 2.

Рѣка Храмъ, Манглисъ (Х.).

*M. simplex* HS.

Изрѣдка въ окрестностяхъ Петровска, въ пескахъ, на *Euphorbium* sp.

*M. platyoma* Fieb.

Петровскъ, одинъ экземпляръ въ саду.

*M. eryngii* Latr.

Долина рѣки Храма (Х.).—Петровскъ, нѣсколько экземпляровъ у корней растеній въ пескахъ.

*M. dilatata* Jak.

Bull. Mosc. 1880. I. p. 140, 9.

Дербентъ, Душетъ (Комаровъ).

*M. vesiculifera* Fieb.

Сурамъ (Х.).

*M. unicostata* MR.

Еленендорфъ, Екатеринфельдъ (Х.).—Петровскъ, въ безчисленномъ множествѣ въ пескахъ на листьяхъ серебристаго тополя (*Populus* sp.), гораздо рѣже у корней растеній. До сихъ поръ видъ этотъ извѣстенъ былъ въ Россіи только изъ киргизской степи Астраханской губерніи, гдѣ онъ держится

при тѣхъ же условіяхъ, т. е. на тополяхъ, растущихъ между барханами сыпучаго песка.

Fam. Aradides.

*Aradus* Fab.

A. versicolor H.S.

Кутаисъ, Сурамъ (Х.).

A. diversicornis Horw.

Jsis. 1879. p. 9. 188.

Два экземпляра изъ окрестностей Ленкорани (Х.).

A. depressus Fab.

Мамудлы (Х.).

A. dilatatus Duf.

Сурамъ, Акъ-Булахъ (Х.).

A. annulicornis Fab.

Syst. Rh. p. 118, 7.—Fieb., Eur. Hem. p. 113, 15.—Put., Syn. Hem. Fr. II, p. 134, 10.

Закавказье (Х.).

A. lugubris Fall.

Сурамъ (Х.).

A. betulae L.

Сурамъ (Х.).

*Aneurus* Curt.

A. laevis Fab.

Боржомъ, Зарьялъ (Х.).—Закаталы—во множествѣ (Комаровъ).

Fam. **Capsides.**

*Miris* Fab.

*M. calcaratus* Fall.

Мамудлы (Х.).—Петровскъ—одинъ экземпляръ.

*M. laevigatus* L.

Башкенитъ (Х.).

*Notostira* Fieb.

*N. erratica* L.

Мамудлы (Х.).—Петровскъ, изрѣдка по садамъ.

*Megaloceraea* Fieb.

*M. longicornis* Fall.

Петровскъ—одинъ экземпляръ въ саду.

*M. ruficornis* Fall.

Петровскъ — обыкновенецъ; часто влетаетъ въ комнаты  
ночью, на свѣтъ огня.

*Lopus* Hahn.

*L. bicolor* Fieb.

Wien. Ent. Monats. 1864. p. 328, 13.

Этотъ исключительно русскій видъ, открытый первона-  
чально въ Крыму, найденъ д-ромъ Шнейдеромъ у Муганло  
на Алазани.

*Phytocoris* Fall.

*P. varipes* Boh.

*Miris ulmi* Fab., Syst. Rh. p. 256, 17.

*Phytocoris ulmi* HS., Wanz. Ins. III. p. 9. fig. 234.—Fieb., Eur. Hem. p. 259, 5.

*P. varipes* Boh., Ent. Sodr. Sver. p. 107.—Reut., Ann. Soc. Ent. Fr. 1877. VII.  
p. 26, 40.

Петровскъ—нѣсколько экземпляровъ въ пескахъ, между деревьями.

? *P. obscurus* Reut.

Notis. Fenn. XIV. p. 331. 5.—Reut., Ann. Soc. Ent. Fr. 1877. VII. p. 19, 24.

Петровскъ—одинъ экземпляръ въ саду. Установленный Рейтеромъ видъ мнѣ въ натурѣ неизвѣстенъ, но, судя по описанію, найденная мною форма очень близка къ *P. obscurus*, или можетъ быть окажется самостоятельнымъ видомъ.

*Alloeonotus* Fieb.

*A. distinguendus* H.S.

Бакинская губ. (X.).

*Calocoris* Fieb.

*C. striatellus* Fab.

Манглисъ, Залка (X.).

*C. bimaculatus* H.S.

Анютино (X.).

*C. melanocephalus* Reut.

Манглисъ (Х.)—Видъ этотъ только недавно описанъ изъ Греціи.

*C. sanguineus* Jak. (n sp.).

Батумъ (Комаровъ). Описаніе этого вида печатается въ Московскомъ Bulletin.

*C. chenopodii* Fall.

Боржомъ (Х.).—Петровскъ — довольно обыкновененъ по садамъ.

*C. vandalicus* Rossi.

Бакинская губ. (Х.). — Петровскъ — обыкновенень по садамъ.

*C. seticornis* Fab.

Манглисъ (Х.). — Петровскъ — изрѣдка по садамъ.

*Brachycoleus* Fieb.

*B. scriptus* Fab.

Бакинская губ. (Х.).

*Lygus* Hahn.

*L. pratensis* Fab.

Тифлисъ, Баку, Мамудлы, Елизаветталь, Манглисъ, Еленendorфъ (Х.). — Петровскъ, обыкновенень.

*L. lucorum* Mey.

Манглисъ (Х.).

*Orthops* Fieb.

*O. Kalmi* L.

Залка, Ташарованъ (Х.). — Петровскъ, изрѣдка по садамъ.

*Cyphodema* Fieb.

*C. rubicundum* Fall.

*Phytocoris* — Fall., Hem. Sv. p. 92. 30.

*Capsus* — Sahlb., Mon. Genc. p. 111. 45.—Flor, Rh. Livl. p. 534. 36.

*Hadrodema* — Fieb. Eur. Hem. p. 278. 2.

*Cyphodema* — Reut., Rev. Caps. p. 63. 1.

Мушавери (Х.).

*Charagochilus* Fieb.

*C. Gyllenhalii* Fall.

Мамудлы, Елизаветаль, Ганджекентъ (Х.).—Петровскъ, изрѣдка по садамъ.

*Polymerus* Hahn.

*P. holosericeus* Hahn.

Wanz. Ins. I. p. 27. fig. 17.—Fieb., Eur. Hem. p. 271. 1.

Петровскъ, изрѣдка по садамъ.

*Poeciloscytus* Fieb.

*P. cognatus* Fieb.

Бакинская губ. (Х.).

*P. unifasciatus* Fab.

Петровскъ — во множествѣ, на *Xanthium strumarium*.

*P. vulneratus* Wolff.

*Lygaeus* — Wolff, PZ., Fn. Germ. p. 100. 22.

*Poeciloscytus* — Fieb., Eur. Hem. p. 277. 2.—Reut., Rev. Caps. p. 67. 4.

*Capsus Dalmani* Flor., Rh. Livil. p. 539. 45.

Петровскъ — рѣже предыдущаго вида.

*Campylocrochis* Fieb.

*C. punctulata* Fall.

Мамудлы (Х.).—Петровскъ — изрѣдка по садамъ.

*C. lutescens* Schll.

Манглисъ (Х.).

*Liocoris* Fieb.

*L. tripustulatus* Fab.

Манглисъ (Х.).

*Rhopalotomus* Fieb.

*R. cinctus* Kti.

Тифлисъ (X.).

*Pilophorus* Hahn.

*P. clavatus* L.

Еленендорфъ (X.).

*Orthocephalus* Fieb.

*O. saltator* Hahn.

Залка (X.).

*Gryllocoris* Bär.

*G. angusticollis* Bär.

Манглисъ (X.).

*Plagiorhamma* Fieb.

*P. suturalis* HS.

*Capsus* — HS., Wanz. Ins. IV, p. 32. fig. 363.

*Plagiorhamma* — Fieb., Verh. Zool. bot. Ges. Wien. 1870. XX, p. 251. tab. fig. 8.

Петровскъ, два экземпляра съ нецелыми надкрыльями (forma brach.), въ степи.

*Dicyphus* Fieb.

*D. errans* Wlff.

Елизаветталь, Мушаверъ (X.).

*D. pallidus* HS.

*Capsus collaris* Fall., Hem. Sv. p. 125. 19.

*C. pallidus* HS., Wanz. Jns. III. p. 51. fig. 269.

*C. constrictus* Boh., Nya Sv. Hem. p. 74. 32.

*Dicyphus pallidus* Fieb., Eur. Hem. p. 326. 2.—Reut., Rev. Caps. p. 112.

Елизаветталь (X.).

*Globiceps* Latr.

*G. sphaegiformis* Rossi.

Манглисъ (X.).

*G. fulvipes* Scop.

*Cimex* — Scop. Ent. Carn. p. 134. 388.

*Globiceps* — Reut. Cev. Baps. p. 118. 2.

*G. flavomaculatus* Fieb., Eur. Hem. p. 284. 5.

Манглисъ (X.).

*Camptotylus* Fieb.

Eur. Hem. p. 286.

*C. Reuteri* Jak.

Bull. de Mosc. 1881. I. p. 196. 3.

Петровскъ — во множествѣ на Тамарикѣ, въ теченіи юля, особенно въ видѣ личинокъ въ разныхъ стадіяхъ развитія. Эта вида столь же обыкновененъ и по всей Астраханской губерніи и въ Сарептѣ на томъ же растеніи.

*C. aphidooides* Jak.

Bull. de Mosc. 1881. I. p. 199. 4.

Изрѣдка въ Петровскѣ, на томъ же растеніи. По своему узкому туловищу и медленности движеній, очень напоминаетъ крылатыя формы изъ р. *Aphis*.

*Orthotylus* Fieb.

*O. flavosparsus* Sahlb.

Петровскъ, нерѣдко по сорнымъ мѣстамъ, на *Atriplex*.

*O. minutus* Jak.

Петровскъ, обыкновененъ на томъ же растеніи, и кромѣ того, по вечерамъ часто влетаетъ въ комнаты, на свѣтъ огня.

*O. eleagni* Jak.

Bull. de Mosc. 1881. I. p. 200. 5.

Петровскъ, нерѣдко на листьяхъ *Eleagnus angustifoliu* въ пескахъ и садахъ.

*O. rubidus* Fieb.

Петровскъ, очень рѣдко въ степи.

*Macrotylus* Fieb.

Eur. Hem. p. 317.

*M. solitarius* Mey.

*Capsus* — Mey., Rh. Schw. p. 83. 62. tab. V. fig. 4.

*Macrocoleus* — Fieb., Eur. Hem. p. 321. 8.—DS., Ent. Monthl. Mag. IV. p. 22 tab. II. fig. 4.

*Macrotylus* — Reut., Hem. Gymn. Eur. II. p. 202. 7.

Петровскъ, изрѣдка въ садахъ, на разныхъ Labiatae. Видъ впервые найденный въ фаунѣ Россіи.

*Cylindromelus* Fieb.

Eur. Hem. p. 393.

*C. setulosus* H.S.

*Capsus* — HS. Wanz. Jns. IV. p. 30. fig. 380.

*Cylindromelus* — Fieb. Eur. Hem. p. 393. 1.

*Oncotylus* — Reut., Hem. Gymn. Eur. II. p. 274. 1. tab. V. fig. 3.

Петровскъ, во множествѣ въ пескахъ, на *Centaurea* sp. причемъ полныя насѣкомыя держались не болѣе двухъ не дѣлъ въ началѣ іюля; позже этого времени весьма рѣдко попадались только одиночные особи. Видъ, до сихъ поръ известный только изъ южной Германіи и Венгрии и впервые найденный въ фаунѣ Россіи.

*Solenoxyphus* Reut.

*S. kirgisicus* Frey.

Петровскъ — одинъ экземпляръ въ степи.

*Leucopterum* Reut.

Hem. Gymn. Eur. II p. 259.

*L. candidatum* Reut.

Hem. Gymn. Eur. 1879. II, p. 260. 2.

Дербентъ (Беккеръ). Недавно описанный новый родъ, исключительно свойственный южнорусской фаунѣ.

*L. transversum* n. sp.

Ganz grün, oben dicht silberweiss — unten sehr fein gelb-behaart. Kopf so lang als breit, sehr dicht filzig behaart. Augen gross. Fühler weisslich, dünn, Glied 2 am Ende bräunlich, so lang als Hinterrand des Pronotum. Halbdecken bleich, am Ende bräunlich-grün; Cuneus weisslich, aussen gelb. Membran bleichbräunlich, Zellrippen weisslich, unter dem weissen Aussengrundwinkel ein brauner Randfleck. Schnabel weisslich, Wurzelglied am Ende — braun. Beine weisslich, fein behaart und lang weiss beborstet; Hinterschenkel am Ende bräunlich, schwärzlich punctirt. Klauen-glied und Klauen braun. L. 4—4 $\frac{1}{2}$  mm. — Derbent.

(♀) Яркозеленый, сверху густо покрытый серебристобѣлыми волосками, снизу же весьма нѣжными и очень короткими желтоватобѣлыми волосками. Голова большая, развитая одинаково какъ въ длину, такъ и въ ширину, съ очень выпуклыми большими глазами, покрытая густыми, въ видѣ войлока, волосками. Усики бѣловатые, тонкие, второй суставъ къ вершинѣ слегка бурѣющій и равный по длини заднему краю переднеспинки. Голова, также какъ и переднеспинка густаго, яркозеленаго цвѣта; ширина послѣдней лишь на половину болѣе длины; боковые ея края прямые. Щитокъ яркозеленый, съ желтоватымъ основаниемъ. Надкрылья блѣдно-зеленоватыя, на концѣ ихъ, вдоль мембранального шва, захватывая послѣднюю третью clavus'a, проходитъ широкая, зеленоватобурая полоса, покрытая черными волосками, тогда

какъ остальная поверхность надкрыльевъ одѣта бѣлыми волосками; сипеус бѣловатый, съ желтоватымъ наружнымъ краемъ. Перепонка блѣднобуроватая, съ ребрами почти бѣлаго цвѣта, или очень блѣднозеленоватыми; внутренность клѣтокъ безцвѣтная, съ вѣшней стороны ихъ, вдоль наружнаго края перепонки, помѣщается большое, темнобурое пятно, почти трехугольной формы; между этимъ пятномъ и концомъ сипеуса находится небольшое безцвѣтное, стекловидное пространство. Брюшко и части груди зеленаго цвѣта. Хоботокъ бѣловатый, первый суставъ его на концѣ бурый. Ноги бѣловатыя, покрыты вѣжными волосками и длинными щетинками бѣлаго цвѣта; бедра съ явственнымъ желтымъ оттенкомъ, а бедра послѣдней пары, въ верхней своей половинѣ, бурыя, съ рядами черноватыхъ точекъ на наружной ихъ сторонѣ. Конецъ послѣдняго сустава лапокъ и когти—бурые. Дл. 4— $4\frac{1}{2}$  мм.

Нѣсколько экземпляровъ изъ окрестностей Дербента, отъ А. Беккера.

Видъ этотъ болѣе всего похожъ на *L. longicolle* изъ Туркестана, но отличается густымъ, яркозеленымъ цвѣтомъ тулowiща и бедрами задней пары ногъ, покрытыми рядами черноватыхъ точекъ.

*Tuponia* Reut.

*T. elegans* Jak.

Петровскъ, — во множествѣ на кустахъ *Tamarix*.

*T. prasina* Fieb.

Петровскъ, — еще многочисленнѣе, на томъ же растенії.

*T. tamaricis* Perr.

*Capsus*—Perr., Nouv. esc. p. 86.

*Tuponia*—Reut., Hem. Gymn. Eur. II. p. 19. 3.

*Psallus notatus* Fieb., Eur. Hem. p. 307. 8.

Тифлисъ (Х.) — Петровскъ — изрѣдка на *Tamarix*.

*Auchenocrepis* Fieb.

*A. Reuteri* Jak.

Баку (Х). — Петровскъ, изрѣдка на Tamarix.

*Campylomma* Reut.

*C. lucida* Jak.

*Agalliastes* — Jak., Тр. Русс. Энт. Общ. IX. стр. 228. 6.

*Campylomma* — Reut., Hem. Gymn. Eur. I. p. 54. 3. et II. p. 296.

*C. viridula* Jak., Bull. Mosc. 1880. I. p. 143. 11.

♂. Ganz grünlich, Brustmitte schwarz. Augen sehr gross; Abstand zwischen beiden Augen so breit als Durchmesser des Auges. Fühlerglied 2 um  $\frac{1}{3}$  kürzer als Hinterrand des Pronotum.

Объ описанныя мною формы, какъ я убѣдился при точномъ сличеніи, составляютъ лишь цвѣтовыя разности одного и того же вида; тоже самое полагаетъ и Рейтеръ, видѣвшій экземпляры описанныхъ мною разновидностей. Съ Кавказа я имѣю лишь одинъ экземпляръ этого вида, — изъ Куруша, въ Астраханской же губерніи годами встрѣчается во множествѣ.

*C. simillima* n. sp.

Oberseite bleich bläulichgrün, schwarz beborstet und fein weisslich behaart. L.  $2\frac{3}{4}$  mm.

♂ Unterseite ganz schwarz. Fühler schwarz, Wurzelglied am Ende weisslich, Glied 3 und 4 schmutzigelb; Glied 2 stabförmig, dick, halb so kurz als Hinterrand des Pronotum. Augen mässig gross; Abstand zwischen beiden Augen viel breiter als Durchmesser des Auges.

♀ Unterseite grünlich. Fühler dünn, schmutzigweiss; Wurzelglied und Glied am Grunde breit schwarz.

Бѣдного зеленоватобѣлого цвѣта, съ поверхностью покрытою сильными, черными волосками и болѣе нѣжными бѣловатыми. Самцы отъ самокъ отличаются цвѣтомъ туловища

и строениемъ усиковъ. У ♂ все брюшко и грудь снизу чернаго цвѣта, второй суставъ усиковъ утолщенный, равный по толщинѣ первому; оба эти сустава чернаго цвѣта, за исключениемъ вершины первого, которая бѣловатая; глаза едва крупнѣе, чѣмъ у самки, такъ что промежутокъ между ними гораздо болѣе поперечнаго діаметра глаза. У самки туловище все зеленоватое, усики тонкіе, нѣжные, кромѣ основнаго сустава, бѣловатые; первый суставъ, за исключениемъ вершины, и широкое основаніе втораго — чернаго цвѣта. Въ остальномъ похожъ на *C. lucida* Jak. Дл. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> мм.

Видъ этотъ по общему *habitus* очень похожъ на *C. lucida*, но отличается отъ послѣдняго тѣмъ, что у ♂ все туловище зеленаго цвѣта, кромѣ средини груди, которая чернаго цвѣта; глаза сильно развиты, крупные, такъ что промежутокъ между ними равенъ поперечному діаметру глаза; второй суставъ усиковъ длиннѣе и болѣе утолщенъ, чѣмъ у *C. similis*, а черные волоски покрывающіе поверхность нѣжнѣе и гуще расположены. Самки этихъ двухъ видовъ трудно различимы между собою.

Петровскъ, — въ концѣ іюня не рѣдко на листьяхъ се-ребристаго тополя (*Populus sp.*), въ пескахъ.

*Atomoscelis* Reut.

Hem. Gymn. Eur. I. p. 67.

*A. onustus* Fieb.

*Agalliaestes* — Fieb., Eur. Hem. p. 312. 6.

*Atomoscelis* — Rt., Hem. Gymn. Eur. I. p. 68. 1. tab. IV. fig. 3.

Въ окрестностяхъ Петровска обыкновенень на *Atriplex laciniata*.

*Plagiognathus* Fieb.

*P. albibennis* Fall.

Петровскъ, изрѣдка въ степи, на полыни.

*P. fulvipennis* Kirschb.

*Capsus*—Kbm., Rh. Wiesb. p. 176. 31.

*Plagiognathus*—Fieb., Eur. Hem. p. 303. 3. Rt., Hem. Gymn. I. p. 76. 5. tab. IV, fig. 7.

Кавказъ.—Мѣстонахожденіе приведено у Рейтера (Hem. Gymn. Eur. II. p. 300.)

*P. plagiatus* Reut.

Pet. Nouv. Ent. 1878 № 152. p. 54. 4.—Rt., Hem. Gymn. Eur. I. p. 77. 7.

Видъ недавно открытый въ сѣверной Италии и оказавшійся свойственнымъ Кавказу, ближайшее мѣстонахожденіе котораго у Рейтера (I. c. II. p. 300) не указано.

*P. arbustorum* Fab.

Манглісъ (Х.).

*Psallus* Fieb.

*P. pumilus* Jak.

Петровскъ,—одинъ экземпляръ въ степи, на полыни.

Fam. *Anthocorides*.

*Temnostethus* Fieb.

*T. pusillus* HS.

*Anthocoris*—HS., Wanz. Ins. IX. p. 225. fig. 975.

*Temnostethus*—Fieb., Eur. Hem. p. 136. 1.—Reut., Oefv. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 417. 2.

*Anthocoris albofasciatus* Fieb., Weitenw. Beitr. p. 111.

*A. lugubris* Flor., Rh. Livil. p. 647. 2.

Кутаисъ (Х.).—Петровскъ—не рѣдко на разныхъ растеніяхъ, въ садахъ и въ степи.

*Anthocoris* Fall.

*A. memorum* L.

Залка; Мамудлы (Х.).

*A. memoralis* Fab.

Бакинская губернія, на Ріонѣ, Манглісъ (X.).

*Lyctocoris* Hahn.

*L. campestris* L.

Сурамъ, Мамудлы (X.).

*Piezostethus* Fieb.

*P. galactinus* Fieb.

*Anthocoris* — Fieb., Weitenw. Beitr. 1836. p. 107. 7.

*Piezostethus* — Fieb., Eur. Hem. p. 189. 1.— Reut., Oefv. Vet. Ak. Förh. 1871  
p. 411. 2.

*Xylocoris albipennis* Flor., Rh. Livl., p. 669. 3.

Мамудлы (X.).

*P. signatus* Jak.

Петровскъ, изрѣдка подъ камнями и у корней растеній.

*Triphleps* Fieb.

*T. minuta* L.

Мушавери (X.).

*T. nigra* Wlff.

Мамудлы (X.).

*Cardiastethus* Fieb.

Eur. Hem. p. 141. 44.

*C. rufescens* Costa.

*Anthocoris testaceus* Muls., Ann. Soc. Linn. Lyon 1852. p. 105.

*Cardiastethus testaceus* Fieb., Eur. Hem. p. 141. 1.

Манглісъ (X.).

*Myrmecobia* Bär.

*M. coleoptrata* Fall.

*Salda*—Fall., Mon. Cim. Sv. p. 31. 7.

*Myrmecobia*—Fieb., Eur. Hem. p. 133.—Rt., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 424.

*Bryocoris palustris* Fall., Hem. Sv. p. 152. 2.

*Microphysa myrmecobia* Märk., in Germ. Zeit. f. Ent. 1836. p. 262.

*M. Curtissii* Flor., Rh. Livl. p. 660.

*Idiotropus exilis* Fieb., Eur. Hem. p. 133. 2. (♂).

Боржомъ (Х.).

Fam. Saldides.

*Salda* Fab.

*S. lateralis* Fall.

Елизаветталь (Х.). — Петровскъ, очень обыкновененъ по берегамъ соленыхъ лужъ, у морского берега.

*S. orthochila* Fieb.

Мамудлы (Х.).

*S. saltatoria* L.

Боржомъ, Думанисъ, Елизаветталь (Х.).

*S. pallipes* Fab.

Петровскъ — обыкновененъ по берегамъ моря.

*S. cincta* H.S.

Дербентъ (Комаровъ).

*S. longicornis* n. sp.

Schwarz glänzend; Oberseite lang abstehend bewimpert und fein schuppenartig goldgelb behaart. Augen gross, sehr convex und kurz schwarz beborstet. Fühler lang, behaart; Glied 2 dünn, gleichlang als Glied 3 und 4 zusammen, Wurzelglied so lang als Glied 3; Glied 1 schwarz, am Ende weisslich, 2 rostgelblich, am Ende bleichbräunlich, 3 — schwarz, Endglied weisslich. Schna-

bel rostgelblich. Pronotum vorn sehr verengt, Seitenrand ausgeschweift. Halbdecken schwarz, matt, rostgelb gefleckt; Membran bleich, Rippen schwarzbraun. Beine rostgelblich, Schenkelende bräunlich, reihenweise schwarz punktiert. Schienenbeine am Ende schwarz. L.  $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Derbent.

Продолговатоовальной формы, черного цвета; наружная поверхность покрыта длинными стоячими бурыми щетинками и весьма мелкими чешуевидными волосками золотистого цвета. Глаза очень выпуклые, большие, покрыты короткими, черноватыми щетинками. Усики длинные, довольно толстые; второй сустав ихъ тоньше прочихъ и равенъ длиною третьему и четвертому взятымъ вмѣстѣ, первый суставъ равенъ третьему, а послѣдній нѣсколько короче каждого изъ нихъ; конецъ первого сустава и весь послѣдній — блестящего цвета, второй — рыжеватый, нѣсколько темнѣющій къ вершинѣ, а основной и третій черного цвета. Всѣ суставы усиковъ, кроме первого, покрыты довольно длинными, прилегающими волосками. Хоботокъ рыжеватый. Переднеспинка сильно суженная къ переду, съ боковыми краями, сильно вырѣзанными передъ шейнымъ угломъ. Переднеспинка и щитокъ блестящаго черного цвета; надкрылья черные, матовые, съ наружнымъ краемъ рыжеватаго цвета; по срединѣ corium и на концѣ clavus такого же цвета пятно; кроме того, у наружного конца corium надъ мембраннымъ швомъ помѣщается большое кругловатое пятно молочноблѣлого цвета. Перепонка свѣтлая, съ темнобурыми ребрами, клѣтки коихъ безъ всякихъ пятенъ. Ноги рыжія, бедра съ бурыми пятнами, расположеными рядами, концы ихъ буроватые; голени на концѣ черные. Дл.  $3\frac{1}{2}$ —4 мм.

Видъ этотъ очень близокъ къ *S. geminata*, но отличается отъ послѣдней, главнымъ образомъ, строениемъ и цветомъ усиковъ, какъ это видно изъ сравнительной таблички.

*S. geminata*, — второй суставъ усиковъ короткій, почти равный третьему, или на четверть его длиннѣе; третій су-

ставъ толще прочихъ, веретенообразный, нѣсколько длиннѣе первого. Суставы чернаго цвѣта, иногда второй суставъ рыжій; вершина первого всегда бѣловатая.

*S. longicornis* n. sp., второй суставъ усиковъ длинный, равный двумъ послѣднимъ взятымъ вмѣстѣ; первый суставъ толще прочихъ, равный третьему, который едва толще четвертаго. Первый и третій суставы чернаго цвѣта, второй рыжій, а послѣдній бѣлый или желтоватобѣлый; вершина первого сустава бѣловатая.

Дербентъ, нѣсколько экземпляровъ отъ А. В. Комарова.

Fam. **Reduviidae.**

*Nabis* Latr.

*N. lativentris* Boh.

Манглисъ, Залка, Мушавери, Сурамъ, Еленендорфъ, Мамудлы (Х.).

*N. brevipennis* Hahn.

Петровскъ, изрѣдка по садамъ.

*N. sareptanus* Dhrn.

Петровскъ, довольно обыкновененъ въ степи; по вечерамъ влетаетъ въ комнаты на свѣтъ огня.

*N. major* Costa.

Costa, Bull. Aspir. Nat. Neap. 1842. — MR., Pun. de Fr. IV. p. 86. — Put., Syn. Hem. Fr. III. p. 184. 3.  
*Nabis pilosulus* Fieb., Eur. Hem. p. 161. 8. — Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1872. p. 71. — MR., Pun. de Fr. IV. p. 84. 3.

Бакинская губернія (Х.).

*N. ferus* L.

Бакинская губ., Мамудлы, Манглисъ (Х.). — Петровскъ, обыкновененъ по садамъ.

*N. rugosus* L.

Тамбовка, на озерѣ Тапарованѣ (Х.).

*N. viridulus* Spin.

Петровскѣ, очень обыкновененъ на Tamarix во все лѣто.

*Alloeorhynchus* Fieb.

Eur. Hem. p. 159.

*A. flavipes* Fieb.

*Pirates*—Fieb., Weitenw. Beitr. 1836. I. p. 101. 1.

*Alloeorhynchus*—Fieb., Eur. Hem. p. 159.

*Prostemma collare* Mink., Stett. Ent. Zeit. 1859. p. 429. 2.

*A. collare* MR., Pun. Fr. IV. p. 71.

Елизаветталь (Х.).—Представителей этого рода въ фаунѣ Россіи до сихъ поръ еще не наблюдалось.

*Prostemma* Lap.

*P. guttula* Fab.

Бакинская губ. (Х.). | Петровскѣ, въ одномъ экземпляре подъ камнями, у подножія горъ.

*P. sanguineum* Rossi.

Манглісъ (Х.).—Петровскѣ, изрѣдка у корней растеній и у подножія горъ.

*P. aeneicolle* Stein.

Stein, Berl. Ent. Zeit. 1857. p. 88. 2.—Fieb., Eur. Hem. 158. 3.—MR., Pun. Fr. IV. p. 66.

Манглісъ (Х.)—Южноевропейская форма впервые найденная въ фаунѣ Россіи.

*Coranus* Curt.

*C. subapterus* D.G.

Петровскѣ, нерѣдко у корней растеній по сорнымъ мѣстамъ.

*Harpactor* Lap.

*H. iracundus* Scop.

Тифлисъ, Боржомъ, Манглисъ (Х.).

*H. rubrogularis* Horw.

Isis, 1879. p. 96.

Этотъ новый видъ описанъ по одному женскому экземпляру, найденному около Сурама.

*Pirates* Serv.

*P. hybridus* Scop.

Долина Храма, Манглисъ (Х.).

*Eumerus* Kti.

*E. ululans* Rossi.

Бакинская губернія, Коди (Х).—Петровскъ,—два экземпляра влетѣли въ комнату, на свѣтъ огня.

*Pasira* Stål.

*P. basiptera* Stål.

Коди (Х.).

*Reduvius* F.

*R. personatus* L.

Еленендорфъ, Тифлисъ (Х.).

*R. thoracicus* HS.

Бакинская губ., Казбекъ (Х.).

*Centroscelis* Jak.

*C. spinosus* Jak.

Изрѣдка въ Петровскѣ.—Видъ этотъ, встрѣчающійся по всѣмъ берегамъ Каспійскаго моря, и довольно обыкновенный въ Астрахани, найденъ былъ въ послѣднее время въ Испаніи, въ Аранжуеце. Проф. Боливаръ далъ недурной рисун-

ночь его въ *Annales de la Soc. Esp. de Hist. Nat.* 1879.  
(T. VIII. tab. II. fig. 4.)

*Oncococephalus* Kti.

*O. notatus* Ramb.

Анютино (Х.).

Fam. **Hydrometrides.**

*Limnobates* Burm.

*L. stagnorum* L.

Елизаветталь (Х.).

Fam. **Hebrides.**

*Hebrus* Curt.

*H. montanus* Kti.

Карта—Мта, недалеко оть Боржома (Х.).

Fam. **Naucorides.**

*Apelochirus* Westw.

Lond. Mag. 1893. VI. p. 228.

*A. aestivalis* F.

*Naucoris*—Fab., Ent. Syst. IV. p. 66. 2.

*Apelochirus*—Fieb., Eur. Hem. p. 103.—DS., Brit. Hem. p. 578. 1. tab. XIX.  
fig. 5.—Put. Syn. Hem. Fr. p. 210. 1.

Тифлисъ, одинъ самецъ съ укороченными надкрыльями  
(Х.).—Видъ этотъ впервые найденъ въ фаунѣ Россіи.

Fam. **Notonectides.**

*Notonecta* L.

*N. glauca* L.

Ахалкалаки (Х.).—Петровскъ — изрѣдка; Дербентъ — во  
множествѣ, оть А. В. Комарова.

Fam. Corisides.

*Corisa* Geoffr.

*C. Geoffroyi* Leach.

Tr. Linn. Soc. 1818. XII. p. 17. 7.—Fieb., Eur. Hem. p. 90. 3.—DS. Br. Hem. p. 593. 1. tab. XX. fig. 5.—Put. Syn. Hem. Fr. p. 220. 1.

*Sigara striata* Fab., Ent. Syst. IV. p. 60. 2.

Залка (Х.).

*C. Panzeri* Fieb.

Spec. Gen. Cor. p. 15. 3. tab. I. fig. 3.—Fieb., Eur. Hem. p. 92. 7.

*Sigara striata* PZ., Fn. Germ. p. 50. 28.

Залка (Х.).

По мнѣнію Пьютона видъ этотъ ничѣмъ существеннымъ не разнится отъ *C. atomaria* Illig.

*C. Jakowleffi* Horw.

Isis 1879. p. 96.

Этотъ новый видъ полученъ былъ мною во множествѣ изъ окрестностей Дербента отъ А. В. Комарова.

*C. hieroglyphica* Duf.

Бакинская губ. (Х.).—Дербентъ (Фаустъ).—Петровскъ—во множествѣ въ соленыхъ лужахъ, по берегамъ моря.

*C. Sahlbergi* Fieb.

Spec. Gen. Cor. p. 25. 24. tab. II. fig. 3.—Fieb., Eur. Hem. p. 94. 16.—Th., Op. Ent. 1869. I. p. 29. 4.—Put. Syn. Hem. Fr. p. 225. 7.

Залка (Х.).

*C. striata* L.

Бакинская губернія (Х.).

*C. assimilis* Fieb.

Spec. Gen. Cor. p. 32. 36. tab. II. fig. 14.—Fieb., Eur. Hem. p. 96. 26.

Бакинская губернія (Х.).

C. Fabricii Fieb.

*C. abdominalis* Fieb., Bull. Mosc. 1848. II. p. 526. 22.

*C. nigrolineata* Fieb., Bull. Mosc. 1848. II. p. 527. 24.

*C. Fabricii* Fieb., Spec. Gen. Cor. p. 33. 38. tab. II. fig. 16.—Fieb., Eur. Hem. p. 98. 31.—Sahlb., Notis. Fenn. 1875. XIV. p. 291. 15.—Put., Syn. Hem. Fr. p. 231. 18.

Бакинская губернія (Х.).

C. Falleni Fieb.

Курушъ (Фаустъ), въ одномъ экземпляре.

C. Caspica Horw.

Isis 1878. p. 18. 209.

Бакинская губернія (Х.).

C. carinata Sahlb.

*C. cognata* Fieb., Eur. Hem. p. 99. 36.

*C. Sharpi* DS., Ent. Monthl. Mag. 1870. VI. p. 247.

*C. carinata* Sahlb., Obs. Not. Fenn. p. 18. 4.—J. Sahlb. Notis. Fenn. 1875. XIV. p. 294. 18.—Put., Syn. Hem. Fr. p. 234. 22.

Хозапинскъ, 5600' надъ уровнемъ моря (Х.).

C. Rogenhoferi Fieb.

Wien. Ent. Mon. 1864. p. 208.—Put., Syn. Hem. Fr. p. 235. 24.

*C. Frivaldszkyi* Horw., Berl. Ent. Zeit. 1874. p. 396. 5.

Бакинская губ. (Х.)—Дербентъ (Фаустъ).

C. coleoptrata F.

*Sigara*—Fab., Ent. Syst. IV. p. 60. 8.

*Corisa*—Fieb., Eur. Hem. p. 90. 1—Put., Syn. Hem. Fr. p. 236. 26.

*Cymatia*—Fl., Rh. Livil. p. 800. 1.—Sahlb., Notis. Fenn. 1875. XIV. p. 297. 1.

Курушъ (Фаустъ)—два экземпляра.

Sigara Fab.

Syst. Rh. p. 104. 16.

S. Scholtzii Fieb.

Eur. Hem. p. 90. 4.—Put., Syn. Hem. Fr. p. 238. 2.

Петровскъ, изрѣдка въ лужахъ, около морскаго берега.