

тая, съ металлическимъ отливомъ. Конецъ носа, усики и ноги желтоватыя; основаніе перваго сустава усиковъ чернаго цвѣта; середина бедръ, концы голеней, послѣдній суставъ лапокъ и хоботокъ буроватые; основаніе передней пары ногъ бѣловатое.

Видъ очень близкій къ *S. morio* Zett., но отличающійся отъ него свѣтлыми конечностями, металлическимъ отливомъ и волосистостью поверхности, а также весьма выпуклыми возвышеніями въ передней части переднеспинки.

Изъ Култукъ.

### 13. *Systratiotus aterrimus* n. sp.

Ganz schwarz, Membranrippe gelblich. Oberseite matt, sehr fein chagriniert, schwarz behaart und goldgelb beschuppt. Kopf schmal, länger als breit; Fühler und Beine ganz schwarz.

Länge  $4\frac{3}{4}$  — 5 mm.

Туловище и конечности сполна чернаго цвѣта, только ребра мембранальныхъ клѣтокъ (а иногда и пятна на затылкѣ возлѣ глазъ) желтоватыя. Вся наружная сторона матовая, весьма мелко шагринированная, покрытая черными волосками и золотистыми чешуйками. Голова узкая, болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширину.

Этого вида найдено только 6 экземпляровъ у подножія Верхоленскихъ горъ.

### 14. *Macrotylus dimidiatus* n. sp.

Oberseite stark abtstehend schwarz behaart; Kopf grün, Augen schwarz. Fühler kurz; Glied 2 halb so lang als Hinterrand des Pronotum, schwarz; Glied 2 am Ende, Glied 3 und 4 bräunlich. Schnabel grün, am Ende schwarz. Pronotum grün, Hinterrand und Mittelstreif schwärzlich. Schild schwarz, Grund oder Grundwinkel grünlich, Halbdecken sammtschwarz, Hinterwinkel des Corium, Cuneusspitze und kleine Zellrippe der Membran