

Reut. Хоботокъ черноватый, 1-й суставъ и основаніе 2-го рыхеватые. Переднеспинка короткая (ширина ея въ $3\frac{1}{2}$ раза болѣе длины), съ боковыми краями почти прямыми и постепенно, хотя очень слабо, съуживающаяся кпереди; передній край съ тройной вырѣзкой для помѣщенія головы (и глазъ), гораздо шире этой послѣдней, такъ что шейный уголъ выдается въ сторону и вытягивается нѣсколько впередъ, доходя до половины глаза; вершина шейнаго угла нѣсколько округленная; почти посрединѣ переднеспинки помѣщаются очень узкія, линейные, гладкія извилины, въ видѣ неглубокихъ поперечныхъ бороздокъ; сзади ихъ находится по бѣловатому гладкому бугорку; такие же бугорки, переходящіе иногда въ бѣловатыя полоски, замѣтны и на переднемъ краѣ переднеспинки, въ углахъ головной вырѣзки. Щитокъ короткій (онъ едва длиннѣе переднеспинки и оставляетъ непокрытыми 3 послѣдніе сустава брюшка), широкій, языковидной формы, съ нѣсколько выпуклымъ основаніемъ и небольшими гладкими, бѣловатыми бугорками въ основныхъ углахъ. Надкрылья еще короче щитка, шире половины его, съ окружленными боковыми и задними краями и съ зачатками перепонки, которая въ видѣ узкой лопасти, отдѣляющейся съ внутренней стороны элитръ, скрыта подъ щиткомъ и только въ рѣдкихъ случаяхъ выставляется частію изъ-подъ него. Брюшко кзади замѣтно расширяется; брюшной ободокъ съ черноватыми пятнами въ углахъ соприкосновенія сегментовъ. Тулowiще снизу чернаго цвѣта, съ бѣловатой полоской по бокамъ брюшка и съ бѣловатыми же дыхальцами. Бедра чернаго цвѣта, лишь на задней парѣ замѣтны буроватыя пятна; концы бедръ, голени и лапки рыхеватые; нижняя сторона передней пары голеней и концы ихъ на всѣхъ остальныхъ лапкахъ, а также когтевой суставъ, черноватые.

Размѣры ♂ : длина 6 мм. и ширина $4\frac{1}{2}$ мм.

» . ♀ : » 8 » » 5 »

Въ Иркутскѣ, по склонамъ Верхоленской горы, въ тече-

ніє іюля *M. nigriventris* попадається нерѣдко; единственная ♀ найдена въ той же мѣстности въ маѣ. Имѣющійся у меня экземпляръ изъ с. Култука отличается болѣе блѣднымъ цвѣтомъ и менышей величиной (до $5\frac{1}{2}$ мм. въ длину).

Диагнозъ рода *Mastiletinus*, недавно установленного Рейтеромъ по одному экземпляру изъ восточной Сибири, безъ точнаго обозначенія мѣстности («*verisimiliter ad Irkutsk*»), долженъ быть дополненъ двумя признаками, которыхъ Рейтеръ не встрѣтилъ у своего *M. abbreviatus*, а именно: 1) очень тонкія, но явственная извилины на переднеспинкѣ (онѣ, впрочемъ, есть и у *M. abbreviatus*, хотя у этого вида очень слабо выражены) и 2) сильная вырѣзка головнаго щитка передъ глазами, которая совершенно отсутствуетъ у *M. abbreviatus*.

Главные же отличительные признаки этого послѣдняго вида слѣдующіе: туловище сверху и снизу рыжеватое, величиною до $5\frac{3}{4}$ мм.; головной щитокъ безъ вырѣзки передъ глазами; передній край переднеспинки почти одинаковой ширины съ головой, и шейный уголъ ея не выдается ни въ сторону, ни впередъ, а примыкаетъ непосредственно къ заднему краю глаза.

2. *Acanthosoma axillaris* n. sp.

Schmutziggrün, stellenweise röthlich, unten bleich grünlichgelb. Kopf etwas länger als breit, Fühler bräunlich, Wurzelglied bleich, fast so lang als der Kopf, Glied 2 fast $1\frac{1}{2}$ mal so lang als Glied 1. Schulterecke des Pronotum breit, stark, stumpfspitzig, vorwärts gerichtet, roth, die Spitze schwarz. Brustplatte niedrig, vorn abgerundet, nicht an den Vorderrand der Vorderbrust reichend. Connexivum mit schwarzen Endflecken. Beine bleich grünlichgelb, Schienbeinende bräunlich, Füsse rostgelblich.

Länge ♂ 12 mm., ♀ 13 mm.

Туловище небольшое, довольно узкое, сверху грязнозелен-

новатое, мѣстами съ красноватымъ отѣнкомъ, снизу блѣднаго желтовато-зеленаго цвѣта (δ), или блѣдно-палеваго (φ). Голова нѣсколько болѣе развита въ длину, чѣмъ въ ширину. Усики буроватые, 1-й суставъ ихъ свѣтлѣе прочихъ и по длини почти равенъ головѣ, 2-й почти въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе 1-го и на $\frac{1}{4}$ длиннѣе 4-го, а 3-й въ половину короче 2-го и почти равенъ 5-му; у φ второй суставъ немного длиннѣе 1-го и одинаковой длины съ 4-мъ. Хоботокъ достигаетъ почти до половины заднегруди. Переднеспинка кпереди сильно суженная, назади широкая, съ плечевыми углами, вытянутыми въ короткіе, широкіе зубцы, обращенные вершиной кпереди; эти отростки, вмѣстѣ съ задней частью переднеспинки, красноватые, острал же вершина ихъ черновата. Брюшной ободокъ съ острыми зубчиками и съ черными пятнами въ заднихъ углахъ послѣднихъ двухъ сегментовъ; брюшной шипъ достигаетъ до половины среднегруди, пластинчатый отростокъ которой — низкій, почти прямой, спереди округленный и отстоящій довольно далеко отъ переднаго края переднеспинки. Ноги обыкновенной формы, однообразнаго блѣднаго зеленовато-желтаго цвѣта; концы голеней буроватые; лапки рыжія.

Длина 12—13 мм., ширина $5\frac{1}{4}$ — $5\frac{1}{2}$ мм.

Съ первого взгляда этотъ клопъ очень похожъ на *Ac. spinicollis* Jak., съ которымъ я нѣкоторое время его и смѣшивалъ, но который отличается, однако, кромѣ гораздо большей величины ($15\frac{1}{2}$ мм.), формою плечевыхъ шиповъ и болѣе длиннымъ отросткомъ среднегруди. Что касается этого послѣднаго признака, то относительно него вкрадась неточность въ сдѣланное мною въ 1880 г. описание (Bull. Moscou, 1880, II, р. 396), такъ какъ въ дѣйствительности отростокъ этотъ продолжается до самаго края переднегруди. *Ac. spinicollis* отличается, кромѣ того, болѣе длинными усиками (хотя относительная длина суставовъ ихъ почти одинакова у обоихъ видовъ) и значительною шириной переднеспинки между

плечевыми углами, превышающею половину длины туловища (у нынѣ описываемаго вида она гораздо меныше половины длины туловища).

Одинъ экземпляръ найденъ въ Иркутскѣ, другой полу-ченъ изъ Раддевки (на Амурѣ).

3. *Enoplops sibirica* n. sp.

Im Bau und Farbe dem *En. (Palethrocoris) discigera* Kti. sehr ähnlich, aber kleiner; Rücken schwarz mit viereckigem rostgelben Mittelfleck; Fühlerglied 1 länger als Glied 3, Glied 2 am Ende verschmäler, nur um $\frac{1}{4}$ länger als Wurzelglied.

Länge $10\frac{1}{2}$ mm.

Видъ этотъ очень близокъ къ *En. discigera* Kti., но уже съ первого взгляда отличается менышей величиной, чернымъ цвѣтомъ спинной поверхности брюшка и усиками. Экземпляры *En. discigera* достигаютъ $12\frac{1}{2}$ мм., тогда какъ *En. sibirica* имѣть только $10\frac{1}{2}$ мм. въ длину и при томъ туловище у нея гораздо болѣе узкое; у *En. discigera* верхняя сторона брюшка яркооранжевая, безъ всякихъ пятенъ, а у *En. sibirica* она чернаго цвѣта, съ 4-угольнымъ рыхимъ пятнышкомъ посерединѣ и съ ржавато-сѣрымъ послѣднимъ суставомъ. У обоихъ видовъ усики весьма сходны по цвѣту и по расширенію 3-го сустава, но отличаются инымъ соотношеніемъ суставовъ; такъ, у *En. discigera* 1-ый суставъ замѣтно короче чѣмъ у *En. sibirica* и 2-ой суставъ почти на $\frac{1}{3}$ длиннѣе его, а у описываемаго вида основной суставъ такъ вытянутъ, что 2-ой едва на $\frac{1}{4}$ длиннѣе его; самый этотъ 2-ой суставъ у *En. discigera* имѣть одинаковую толщину по всей длине, тогда какъ у *En. sibirica* онъ ясно стуживается къ вершинѣ; что же касается 3-го сустава, расширенного въ видѣ лопасти, то онъ, сравнительно съ 1-мъ суставомъ, замѣтно длиннѣе у *En. discigera* и короче у нашего сибирскаго вида.

Подъ Иркутскомъ *En. sibirica* довольно обыкновененъ;

кромъ того, я имѣю єтотъ видъ изъ Култука, изъ окрест-
ностей Кяхты и съ береговъ р. Онона.

4. *Spathocera albomaculata* n. sp.

Graubraun; Kopf viel lnger als breit, oben dicht bedornt; Fhler bleichgelblich, Glied 3 schwarz, am Grunde bleich, Glied 4 schwarz, am Ende rostgelb; Wurzelglied stark prismatisch, dicht und fein gekrnt, fast so lang als der Kopf; Glied 2 krzer als 1, platt, gleichmig erweitert; Glied 3 spatelfrmig, am Grunde dnn. Pronotum etwas lnger als breit, Halsecke fein bedornt, Schulterecke stumpfspitzig. Pronotum mit drei Kielen, Mittelkiel sehr fein, Seitenkiel stark, hinten abgekrzt und sehr gewlbt; Hinterhlfte des Pronotum glnzend schwarz, tief punctirt. Halbdecken rostbraun, schwarz gefleckt. Conne-xivum breit, sehr uneben, fast schwarz, die Grundwinkel der Schnittstcke mit weissem Fleck. Schienbeine weisslich, schwarz geringelt.

Lnge 6½ mm.

Темнобураго или грязного буроватаго цвѣта, съ синево-блѣдными пятнами на брюшномъ ободкѣ. Голова гораздо болѣе развита въ длину, чѣмъ въ ширину, съ боковыми краями параллельными, сверху усаженная сильными многочисленными шипами; хоботокъ достигаетъ до средней пары ногъ. Усики блѣдные грязно-желтоватые, ихъ 3-й суставъ (кромѣ основанія его) и послѣдній (за исключеніемъ вершины) черные; 1-й суставъ усиковъ массивный, трехгранный, густо усыпанный мелкими блѣдоватыми зернышками, которыя переходятъ иногда въ тупые шипики, и длиною почти равный головѣ; 2-й суставъ на ¼ короче основнаго, плоскій, расширенный равномѣрно по всей длине, на вершинѣ прямо обрѣзанный; 3-й суставъ длинѣе всѣхъ прочихъ, постепенно расширяющійся отъ самаго основанія, съ вершиной, вырѣзанной нѣсколько вкося, весь чернаго цвѣта, кромѣ светлого основанія, занимающаго не болѣе ¼ всей длины; по-

следний суставъ очень короткій, толстый, грушевидный, чернаго цвѣта, къ вершинѣ постепенно рыжѣющій, густо покрытый короткими серебристо-блѣмыми волосками и рѣдкими буроватыми щетинками. Переднеспинка нѣсколько болѣе развита въ длину, передніе и боковые края ея прямые, а задній глубоко вырѣзанный надъ щиткомъ; шейный уголъ съ небольшимъ тупымъ зубчикомъ, плечевой — оканчивается тупымъ остриемъ; вдоль переднеспинки проходятъ 3 ребра, изъ нихъ среднее очень тонкое, слабо выраженное и замѣтное только въ передней трети, а два боковыхъ — очень сильные и выпуклые, начинающіеся отъ передняго края и достигающіе немного далѣе половины переднеспинки, причемъ, отходя отъ передняго края, они постепенно становятся массивнѣе и оканчиваются высокимъ чернымъ бугоркомъ; передняя доля переднеспинки обыкновенно блѣднобуроватая, густо покрытая мельчайшими блѣдоватыми зернышками, задняя же — гладкая, блестящаго чернаго цвѣта, и покрытая сильнымъ, глубокимъ, хотя не частымъ, пунктиромъ. Щитокъ небольшой, равносторонній; боковые края его у основанія высоко приподняты и образуютъ полукруглныя лопасти, вершина же его оканчивается высокимъ бугоркомъ. Надкрылья рыжеватосѣрыя, съ разбросанными черными пятнами, болѣе всего сосредоточенными вдоль наружнаго края и главнаго ребра; у основанія ихъ, на самомъ краѣ, замѣтно по одному сильному бугорку съ каждой стороны. Перепонка блѣдоватая, съ густою неправильною сѣтью темнобурыхъ реберъ; въ основаніи ея — большое матово-черное пятно; небольшія пятна такого же цвѣта разбросаны безъ всякой правильности по всей перепонкѣ, выполняя цѣлую клѣтки. Брюшко, постепенно расширяющееся кзади, снизу сѣровато-буровое, густо покрытое блѣдоватыми зернышками и крупными черными точками; брюшной ободокъ очень широкій и далеко выдающійся изъ-подъ надкрыльевъ; онъ почти чернаго цвѣта, съ высокими черными бугорками, расположеннымъ нѣсколько вкося въ зад-

нихъ углахъ сегментовъ, въ основныхъ же углахъ помѣщается по большому, съжно-блѣлому, полупрозрачному пятну; такія же пятна, но болѣе мелкія, размѣщены на вершинахъ заднихъ угловъ сегментовъ и посрединѣ каждого кольца у наружнаго края; эти небольшія пятна (или—точнѣе—крупныя точки) бываютъ иногда съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Ноги буровато-блѣры; голени блѣловатыя, съ сильными, рѣзко выраженными черными кольцами, которыхъ бываетъ отъ 4 до 5; лапки блѣловатыя, съ буроватыми концами суставовъ.

Это—очень оригинальная форма, ближе всего стоящая къ южно-русской *Sp. obscura*, но отличающаяся отъ всѣхъ извѣстныхъ *Spathocer'*ъ многими характерными особенностями, какъ-то: блѣлыми, почти сквозными пятнами на брюшномъ ободкѣ, строеніемъ переднеспинки, жилкованіемъ и раскраскою перепонки и т. д.

Встрѣчается она не рѣдко въ окрестностяхъ Иркутска, въ юль и въ началѣ августа, по обрывамъ Верхоленскихъ горъ, у корней кустарниковъ, между старыми листьями и разными наносами; держится попарно и ползаетъ весьма медленно.

5. *Nysius Horwathi* n. sp.

Bleich graubr  nlich, fein punktirt. Kopf breiter als lang, dicht punctirt, Stirnschwiele weisslich. F  hlerh  cker langspitzig. F  hler dick, kurz, schwarz; Wurzelglied am Grunde, Glied 2 und 3 an der Grundh  lfte rostr  thlich; F  hlerwurzel den Kopf nicht   berragend. Pronotum kurz, doppelt breiter als lang; Seitenrand gerade, vorn abgerundet; Vorderrand fast so breit als Kopf mit Augen. Schild sehr breit und kurz, am Ende breit abgerundet; Halbdecken sehr abgek  rzt. Hinterleib breit-oval, bleich. Beine stark.

L  nge 5 mm.

Блѣдно-буроватый, покрытый рѣдкимъ, нѣжнымъ пунктиромъ. Голова большая, съ выпуклыми глазами, болѣе раз-

витая въ ширину, довольно густо покрытая мелкимъ пунктиромъ; вдоль головы 2 широкихъ черныхъ полосы, идущихъ отъ заднаго края до основанія усиковъ; носовой валикъ бѣловатый; бугорки, поддерживающіе усики, выпачиваются въ острый, длинный шипъ. Усики толстые, съ короткими суставами; 1-й суставъ ихъ не выдается впередъ далѣе конца носа, а 2-й едва на $\frac{1}{2}$ длиннѣе 1-го и нѣсколько короче послѣднаго; основаніе 1-го сустава и основная половина двухъ среднихъ суставовъ — рыжевато-красныя. Хоботокъ достигаетъ задней пары ногъ. Переднеспинка короткая (ширина ея вдвое болѣе длины) и края ея прямые, причемъ боковые впереди постепенно округляются къ шейному углу; передній край почти равенъ ширинѣ головы вмѣстѣ съ глазами; поверхность переднеспинки покрыта нѣжнымъ беззвѣтнымъ пунктиромъ, слегка буроватымъ по заднему краю; вдоль ея проходятъ двѣ широкія, но короткія черные полоски, которая, начинаясь сзади глазъ, достигаютъ только до извилинъ, также чернаго цвѣта; довольно широкія листоватыя окраины боковыхъ краевъ блѣднозеленоватыя. Щитокъ очень короткій, но весьма широкій, на концѣ широко округленный, съ высокими бѣловатыми кантиками и съ продольнымъ ребромъ на концѣ. Надкрылья недоразвитыя, очень укороченные; они немного длиннѣе щитка и едва достигаютъ 2-го брюшнаго кольца. Брюшко широкое, очень блѣднаго цвѣта, съ буроватыми пятнышками — сверху и съ 2 черными прерывающимися полосками по бокамъ — снизу. Ноги сильные, такого же цвѣта, какъ и все туловище; бедра съ черными полосами по внутренней сторонѣ и съ такими же точками по внѣшней; основаніе голеней черноватаго цвѣта; послѣдній суставъ лапокъ черный.

Единственный экземпляръ этого вида найденъ былъ мною у подножія Верхоленскихъ горъ. Съ первого взгляда *N. Horwathi* очень похожъ на *N. Jakobaeae*, но отличается многими существенными признаками, какъ-то: болѣе короткими

и толстыми суставами усиковъ и ногъ, формою переднеспинки, несвойственною роду *Nysius*, и большою, широкою головою съ острыми шипами у основанія усиковъ.

6. *Pionosomus monochrous* n. sp.

Oval, schwarz, oberseits abstehend schwarzbraun behaart; Fühlerglied 2 und 3 und die Schienbeine rostbraun. Halsschild breiter als lang, vorn kupferig schimmernd, hinten ganz matt-schwarz, ohne Flecken.

Länge 2 mm.

Овальный, черный, покрытый темнобурыми, почти черными стоячими волосками; два среднихъ сустава усиковъ и голени рыжевато-бурыя. Переднеспинка болѣе развитая въ ширину, съ широкоокругленными задними углами, вся чернаго цвѣта; передняя ея часть, также какъ и голова, съ слабымъ темнобронзовымъ отливомъ, а задняя часть матово-черная, безъ всякихъ пятенъ; щитокъ также сплона матово-черный. Надкрылья такія же, какъ у *Pion. varius* Wolff, съ укороченной перепонкой.

Видъ этотъ, кромѣ своей малой величины, съ первого взгляда отличается отъ другихъ сплона чернымъ цвѣтомъ переднеспинки и щитка и темнымъ красновато-бронзовымъ отливомъ на переднеспинкѣ и на головѣ.

Онъ изрѣдка попадается въ окрестностяхъ Иркутска, вмѣстѣ съ *Pion. varius*.

7. *Trapezonotus subtilis* n. sp.

Schwarz, matt. Kopf viel breiter als lang, glänzend, metallisch grün. Fühler und Schnabel ganz schwarz. Pronotum quer, fast doppelt breiter als lang, vorn allmälig verschmälert, Vorderhälfte mattschwarz, sehr fein punktirt, Hinterhälfte bleich bräunlich, schwarz punktirt; Vorder- und Seiten-Randlinie gelblich. Schild schwarz, Schildspitze gelblich. Halbdecken bleich-bräunlich, grob schwarz punctirt. Membran vollständig, rauch-

braun, Grundstreif und Rippen weisslich. Bauch schwarz, metallisch grün. Beine ganz schwarz; Vorderschenkel unbewehrt, Hinterfusswurzel $1\frac{1}{2}$ mal so lang als Glied 2 und 3 zusammen.

Länge $3\frac{1}{2}$ mm.

Черного цвета, сверху матовый, гладкий, съ шелковистымъ отливомъ. Голова короткая, гораздо болѣе развитая въ ширину, блестящая, съ металлическимъ зеленымъ отливомъ, густо покрыта мельчайшимъ, малозамѣтнымъ пунктиромъ. Усики черного цвета у обоихъ половъ и покрыты длинными, рѣдкими и нѣжными щетинками; 2-й суставъ у ♀ замѣтно длиннѣе 3-го и почти равенъ 4-му, но у ♂ онъ едва длиннѣе 3-го сустава и гораздо короче 4-го. Хоботокъ черный, достигающій до средней пары ногъ. Переднеспинка посеречная (ширина ея почти вдвое болѣе длины), постепенно съуживающаяся кпереди, съ боковыми краями прямыми; края задній и, особенно, передній довольно сильно вырѣзаны; передняя половина переднеспинки черная, матовая и мельчайшимъ образомъ пунктированная, а задняя половина—блѣдно-буроватая, покрытая крупными, разбросанными безо всякой правильности, черными точками, которые, сливаясь другъ съ другомъ, образуютъ черные пятна возлѣ плечъ и посрединѣ заднаго края; линейные боковые окраины и черточка на переднемъ краѣ буровато-желтая. Щитокъ черный, вершина его блѣдно-желтоватая. Надкрылья блѣдно-буроватые, покрыты крупными черными точками; на замковой части (clavus) точки расположены въ 3 правильныхъ продольныхъ ряда; посрединѣ надкрыльевъ находится 3 и вдоль мембранального шва—2 черныхъ пятнышка, которые не всегда бываютъ ясно выражены; наружный край надкрыльевъ линейный, безъ точекъ. Перепонка полная, темно-бурая, безъ пятенъ; полоска вдоль мембранального шва и 5 реберъ блѣдоватыя. Снизу туловище черное, только линейный передній край переднегруди и части груди у основания ногъ блѣдоватые; брюшко

блестящее, съ металлическимъ зеленымъ отливомъ. Ноги ♂ спина черная; бедра первой пары толстые, невооруженные; на всѣхъ бедрахъ раскиданы длинные щетинки; голени имѣютъ сильные шипы; 1-й суставъ лапокъ задней пары ногъ въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе остальныхъ двухъ суставовъ, вмѣстѣ взятыхъ.

Отъ единственного до сихъ поръ извѣстнаго представителя подрода *Gnopherus*, а именно *Tr. anorus* Flor., описываемый видъ отличается незначительной величиной, блестящей металлически-зеленою головой, болѣе широкой переднеспинкой, желтоватымъ концомъ щитка и несходной пунктиркой.

Встрѣчается *Tr. subtilis* очень рѣдко на склонахъ Верхоленскихъ горъ, у корней кустарниковъ.

8. *Emblethis irroratus* n. sp.

Körper breit, ganz schwarz, oben sehr dicht und grob punctirt und sehr fein behaart. Kopf so lang als breit, fein punctirt und goldgelb beschuppt. Fühler dick, schwarz, sehr lang beborstet. Schnabel schwarz, bis zu den Mittelhüften reichend. Pronotum etwas breiter als lang, vorn allmälig verschmäler, Halsecke stumpf, abgerundet; Seitenrand und Hintertheil weiss marmorirt. Schild schwarz, fein punctirt, am Ende schwach weiss gefleckt. Halbdecken schwarz, weisslich gefleckt-marmorirt; Membran vollständig, rauchbraun; Rippen braun, weisslich gesäumt. Randlinie des Pronotum und der Halbdecken weisslich. Unterseite ganz schwarz, Vorderbrustrand und Hinterbruststcke weisslich. Beine schwarz, Aussenrand der Vorderschienbeine und Kniee bräunlichgelb; Füsse braun; Hinterfusswurzel $2\frac{1}{2}$ mal länger als Glied 2 und 3 zusammen.

Länge $7\frac{3}{4}$ — 8 mm.

Тулowiще широкое, овальное, черного цвѣта, сверху покрытое сильнымъ пунктиромъ и мельчайшими волосками. Голова одинаково развита какъ въ длину, такъ и въ ширину;

tylus гораздо короче скелетовых отростковъ. Глаза довольно большие, выпуклые; поверхность головы, кроме затылка, густо покрыта очень мелкимъ, но глубокимъ пунктиромъ и мельчайшими золотистыми волосками и чешуйками; на концѣ головы нѣсколько длинныхъ бурыхъ щетинокъ. Усики чернаго цвѣта, съ суставами сильными, и одѣты длинными, буроватыми полустоячими щетинками, очень тонкими. Хоботокъ чернаго цвѣта, достигающій до средней пары ногъ. Переднеспинка большая, нѣсколько болѣе развитая въ ширину чѣмъ въ длину, постепенно съуживающаяся кпереди; передній край ея глубоко вырѣзанъ, боковые — прямые, а задній — выгнутый въ видѣ очень пологой дуги; шейный уголъ тупой, округленный, выдающійся впередъ почти до половины глаза; боковыя пластинки широкія, съ узкой, почти линейной оторочкой по всему наружному краю, и на нихъ (а также на задней, нѣсколько придавленной, трети переднеспинки) бѣловатыя пятнышки неправильной формы, иногда въ видѣ мраморныхъ прожилокъ. Края и задняя треть переднеспинки очень сильно пунктированы, въ передней же части помѣщаются два большихъ, нѣсколько выпуклыхъ, гладкихъ зеркальца, которыя окружены густымъ мелкимъ пунктиромъ; самыя зеркальца бываютъ иногда бархатисто-черные и также покрыты пунктиромъ, но болѣе рѣдкимъ. Щитокъ довольно узкій; основание его одинаковой ширины съ головой (взятой вмѣстѣ съ глазами), оно чернаго цвѣта и лишь въ задней половинѣ замѣчается нѣсколько бѣловатыхъ пятнышекъ; щитокъ весь густо покрытъ мелкимъ пунктиромъ, отсутствующимъ на матовомъ пятнѣ въ основныхъ углахъ и на трехъ продольныхъ полоскахъ, доходящихъ только до половины щитка. Надкрылья съ наружной очень тонкой оторочкой бѣловатаго цвѣта, сильно пунктированы и испещрены бѣловатыми пятнышками. Перепонка полная, темно-бурая, такъ же какъ и ребра, причемъ каждое ребро обведено бѣловатымъ контуромъ; промежутки между ребрами безъ пятенъ.

Туловище снизу черного цвета, и только передний край переднегруди, внешний угол заднегруди и части, прилегающие к основанию ног, — бледоватыя. Брюшко весьма нежно и густо шагринировано и покрыто длинными, полустоячими рыжевато-бурыми волосками; брюшной ободок весь черного цвета. Ноги сильные, тоже черного цвета; лишь наружная часть голеней передней пары и места сочленений суставов — желтоватыя, а лапки — темнобурые. Первый сустав лапок задней пары ног длинее (более чьмъ вдвое) остальныхъ суставовъ, вмѣстѣ взятыхъ. Бедра передней пары толстые, усаженные снизу рядомъ зубцовъ, изъ которыхъ крайний (къ вершинѣ) — сильно развитъ; бедра остальныхъ паръ ногъ вооружены съ внутренней стороны двумя рядами щетинокъ; голени, кроме прилегающихъ желтоватыхъ волосковъ, снабжены черными, почти стоячими щетинками.

Отъ всѣхъ представителей рода *Emblethis* описываемый видъ отличается, съ первого взгляда, своеобразной черной окраской, сильнымъ вооружениемъ передней пары бедръ, однотонной перепонкой и т. д.

Встрѣчается онъ одиночными экземплярами по склонамъ и обрывамъ Верхоленскихъ горъ, у корней кустарниковъ, и отличается чрезвычайно быстрыми движениями.

9. *Plintisus vestitus* n. sp.

Pechschwarz, glänzend, dicht abstehend gelb lang behaart. Fühler braun, Wurzelglied und Glied 2 an der Endhälften rostgelblich. Pronotum fast viereckig, kaum länger als breit, vorn allmälig verbreitert, Halsecke ziemlich spitz vorgezogen (δ), in der Mitte schwarz, Seitenrand und Hintertheil rostgelblich. Schild schwarz, sehr fein chagrinirt, am Grunde kaum punctirt. Halbdacken stark punctirt, braun; Membran abgekürzt. Beine rostgelb, Schenkel bräunlich, Vorderschenkel sehr stark, zweizähnig. Hinterfusswurzel $1\frac{1}{2}$ mal länger als Glied 2 und 3 zusammen.

Länge $2\frac{3}{4}$ — 3 mm.

♂.

Туловище продолговато-овальное, блестящее, густо одѣтое желтоватыми волосками. Голова черного цвета; усики темно-бурые, 1-й суставъ ихъ и основная половина 2-го рыжевато-желтаго цвета; хоботокъ буроватый, 2-й суставъ и часть 3-го светлѣе. Переднеспинка почти квадратная, или едва болѣе развитая въ длину; передняя часть ея значительно выпуклая, гладкая, блестящая, задняя четверть приплюснутая, густо покрытая довольно нѣжнымъ пунктиромъ; передний край глубоко вырѣзанъ, шейные углы довольно острые, выдающіеся впередъ до половины глаза; боковые края замѣтно расширяются кпереди, съ легкой впадиной передъ плечевымъ угломъ, который широко округленъ; задний край надъ щиткомъ слабо вырѣзанъ. Переднеспинка черного цвета, узкие боковые бортики и задний край съ плечевыми углами — блѣдно-рыжеватые; какъ голова, такъ и переднеспинка довольно густо покрыты длинными стоячими волосками. Щитокъ черный, равносторонній, чрезвычайно мелко шагринированный, въ основаніи своеемъ едва пунктированный. Надкрылья грубо пунктированныя, густо покрытыя волосками, бураго цвета; перепонка укороченная, въ видѣ полукруга, оставляеть открытымъ послѣднее кольцо брюшка. Нижняя сторона туловища смоляно-черная, ноги рыжія, бедра (кромѣ вершинъ) буроватыя; бедра передней пары очень толстыя, съ внутренней стороны вооруженные 2 сильными зубцами, впереди коихъ помѣщается 1 или 2 небольшихъ зубчика; голени передней пары сильно искриженныя, передъ концомъ расширенныя, съ однимъ зубцомъ съ внутренней стороны, помѣщающимся въ передней трети. Первый суставъ задней пары ногъ въ полтора раза длиннѣе остальныхъ двухъ суставовъ вмѣстѣ.

♀.

Отличается отъ самца многими особенностями, а именно: переднеспинкой не расширяющейся кпереди, съ шейными

углами тупыми, округленными, пунктированными щиткомъ, длинными волосками по всей поверхности и менѣе развитой передней парой ногъ.

Держится *Pl. vestitus* многочисленными колоніями, въ іюнѣ и іюлѣ, по обрывамъ Верхоленскихъ горъ, въ корняхъ полыни и другихъ кустарниковъ.

10. *Plintisus sibiricus* n. sp.

Oval, schwarz, dicht und kurz gelb behaart. Fühler schwarz, Wurzelglied, Glied 2 am Grunde und Schnabel rostgelblich. Pronotum trapezförmig, vorn allmälig verschmälert, Halsecke vorstehend, ziemlich spitz; Vorderhälfte glänzend glatt, Hintertheil sehr dicht punctirt, in der Länge zusammenfiessend; Seitenrand und Hinterrandsaum rostbräunlich. Schild glatt. Halbdecken braun, dicht fein punctirt, Membran vollständig, durchsichtig, bleich bräunlich, Rippen weisslich, zwei Makeln rauchbraun. Beine rostgelblich, Vorderschenkel stark, zweizähnig.

Länge $2\frac{3}{4}$ mm.

♂.

Туловище овальное, черного цвѣта, густо покрытое короткими желтоватыми волосками; усики черного цвѣта, 1-й суставъ ихъ, основание 2-го и хоботокъ рыжеватые. Переднеспинка трапециoidalной формы, кпереди постепенно суживающаяся; передний край глубоко-выемчатый, съ шейными углами выдающимися впередъ и довольно острыми; боковые края съ слабой выемкой передъ задней третью; передняя выпуклая часть переднеспинки гладкая, блестящая, покрытая мельчайшимъ пунктиромъ, едва замѣтнымъ въ сильную лупу; задняя часть очень густо пунктирована, причемъ точки пунктира сливаются въ продольные струйки; узкие боковые бортики и оторочка задняго края рыжеватые. Щитокъ гладкий. Надкрылья бурые, довольно густо и нѣжно пунктированные; перепонка полная, полупрозрачная, блѣдно-рыжеватая, съ бѣловатыми ребрами и съ двумя темнобурыми, рѣзко

выраженными пятнами: однимъ — у мембранального шва, посрединѣ его, и другимъ — надъ центромъ перепонки. Ноги сплошна рыжія; передняя пара такого же устройства, какъ и у предыдущаго вида, но бедра гораздо слабѣе развиты.

Отъ *Pl. vestitus* этотъ видъ отличается формою передне-спинки, слабымъ пунктиромъ надкрыльевъ и однообразными короткими волосками поверхности тѣла.

Найденъ былъ одинъ экземпляръ на травѣ, около протока Ангары, у Верхоленскихъ горъ.

11. *Salda Reuteri* n. sp.

Schwarz, oben dicht abstehend schwarz langbeborstet und zerstreut gelb behaart. Augen gross, convex und kurz beborstet; Kopf silberweiss behaart und sehr lang schwarz bewimpert; tylus und vier callose Knoten gelblichweiss. Fühler sehr dünn, zerstreut lang behaart und bewimpert, Wurzelglied weisslich, am Grunde schwärzlich, Glied 2 sehr dünn, von oben allmälig verdickt, dreimal länger als Wurzelglied, bräunlich, am Grunde bleich; Glied 3 und 4 schwarz. Schnabel bis zum Hinterleib reichend, rostgelb, am Grunde bräunlich. Pronotum und Schild ganz schwarz. Halbdecken in der Mitte sammtschwarz, weiss gefleckt. Beine bleich, Schenkelende bräunlich, Schienbeine am Grunde und Ende schwarz bedornt.

Лѣнгѣ 4 — 5 mm.

Чернаго цвѣта, сверху весь густо покрытъ черными, довольно длинными стоячими волосками. Голова съ весьма большими, выпуклыми глазами, покрытыми короткими, рѣдкими щетинками; на головѣ, кроме серебристыхъ волосковъ, спереди разбросано нѣсколько очень длинныхъ щетинокъ; конецъ носа и 4 гладкихъ бугорка по сторонамъ его — желтовато-блѣлые. Усики очень тонкие, длинные, покрытые длинными нѣжными волосками, между которыми расположены рѣдкія, болѣе сильныя, прямостоящія щетинки; 1-й суставъ блѣловатый съ чернымъ основаниемъ, 2-й очень тонкій, не-

замѣтно расширяющійся къ вершинѣ, втрое длиннѣе 1-го, буроватый, постепенно свѣтлѣющій къ основанію, съ нижней стороны черный; послѣдніе 2 сустава черные и покрыты, кромѣ волосковъ, желтоватымъ пушкомъ, причемъ 3-й суставъ значительно длиннѣе 4-го. Хоботокъ достигаетъ до брюшка; его суставы (даже послѣдній) рыхлые и лишь основаніе хоботка буроватое. Переднеспинка и щитокъ блестящіе, надкрылья матовыя. Переднеспинка сильно суженная спереди, съ боковыми краями вогнутыми (чтѣ особено ясно у полно крылой формы); глубокая поперечная бороздка съ желтоватыми, очень короткими волосками. Щитокъ мельчайшимъ образомъ шагринированъ. Надкрылья съ большими бархатисто-черными матовыми пятнами посерединѣ, ближе къ заднему краю; другое такое же пятно, но небольшое, находится на замковой части, передъ концомъ ея, къ которому сзади примыкаетъ бѣловатая полоска. По раскраскѣ надкрыльевъ этой видъ, вообще, напоминаетъ *S. riparia*, а именно: передъ заднимъ вѣнчимъ угломъ *corium*'а помѣщается большое, почти 4-угольное бѣлое пятно, захватывающее боковой край; кромѣ того, болѣе или менѣе явственно замѣтны 4 или 5 небольшихъ пятнышекъ: два надъ мембраннымъ швомъ, надъ 2-й и 4-й клѣтками перепонки; два — съ внутренней стороны главного ребра (одно почти въ центрѣ надкрыльевъ, а другое — впереди его) и, наконецъ, одно съ вѣнчной стороны того же ребра (нѣсколько ниже центрального пятнышка); это пятое пятнышко не всегда бываетъ ясно выражено. Надкрылья, кромѣ стоячихъ волосковъ, имѣютъ еще рѣдкія золотисто-желтые чешуйки. Перепонка у полно крылой формы гораздо длиннѣе брюшка, а у коротко крылой — она имѣть одинаковую съ нимъ длину; 1-я внутренняя клѣтка не достигаетъ вершины 2-й, а 4-я сливается съ вѣнчимъ ободкомъ перепонки, который у основанія бѣловатый, далѣе же имѣть сильное черное пятно. Снизу туловище чернаго цвѣта, покрытое желтоватыми волосками;

послѣдній генитальный суставъ у ♂ бѣлый. Ноги въ основаніи бѣловатыя, вершина бедръ буроватая, голени и лапки блѣднаго грязновато-желтаго цвѣта; голени, кромѣ короткихъ волосковъ, покрыты еще черными длинными щетинками.

Описываемый видъ близокъ къ *S. riparia* Fall. и *S. oblonga* Stål, отъ которыхъ уже съ первого взгляда отличается густымъ покровомъ стоячихъ черныхъ волосковъ и глазами, снабженными короткими щетинками.

Встрѣчается онъ со второй половины іюля по сырьимъ мѣстамъ. Полнокрылая форма попадается очень рѣдко, короткокрылая же—нѣсколько чаще.

12. *Salda micans* n. sp.

Körper ganz schwarz, glänzend, grün metallschimmernd; Oberseite fein anliegend goldgelb behaart. Halsschild kurz, vorn sehr verengt; Seitenrand breit, stark aufgeworfen und fein quergerunzelt; Höckerschwiele sehr gewölbt. Schild sehr fein gestrichelt und sehr dicht behaart. Halbdecken ganz schwarz, zerstreut punctirt und ebenso behaart; Membran unvollkommen, bräunlich, metallglänzend. Stirnschwiele am Ende, Fühler und Beine gelblich; Fühlerwurzel am Grunde schwarz; Schenkelmitte, Schienbeine am Ende, Füsse und Schnabel bräunlich.

Länge $5\frac{1}{2}$ mm.

Туловище чернаго цвѣта, покрытое рѣдкими прилегающими волосками золотисто-желтаго цвѣта. Поверхность блестящая, съ сильнымъ металлически-зеленымъ отливомъ. Переднеспинка короткая, сильно суженная кпереди, съ боковыми краями, значительно приподнятыми кверху; передняя возвышенная часть ея очень выпуклая; широко завороченные края покрыты поперечными морщинками. Щитокъ весьма нѣжно шагринированъ и очень густо покрытъ мельчайшими золотистыми волосками. Надкрылья совершенно чернаго цвѣта, съ рѣдкимъ поверхностнымъ пунктиромъ и прилегающими золотистыми волосками; перепонка неполная, бурова-

тая, съ металлическимъ отливомъ. Конецъ носа, усики и ноги желтоватыя; основаніе первого сустава усиковъ чернаго цвѣта; средина бедръ, концы голеней, послѣдній суставъ лапокъ и хоботокъ буроватые; основаніе передней пары ногъ блѣдноватое.

Видъ очень близкій къ *S. morio* Zett., но отличающійся отъ него свѣтлыми конечностями, металлическимъ отливомъ и волосистостью поверхности, а также весьма выпуклыми возвышеніями въ передней части переднеспинки.

Изъ Култука.

13. *Systratiotus aterrimus* n. sp.

Ganz schwarz, Membranrippe gelblich. Oberseite matt, sehr fein chagrinirt, schwarz behaart und goldgelb beschuppt. Kopf schmal, langer als breit; Fühler und Beine ganz schwarz.

Länge $4\frac{3}{4}$ — 5 mm.

Туловище и конечности сплона чернаго цвѣта, только ребра мембранныхъ клѣтокъ (а иногда и пятна на затылкѣ возлѣ глазъ) желтоватыя. Вся наружная сторона матовая, весьма мелко шагринированная, покрытая черными волосками и золотистыми чешуйками. Голова узкая, болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширину.

Этого вида найдено только 6 экземпляровъ у подножія Верхоленскихъ горъ.

14. *Macrotylus dimidiatus* n. sp.

Oberseite stark abstehend schwarz behaart; Kopf grün, Augen schwarz. Fühler kurz; Glied 2 halb so lang als Hinterrand des Pronotum, schwarz; Glied 2 am Ende, Glied 3 und 4 bräunlich. Schnabel grün, am Ende schwarz. Pronotum grün, Hinterrand und Mittelstreif schwärzlich. Schild schwarz, Grund oder Grundwinkel grünlich, Halbdecken samtschwarz, Hinterwinkel des Corium, Cuneusspitze und kleine Zellrippe der Membran

weiss. Beine schwarz, Schenkelende und Schienbeinende grünlich. Brust ganz grün, Hinterleib schwarz.

Länge 2— $2\frac{1}{2}$ mm.

Передняя часть туловища яркозеленаго, брюшко и надкрылья — чернаго цвѣта; вся поверхность густо покрыта сильными черными стоячими волосками. Голова яркозеленая, съ черными глазами; усики короткие, черные, конецъ 2-го сустава и два послѣдніе буроватые; 1-й суставъ оканчивается наравнѣ съ головой, а 2-й очень короткій и остальные два вмѣстѣ длиннѣе его. Переднеспинка сильно суженная кпереди, съ боковыми краями прямыми и съ переднимъ краемъ, вырѣзаннымъ посерединѣ и имѣющимъ форму выпуклого кантика; вся она зеленаго цвѣта, по заднему краю нѣсколько темнѣе и съ темною полоскою посерединѣ, не доходящую до переднаго края. Щитокъ черный, основаніе его — или, по крайней мѣрѣ, основные углы — зеленоватые. Надкрылья, вмѣстѣ съ перепонкой, бархатисто-черныя, кроме небольшой и не всегда явственной полоски у плечеваго угла, которая бываетъ зеленоватаго цвѣта; конецъ *corigum'a* надъ *cuneus'омъ* съ ярко-блѣющей поперечной полоской, конецъ *cuneus'a* и ребра внутренней мембранныальной клѣтки блѣлые; ребро же большой клѣтки и самыя клѣтки внутри — чернаго цвѣта, какъ и остальная часть надкрыльевъ. Ноги черныя, концы бедръ и конечныя части голеней зеленоватые. Снизу — всѣ части груди зеленаго цвѣта, а брюшко — чернаго.

Этотъ видъ встрѣчается изрѣдка, по склонамъ Верхоленскихъ горъ и у д. Разводной, на низкой травѣ, въ концѣ июня и въ началѣ июля.

15. *Rhopalotomus niger* n. sp.

Ganz schwarz, fein metallschimmernd, Schienbeine dunkelbraun. Fühlerglied 1 kürzer als der Kopf, bisweilen rostbraun, Glied 2 allmälig verdickt, dicht schwarz behaart, um $\frac{1}{8}$ länger als Hinterrand des Halsschildes. Halsschild fast glatt, fein

quergestrichelt, sehr fein punktirt und zerstreut lang beborstet. Halbdecken fein chagrinirt; Membran schwarz, Aussenwinkel weisslich. Schienbeine dunkelbraun, Grund und Ende schwarz.

Länge 5 mm.

Какъ туловище, такъ и конечности — чернаго цвѣта, съ слабымъ металлическимъ отливомъ, кроме голеней, которыя бываютъ темно-бурыя, и (у нѣкоторыхъ экземпляровъ) перваго сустава усиковъ, на которомъ замѣтенъ рыжеватый оттенокъ. Этотъ суставъ усиковъ короче головы и выступаетъ на половину далѣе конца носа; 2-й суставъ, постепенно утолщающійся къ вершинѣ, на $\frac{1}{3}$ длиннѣ задняго края переднеспинки, довольно массивный и густо покрытый черноватыми волосками. Переднеспинка съ боковыми краями прямыми, почти гладкая, съ мелкими поперечными морщинками и мельчайшими точками, замѣтными только въ лупу; она покрыта рѣдкими, длинными щетинками. Щитокъ съ весьма тонкими, малозамѣтными, поперечными струйками. Надкрылья нѣжно шагринированныя; перепонка весьма темная, почти черная, также какъ и ребра ея; во внутреннемъ углу, у внутренней клѣтки помѣщается бловатое пятно. Голени темно-бурыя, основанія и вершины ихъ — черные.

Отъ другихъ видовъ этого рода *Rh. niger* отличается небольшой величиной, совершенно чернымъ цвѣтомъ туловища, съ болѣе или менѣе явственнымъ бронзовымъ отливомъ, почти гладкою переднеспинкою и короткимъ основнымъ суставомъ усиковъ.

Нѣсколько экземпляровъ описываемаго вида собрано у подножія Верхоленскихъ горъ.

Иркутскъ.

10 Декабря 1887 года.