

ленное, среднегрудь съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Ноги зеленя, голени къ концу блѣдно-рыжеватыя, покрытыя рѣдкими бѣловатыми щетинками; послѣдній суставъ лапокъ буроватый.

♂. Первый суставъ усиковъ черный, на самой вершинѣ бѣловатый; слѣдующіе черноватые, иногда второй къ основанію бурѣющій; второй суставъ довольно толстый, цилиндрической.

♀. Усики блѣдно желтовато-зеленые, первый суставъ у основанія съ чернымъ пятномъ и черноватой полоской съ нижней стороны; второй суставъ очень тонкій, постепенно расширяющійся къ вершинѣ, одноцвѣтный; послѣдніе суставы буроватые.

### *Camptolomma albicans* n. sp.

♀. Bleichgrün, weiss behaart und bewimpert. Augen klein, schwarz. Fühler dünn, grünlich, Glied 1. und 2. oberseits mit schwarzem Strich; Fühlerglied 2. viel kürzer als Glied 3. und 4. zusammen und nur  $\frac{2}{3}$  des Hinterrandes des Pronotum lang. Halbdecken dicht und sehr fein punktirt; Membran weisslich. Schenkel braun gefleckt und weiss bedornt; Füsse weisslich, Klauen bräunlich. — Long. 2 mm.

♀. Туловище и конечности очень свѣтлаго зеленоватаго цвѣта, покрытыя бѣловатыми короткими волосками и болѣе длинными щетинками такого-же цвѣта; на затылкѣ щетинки принимаютъ буроватый оттѣнокъ. Голова очень широкая, съ небольшими черными глазами, діаметръ которыхъ равняется  $\frac{2}{3}$  ширины затылка. Усики тонкіе, зеленоватые, первый и второй суставы на верхней сторонѣ съ черноватой полоской; второй суставъ на треть короче задняго края переднеспинки и значительно короче третьяго и четвертаго суставовъ вмѣстѣ взятыхъ. Надкрылья густо покрыты очень мелкимъ пунктиромъ; перепонка бѣловатая. Голени имѣютъ буроватя пятна и длинныя бѣловатя щетинки. Лапки бѣловатя съ слабо окрашенными буроватыми когтями.