

Plagiognathus fasciatus n. sp.

♂. Ganz grünlichweiss, oben lang silberweiss behaart und fein schwarz beborstet. Fühler bleich bräunlichgrün, Wurzelglied am Grunde mit schwarzem Ring, vorn und innerseits mit zwei schwarzen Punkten; Glied 2. ziemlich dick, so lang als der Hinterrand des Pronotum. Schnabel auf die dritte Bauchschiene reichend. Schildgrund bleich roströthlich. Membran bleich rauchbräunlich, Zellen schwärzlich, Zellrippen weisslich, von der Cuneusspitze zur Membranmitte ein breiter, schwarzer Querstreif. Beine grünlichweiss, Füsse rostgelblich, Klauenglied bräunlich; Schenkel schwarz punktirt, Hinterschinkel an der oberen Kante mit schwarzem Streif; Schienbeine bleich, aus grossen schwarzen Punkten schwarz bedornt. — Long. 4 mm.

♂. Туловище, надкрылья и ноги весьма блѣднаго зеленоватаго цвѣта, который у сухихъ экземпляровъ почти пропадаетъ; вся поверхность покрыта длинными полустоячими серебристыми волосками, которые на надкрыльяхъ перемѣшаны съ черноватыми. Голова болѣе развитая въ ширину, одноцвѣтная, съ крупными буроватыми глазами и выпуклымъ затылкомъ; усики довольно толстые, блѣднаго буровато-зеленаго цвѣта; первый суставъ ихъ втрое короче головы, съ внутренней стороны его, ближе къ переднему концу, находятся двѣ черныя точки, расположенныя въ поперечномъ направленіи; очень тонкое основаніе его съ чернымъ ливейнымъ кольцомъ; второй суставъ довольно толстый, одинаковой длины съ заднимъ краемъ переднеспинки, весьма блѣдный, къ вершинѣ едва бурѣющій; третій суставъ на треть короче второго. Хоботокъ достигаетъ до 2 — 3 кольца брюшка, послѣдній суставъ его черноватый. Щитокъ въ основаніи съ розоватыми пятнами. Перепонка блѣдно-дымчатая, съ зеленовато-бѣлыми ребрами, въ клѣткахъ которыхъ помѣщается по черноватому пятну; ниже клѣтокъ, начиная отъ остраго края cuneus, проходитъ до половины перепопки поперечная черноватая, нѣсколько извилистая полоса. Надкрылья на треть длиннѣе