

Brachycoleus aurantiacus, n. sp.

D'un flave orangé uniforme sur toute la surface, densément revêtu de poils flaves dressés; antennes et pattes plus rougeâtres; tarsi noirs, antennes noirâtres au sommet; tubercule frontal faible, légèrement avancé.

Var. α . Tête flave, avec une bande longitudinale noire au milieu; pronotum avec une bande noire transversale en avant; noirâtre par place en dessous.

Long. ♂ 8, ♀ 7 mm.

Crimée: Eupatoria.

Видъ этотъ близокъ къ *Br. scriptus* Fabr., особенно къ его разновидности—*v. decolor* Reut. изъ Туркестана, но рѣзко различается слабымъ развитіемъ лобнаго бугорка и одноцвѣтной оранжевой окраской надкрылій, почти безъ продольныхъ черныхъ полосъ; на головѣ черная срединная полоска (var.) не раздѣляется на двѣ, какъ у *Br. scriptus*, а всегда цѣльная.

Holotrichius bicostulatus, n. sp.

♀. Noir, terne sur toute la surface. Tête concolore, sans taches jaunâtres, yeux petits, saillants, hérissés de longs cils; antennes d'un noir brunâtre, avec quelques rares cils noirs; leur 1^{er} article plus court que la tête, le 2^e aussi long que le pronotum; bec noir, à 3^e article roussâtre. Pronotum d'un tiers plus large que long, fortement arrondi au milieu de ces côtés, angles antérieurs saillants et très aigus, angles postérieurs très saillants, courbés, moins aigus au sommet; écusson large, triangulaire, à sommet aigu, relevé. Elytres rudimentaires. Abdomen large, subcordiforme, obtusément caréné longitudinalement au milieu et assez densément couvert de longs poils jaunâtres en dessus; connexivum large, relevé, avec une étroite tache jaunâtre à l'angle postérieur de chaque segment; le bord postérieur du 1^{er} segment élargi en arrière et portant deux fines carènes longitudinales au milieu; dessous de l'abdomen mat, couvert des cils roussâtres, courts. Pattes noires; jambes droites, les antérieures à peine courbées.

Long. 16, larg. 6 $\frac{1}{2}$ mm.

Turkestan occid.: vallée du Zéravshan supérieur entre Yori et Daschty-kazy (A. Semenov! 22. V. 1888).