

Hemiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

Par

B. E. Jakowleff (Eupatoria).

II¹⁾.

Irochrotus mongolicus, n. sp.

♀. Noir avec un faible reflet métallique verdâtre, densément et finement ponctué, hérissé de longues soies brun-noirâtre, surtout sur la tête et sur le bord antérieur du pronotum, mais presque sans pubescence serrée en dessus; tête à épistome large, assez convexe; antennes brunâtres, leur deuxième article d'un quart plus court que le troisième; pronotum assez fortement rétréci en avant, avec le bord latéral droit en partie antérieure; une carène médiane distincte; pattes assez grêles; jambes revêtues de poils jaunes au bord intérieur.

Long. 8, larg. 4¹/₂ mm.

Mongolie occid.: mont Baityk-bogdo (Clementz! 6. VIII. 1898).

Видъ этотъ отличается отъ всѣхъ до сихъ поръ известныхъ почти полнымъ отсутствиемъ на своей поверхности нижняго слоя волосковъ, которые въ видѣ густого войлока обыкновенно скрываютъ настоящій цветъ туловища; даже у наименѣе опущенного

¹⁾ Cf. Revue Russe d'Entomologie, I, 1901, pp. 33—35.

I. caucasicus Jak. мѣстами есть болѣе или менѣе густой подшерстокъ; другой, наиболѣе существенный признакъ заключается въ формѣ переднеспинки, которая у новаго вида значительно суживается кпереди, при чмъ боковые края ея прямые, а шейный уголъ (если смотрѣть сверху) нѣсколько простиренный; у остальныхъ видовъ какъ боковые края, такъ и шейный уголъ болѣе или менѣе широко округленные. Форма усиковъ также иная: они вообще длиннѣе, съ 3-мъ членикомъ гораздо длиннѣе 2-го и почти равныи 4-му.

Arma discors, n. sp.

Forme plus large et plus courte, dessus brunatre, finement et densément pointillée; tête un peu plus large que longue (long. $2\frac{1}{4}$ mm., larg. $2\frac{1}{2}$ mm.), légèrement sinuée au côtés externes; pronotum avec les angles latéraux émoussés, arrondis, sans tache noire à l'extrémité; dos de l'abdomen noir, connexivum large, verdatre en dessus, avec de grandes taches noirâtres ou brunâtres; abdomen plus large que le pronotum. Antennes rousses, l'extrémité des 3^{me} et 4^{me} articles noir; leur 3^{me} article plus court que chez l'*A. custos* F.

Long. (moins la membrane) $11\frac{1}{2}$ mm., larg. 7— $7\frac{1}{2}$ mm.

Grand Khingan: Louh-soumé (2. VII. 1899), Halha-gol (7. VIII. 1899) (expéd. G. N. Potanine! Coll. Semenow).

Во многомъ сходенъ съ *A. custos* Fabr., но представляеть такія особенности, которые позволяютъ выдѣлить эту форму въ особый видъ.

A. discors вообще короче и въ задней своей части шире чѣмъ *A. custos*, благодаря болѣе выдающемся брюшному ободку (conspicuum); спинная сторона брюшка не рыжая, какъ у *A. custos*, а чернаго цвѣта; ширина головы съ глазами превышаетъ ея длину, причемъ боковыя стороны ея вырѣзаны очень слабо, вслѣдствіе чего голова представляется болѣе широкой чѣмъ у *A. custos*, у котораго боковыя вырѣзки очень сильныя; длина головы у этого послѣдняго вида одинакова съ ея шириной, взятой вмѣстѣ съ глазами; плечевые углы переднеспинки у *A. custos* заостренные, далеко выступающіе надъ основаниемъ надкрыльевъ, у нашего же вида эти углы округлены, а потому мало выдаются надъ надкрыльями; третій членикъ усиковъ у *A. discors* гораздо короче чѣмъ у *A. custos*, такъ какъ у первого этотъ членикъ

болѣе чѣмъ въ $2\frac{1}{2}$ раза короче 3-го, тогда какъ у второго только въ два раза. Общій цвѣтъ поверхности болѣе рыжевато-бурый, съ очень тѣснымъ, равномѣрнымъ пунктиромъ.

Heterogaster parens, n. sp.

D'un noir luisant l  g  rement m  tallique,    duvet p  le, rousâtre et    longs poils h  ris  s  s en dessus; t  te noire, avec une petite tache flave sur le vertex; antennes noires,    2^{me} article brunâtre au milieu; lobe ant  rieur du pronotum, les c  t  s compris, noir, lobe post  rieur avec quelques taches oblongues d'un brunâtre p  le;   cusson    sommet flave. Elytres d'un jaune-brunâtre p  le, avec quelques petites taches noirâtres, surtout le long de la membrane, qui est aussi longue que l'abdomen, p  le, presque transparente, avec quelques taches brunâtres au milieu. Dessous noir, connexivum avec des taches jaunâtres; pattes noires; extr  me sommet des cuisses et deux anneaux aux tibias jaunâtres; tarses enti  rement noires.

Long. 7, larg. $2\frac{1}{4}$ mm.

Ala   (exp  d. B. Grombczewsky) 8. VI. 1889).

Голова чернаго цвѣта, со слабымъ металлическимъ отливомъ, вся очень густо и мелко пунктированная, кромѣ носового валика (tylus) и одѣтая двойнымъ покровомъ рыжеватаго цвѣта: короткими прилегающими волосками и болѣе рѣдкими, очень длинными, прямостоячими щетинками; на затылкѣ небольшое рыжее пятнышко; выдающіеся впередъ скапловые отростки оторочены впереди узкой, желтоватой каймой; усики чернаго цвѣта, самая вершина первого членика желтоватая, средина второго—темно-бурая; хоботокъ тонкій, достигающій до средней пары ногъ, черно-бураго цвѣта.

Переднеспинка чернаго цвѣта, съ металлическимъ отливомъ и чернымъ же боковымъ бортикомъ; задняя окраина ея, вмѣстѣ съ плечевыми бугорками, блѣдно-буроватая, съ тремя короткими продольными полосками того-же цвѣта; пунктиръ въ передней ея половинѣ болѣе мелкій, въ задней—крупнѣе и рѣже. Щитокъ черный съ рыжеватымъ остріемъ на концѣ. Какъ и переднеспинка, такъ и щитокъ одѣты такимъ-же двойнымъ покровомъ, какъ и голова.

Надкрылья блѣднаго, желтовато-бураго цвѣта, съ чернымъ

рѣдкимъ пунктиромъ и неясными черноватыми пятнами, изъ которыхъ наиболѣе выдаются два пятна вдоль мембранального шва; поверхность ихъ одѣта короткими, прилегающими волосками; перепонка одинаковой длины съ брюшкомъ, свѣтлая, полупрозрачная, съ буроватыми пятнами посерединѣ.

Брюшко сверху и снизу черного цвѣта, брюшной ободокъ съ большими ярко-рыжими пятнами въ заднихъ углахъ сегментовъ. Ноги черного цвѣта, вершина бедеръ и два кольца на голеняхъ желтоватыя, изъ нихъ верхнее кольцо болѣе ясно выражено чѣмъ второе; тарзы сплошь черные. Голени, кромѣ прилегающихъ волосковъ, имѣютъ еще длинные, стоячіе, бѣловатые волоски.

Длина волосковъ, покрывающихъ верхнюю сторону *H. parens*, сближаетъ его съ *H. urticae* Fabr., но кромѣ окраски новый видъ разнится еще болѣе узкой и вытянутой формой головы, болѣе крупными, но менѣе выдающимися глазами и тонкими уси-ками, второй членикъ которыхъ гораздо длиннѣе третьаго.

Dictyonota aridula, n. sp.

Dessus à r  seau jaune-brunâtre, seulement la t  te et le pronotum noires au milieu; dessous brun. T  te  troite, avec deux grandes  pines conjugu es, yeux noirs, antennes courtes,   la 3^e article de moiti  plus long que le 4^e, d'un brun noirâtre,   longues soies h risse es; marge du pronotum large, foliac e,   trois s ries de cellules; car nes disco dales   un rang de cellules; ampoule arrondie, fortement  lev e ; marge  lytrale unis ri e ,   cellules carr es, except    la base, o  elles sont dispos es bis ri alement; espace lat ral tris ri , disco dal   4 s ries de cellules. Pattes jaunâtres.

Long. 3³/₄ mm.

Crim e : Eupatoria.

Относится къ группѣ *D. crassicornis* Fall., отличаясь отъ этого вида главнымъ образомъ болѣе короткими уси-ками, у которыхъ 3-й членикъ только на половину длиннѣе 4-го (у *D. crassicornis*—3-й членикъ болѣе чѣмъ вдвое длиннѣе 4-го); по укороченности уси-ковъ новый видъ приближается къ *D. truncaticollis* Costa, но разнится отъ него уси-ками, одѣтыми стоячими щетинками, боковымъ краемъ надкрылій въ одинъ рядъ клѣтокъ и высокимъ шейнымъ пузирекомъ, тогда какъ у *D. truncaticollis* уси-ки покрыты прилегающими щетинками, а боковой край надкрылій въ два ряда клѣтокъ.

Dictyonota (Elina) eupatoriae, n. sp.

Allongé, assez étroit, d'un jaune brunâtre mat. Tête grande, noire, avec deux fortes épines conjuguées; antennes brunes, les deux premiers articles glabres, courts, le premier atteignant l'extremité du clypeus, plus clair et plus long que le 2^e qui est globuleux; le troisième long, très épais, cylindrique, mais renflé à la base, à tubercules très fins, et à soies très courtes, couchées; le quatrième deux fois plus court que le 3^e, noir, à longs cils blancs. Pronotum assez large, avec une ampoule antérieure aplatie, ayant une série de cellules et une raie transverse d'un blanc de neige au tiers antérieure; marge latérale avec deux rangées de cellules; disque d'un brun foncé au milieu; carènes discoïdales à un rang de cellules; processus large à l'extrémité, plus clair, d'un jaunâtre sale. Elytres déhiscentes à la suture; marge latérale à un rang de cellules, plus grandes à la base, espace lateral quadrisérié, espace discoïdal trisérié, le sutural unisérié en avant, bisérié en arrière. Abdomen d'un brun foncé, presque noirâtre en dessous. Pattes brunâtres, tarses plus sombres.

Long. 2, larg. 3/4 mm.

Crimée: Eupatoria.

Туловище небольшое, узкое, буроватого цвета. Голова толстая, выпуклая в затылочной половине, съ двойнымъ лобнымъ шипомъ, направленнымъ впередъ, и толстыми шипами у основания усиковъ; глаза большие, выпуклые, съ крупными фасетками; склеротизированные лопасти широкія, во всю длину головы, напереди округленныя; усики толстые, третій членикъ ихъ цилиндрический, расширенный въ основании, покрытъ мельчайшими бугорками съ короткими щетинками, а послѣдній—длинными бѣлыми волосками; 2-ой членикъ почти шарообразный, замѣтно короче 1-го, оба гладкие. Голова, глаза и послѣдній членикъ усиковъ черного цвета, шипы у основания усиковъ и самые усики красновато-бурые, первый членикъ ихъ светлѣе прочихъ; склеротизированные лопасти блѣдно-бурыя.

Переднеспинка буроватая, съ боковыми краями округленными, съ двумя рядами петель, изъ которыхъ вѣнчній рядъ заключается въ себѣ отъ 6 до 7 болѣе крупныхъ клѣтокъ, чѣмъ внутреннія; шейный пузырь узкій, лунообразный, едва приподнятый, въ одинъ рядъ клѣтокъ, изъ которыхъ двѣ наиболѣе крупные помѣщаются посрединѣ; сзади шейнаго пузыря, непосредственно

примыкая къ нему, находится поперечная, довольно широкая полоска синько-блѣлого цвѣта (которая у сухихъ экземпляровъ исчезаетъ иногда совершенно безслѣдно); далѣе этой полоски, которая вмѣстѣ съ шейнымъ пузыремъ занимаетъ переднюю третью переднеспинки, идутъ, до самаго конца, три продольныхъ, параллельныхъ ребра, низкихъ, въ одинъ рядъ клѣтокъ; изъ нихъ среднее нѣсколько переходитъ и на блѣлую полоску; какъ передняя, такъ и задняя трети переднеспинки отдѣляются довольно глубокими, поперечными бороздками; задній конецъ переднеспинки укороченный, широкій, слегка приостренный на вершинѣ, блѣловатаго цвѣта.

Крыльевъ нѣтъ; надкрылья узкія, неполныя, прикрывающія только бока брюшка, средина же его остается открытою (характерный признакъ для подрода *Elina*); краевая часть, нѣсколько болѣе расширенная въ основаніи, образована изъ одного ряда клѣтокъ, продолговатой формы и болѣе крупныхъ чѣмъ на остальной поверхности надкрыльевъ; боковая часть состоитъ изъ 4-хъ неправильныхъ рядовъ очень мелкихъ клѣтокъ, за исключеніемъ верхняго ряда, гдѣ онѣ крупнѣе; дискоидальная часть въ 3 ряда клѣтокъ и, наконецъ, неполная мембранильная часть образована изъ одного ряда клѣтокъ почти по всей длини, за исключеніемъ конца, гдѣ клѣтки парные. Вся сѣть надкрылій и переднеспинки бураго, мѣстами болѣе или менѣе свѣтлаго цвѣта, самыя же клѣтки блѣловатыя (у сухихъ экз. грязно-желтыя). Брюшко темнобурое, снизу почти чернаго цвѣта, открытая сверху часть его красновато-бураго (у живыхъ). Ноги такого-же цвѣта, какъ и все туловище; тарзы темнѣе.

Я нашелъ только три экз. этого вида (два—3. VII. 1901 и одинъ 11. VIII.) у корней полыни (*Artemisia* sp.), гдѣ, несмотря на свою незначительную величину, они рѣзко бросались въ глаза, благодаря синько-блѣлому пятну на переднеспинкѣ; къ сожалѣнію, этотъ признакъ совершенно исчезаетъ у сухихъ экземпляровъ.

Puton далъ краткую, но ясную синоптическую таблицу всѣхъ донынѣ извѣстныхъ видовъ этого рода (*Revue d'Ent.* 1895, p. 86); согласно этой таблицѣ нашъ видъ долженъ стоять рядомъ съ *D. (E.) putoni* Ferr., отличаясь отъ него, кромѣ блѣлого пятна, о которомъ упомянуто выше, расширеннымъ основаніемъ 3-го членика усиковъ и нѣкоторыми особенностями въ формѣ клѣточекъ и въ окраскѣ.

Brachycoleus aurantiacus, n. sp.

D'un flave orangé uniforme sur toute la surface, densément revêtu de poils flaves dressés; antennes et pattes plus rougeâtres; tarses noires, antennes noirâtres au sommet; tubercle frontal faible, légèrement avancé.

Var. α . Tête flave, avec une bande longitudinale noire au milieu; pronotum avec une bande noire transversale en avant; noirâtre par place en dessous.

Long. ♂ 8, ♀ 7 mm.

Crimée: Eupatoria.

Видъ этотъ близокъ къ *Br. scriptus* F a b r., особенно къ его разновидности—v. *decolor* Reut. изъ Туркестана, но рѣзко различается слабымъ развитиемъ лобнаго бугорка и одноцвѣтной оранжевой окраской надкрылій, почти безъ продольныхъ черныхъ полосъ; на головѣ черная срединная полоска (var.) не разрѣвѣнется на двѣ, какъ у *Br. scriptus*, а всегда цѣльная.

Holotrichius bicostulatus, n. sp.

♀. Noir, terne sur toute la surface. Tête concolore, sans taches jaunâtres, yeux petits, saillants, hérissés de longs cils; antennes d'un noir brunâtre, avec quelques rares cils noirs; leur 1^{er} article plus court que la tête, le 2^e aussi long que le pronotum; bec noir, à 3^e article roussâtre. Pronotum d'un tiers plus large que long, fortement arrondi au milieu de ces côtés, angles antérieurs saillants et très aigus, angles postérieurs très saillants, courbés, moins aigus au sommet; écusson large, triangulaire, à sommet aigu, relevé. Elytres rudimentaires. Abdomen large, subcordiforme, obtusément caréné longitudinalement au milieu et assez densément couvert de longs poils jaunâtres en dessus; connexivum large, relevé, avec une étroite tache jaunâtre à l'angle postérieur de chaque segment; le bord postérieur du 1^{er} segment élargi en arrière et portant deux fines carènes longitudinales au milieu; dessous de l'abdomen mat, couvert des cils roussâtres, courts. Pattes noires; jambes droites, les antérieures à peine courbées.

Long. 16, larg. 6 $\frac{1}{2}$ mm.

Turkestan occid.: vallée du Zérvachan supérieur entre Yori et Daschty-kazy (A. Semenow! 22. V. 1888).

Видъ этотъ очень близокъ къ *H. sibiricus* Reut., но хорошо отличается отъ него нѣкоторыми существенными признаками, а именно: 1-е брюшное кольцо сверху образуетъ посрединѣ округленный выступъ, а вдоль этого кольца проходятъ два тонкихъ, но рѣзкихъ ребра, какъ разъ надъ срединнымъ выступомъ; такихъ реберъ не встрѣчается болѣе ни у одного изъ известныхъ видовъ; спинная сторона брюшка довольно густо одѣта длинными, полустоячими волосками рыжевато-желтаго цвѣта, тогда какъ у *H. sibiricus* ♀ брюшко покрыто черными щетинками; голова у новаго вида одноцвѣтная, не имѣющая рыжаго пятна, которое выступаетъ на затылкѣ у *H. sibiricus*; продольныя бороздки на переднеспинкѣ у обоихъ видовъ расположены иначе, и у *H. bicostulatus* средняя, болѣе широкая, бороздка отдѣляется отъ себя короткую, парную вѣтку въ нижней трети; наконецъ, задній вытянутый уголъ переднеспинки на концѣ тупой, а не заостренный какъ у *H. sibiricus* Reut.

Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

Par

B. E. Jakowleff (Eupatoria).

III¹⁾.

Picromerus longicollis, n. sp.

Dessus d'un brunâtre très pâle; tête, pronotum en avant et sur les côtés ainsi que l'écusson vert-métallique; dessous du corps d'un flave blanchâtre, très finement et vaguement ponctué de noir. Tête, yeux compris, plus longue que large, antennes d'un flave jaunâtre; leur 3^e articte égal au 2^e, noir au tiers apical, les deux derniers articles d'un noir jaunâtre à la base. Pronotum allongé en avant, fortement denticulé au bord latéral; bord antérieur un peu plus large que la tête, yeux compris; angle latéral long, d'un bronzé noir. Ecusson plus long (5 mm.) que large ($4\frac{1}{2}$ mm.). Connexivum noir bronzé, avec une bande jaunâtre au milieu de chaque segment. Tarses postérieurs à 1^{er} article à peine plus long que les deux suivants pris ensemble.

Long. 14, larg. (abdomen) 8 mm.

Vladivostok.

¹⁾ Cf. Revue Russe d'Entomologie, II, 1902, pp. 63—70.

Похожъ на обыкновеннааго *P. bidens* L., но отличается, съ первого взгляда, болѣе вытянутыми головой, переднеспинкой и щиткомъ, а также присутствиемъ черныхъ колецъ на усикахъ.

Туловище блѣдно-буроватое, довольно сильно пунктированное сверху, съ-металлическимъ блескомъ на головѣ и боковыхъ окраинахъ переднеспинки и болѣе слабымъ металлическимъ отливомъ на щиткѣ. Голова довольно узкая, вытянутая, при чемъ длина ея гораздо болѣе ширины взятой вмѣстѣ съ глазами (у *P. bidens* ширина головы нѣсколько превышаетъ длину); носовой валикъ плоский, широкій, выступающій впереди наравнѣ со скаповыми отростками, которые на вершинѣ округлены, а съ боковъ замѣтно вырѣзаны; глаза крупные, выпуклые; хоботокъ массивный, весь свѣтлый, на концѣ едва бурѣющій, достигающій до брюшка; усики длинные, свѣтло-желтоватые, вершина 3-го и послѣдніе два членика черные, съ рыжеватымъ основаниемъ; 2-й членикъ слегка изогнутый, равный по длини 3-му (у *P. bidens* 3-й короче 2-го); поверхность головы вся металлически-зеленаго цвѣта, сквозь который, мѣстами, проступаютъ свѣтло-буроватыя полоски, особенно же двѣ на затылкѣ.

Переднеспинка съ плечевыми углами вытянутыми въ длинный, острый шипъ, назади вырѣзанный, съ дополнительнымъ шипикомъ передъ вершиной; весь шипъ черно-бронзоваго цвѣта, боковые края переднеспинки съ сильными, блѣдоватыми зубчиками неправильной формы; передній край очень глубоко вырѣзанъ и шире головы взятой съ глазами (у *P. bidens* этотъ край уже головы); передняя часть переднеспинки сильно вытянута и съужена кпереди; извилины глубокія, съ двумя блѣдоватыми бугорками сзади каждой. Щитокъ вытянутый, болѣе развитой въ длину, чѣмъ въ ширину (у *P. bidens* ширина его въ основаніи равна длине), съ блѣдыми бугорками въ основныхъ углахъ, блѣдоватой вершиной и неяснымъ продольнымъ ребромъ посерединѣ.

Надкрылья матовыя, болѣе мелко пунктированныя чѣмъ остальная поверхность; перепонка одинаковой длины съ брюшкомъ; connexivum (ободокъ брюшка) выдающійся изъ-подъ надкрыльевъ, свѣтлый, съ черно-бронзовыми большими пятнами въ мѣстахъ соединенія сегментовъ. Туловище снизу очень блѣдное, особенно брюшко, нѣжно пунктированное; посерединѣ послѣдняго брюшного кольца находится черно-буровое пятно, а на предпослѣднемъ такая же черта; дыхальца буроватыя. Ноги такого-же цвѣта, какъ и

туловище снизу, густо покрыты бурыми точками; колъна бурыя; первыя два членика тарзовъ свѣтлые, послѣдній черноватый; первый членикъ задней пары тарзовъ едва длиннѣе двухъ послѣднихъ взятыхъ вмѣстѣ.

Владивостокъ (изъ сбора Д. Л. Иванова 1890 г.; колл. Н. Н. Семенова).

Ранѣе описанный мною, изъ той-же, приблизительно, мѣстности (Радевка на Амурѣ) *P. angusticeps* Jak. (1880) отличается отъ новаго вида небольшой величиной (дл. $9\frac{1}{2}$ mm.), наружной поверхностью безъ металлическаго блеска, короткими плечевыми углами переднеспинки блѣдно-буроватаго цвѣта и, наконецъ, первымъ членикомъ задней пары тарзовъ нѣсколько короче остальныхъ двухъ члениковъ вмѣстѣ взятыхъ.

***Myrmus tenuicornis*, n. sp.**

Allongé, étroit, subparallèle, concolore, presque glabre. Tête de moitié plus longue que le pronotum au milieu, à pubescence blanchâtre, très courte et rare; antennes grêles, à pubescence argentée, très courte; articles 2 et 3 subégaux, cylindriques, 2^e à peine renflé à la base, 4^e plus long que le 1^{er} et d'un tiers plus court que le 3^e; articles basilaires rosés, 3^e et 4^e légèrement brunâtres. Pronotum subquadrangulaire, un peu plus large que long, caréné longitudinalement au milieu et sur les côtés; écusson étroit, plus long que large; corie très courte, rougeâtre sur le clavus; membrane très étroite. Abdomen tout-à-fait verdâtre, sans ligne noire au milieu. Pattes grêles, presque glabres; premier article des tarses postérieurs de moitié plus long que les 2^a et 3^e réunis.

Long. 9, larg. 1,5 mm.

Grand Khingan: Halha-gol (7. VIII. 1899; expéd. G. N. Potanine! Coll. Semenow).

Отличается отъ другихъ видовъ, которыхъ извѣстно всего три, тонкими и нѣжными конечностями, безъ стоячихъ щетинокъ, которыми онъ обыкновенно покрыты; туловище нашего вида вообще болѣе узкое, стройное и гладкое; первый членикъ заднихъ тарзовъ въ полторараза длиннѣе остальныхъ двухъ члениковъ взятыхъ вмѣстѣ (у другихъ видовъ онъ гораздо короче); наконецъ, послѣдній членикъ усиковъ длиннѣе основного.

Berytus costulatus, n. sp.

D'un gris jaunâtre pâle, sommet de la corie noir, élytres et abdomen arqués sur les côtés, très brièvement poilus, glabres par places. Tête aussi longue que le pronotum; crête épistomale lancéolée, émoussée au sommet, longue; 1^{er} article des antennes plus court que la tête et le pronotum réunis, à massue apicale noire, 2^e deux fois plus court que le 4^e, qui est noir, fusiforme et garni de longs poils grisâtres; 3^e article très grêle, d'un quart plus long que le 1^{er}, noirâtre au sommet. Pronotum presque plan en dessus, avec trois carènes longitudinales blanchâtres, droites; angles antérieurs aigus, avancés, bord postérieur échancré en arc. Elytres concolores, seulement le sommet de la corie noir; membrane lancéolée, les deux nervures internes non réunies après leur base, 2^e nervure externe très épaissie, caréniforme sur toute sa longueur; le mâle avec deux bandes noirâtres; élytres aussi longs que l'abdomen chez la ♀, plus longs chez le ♂. Massue des cuisses graduellement renflée, noire (♂), ou noirâtre (♀). Abdomen concolore, fortement et densément ponctué, avec une ligne blanchâtre médiane en dessous.

Long. 6—7,5 mm., larg 0,7—1,7 mm.

Crimée: Tarnaïr (distr. de Symphéropol) (5. VIII. 1901. L. Motschánowl).

Отъ всѣхъ остальныхъ видовъ этого рода отличается, съ перваго взгляда, строенiemъ реберъ перепонки, изъ которыхъ второе отъ виѣшняго края очень утолщено по всей своей длинѣ (♂♀), тогда какъ остальные ребра имѣютъ обычную форму тонкихъ жилокъ; булава на вершинѣ бедръ утолщается къ концу настолько постепенно и незамѣтно, что невозможно опредѣлить ея начало.—Два экземпляра этого вида мною были получены изъ Симферопольскаго Земскаго Музея, черезъ посредство С. А. Мокрежекаго.

Solenoxyphus longicornis, n. sp.

D'un verdâtre très pâle, couvert de pubescence blanchâtre, avec des poils longs et couchés en dessus, plus courts et argentés en dessous. Tête plus large que l'écusson à la base et d'un tiers plus étroite que le pronotum au bord postérieur; yeux grands, noirs,

à grosses facettes; antennes longues, concolores, d'un verdâtre fluorescent très pâle, à 2^e article à peine plus long que le bord postérieur du pronotum et d'un quart plus long que le 3^e article; bec atteignant les pattes postérieures. Pronotum et écurosson concolores. Elytres blanchâtres, parsemés de petits points noirâtres, ainsi que la membrane. Pattes concolores, cuisses ponctuées de brun, tibias avec de longues soies blanches, sortant de taches ponctiformes brunâtres.

Long. 4, larg. 1 1/2 mm.

Crimée: Eupatoria.

Туловище довольно длинное, параллельное, бледно-зеленоватого цвета; надкрылья бледноватыя, густо покрытыя, не исключая и перепонки, буровато-черными точками; вся верхняя сторона густо одета длинными, прилегающими, бледноватыми волосками, которые на надкрыльяхъ, при извѣстномъ положеніи къ свѣту, принимаютъ буроватый оттѣнокъ; усики и ноги длинныя. Голова широкая, гораздо шире основанія щитка и почти на треть уже заднаго края переднеспинки; глаза болыше, поперечные, съ крупными фасетками, чернаго цвета; усики одноцвѣтны; 1-й членникъ ихъ едва выступаетъ далѣе конца носа, 2-й по всей длини одинаковой толщины, едва длиннѣе заднаго края переднеспинки, 3-й членникъ па 1/4 короче 2-го. Хоботокъ достигаетъ до задней пары ногъ. Переднеспинка и щитокъ одноцвѣтны; надкрылья бледноватыя, сплошь и довольно густо усыпаныя черноватыми пятнышками въ видѣ точекъ; на cuneus точки эти гораздо мельче, а въ основаніи ихъ и совершенно неѣтъ; перепонка гораздо длиннѣе брюшка, свѣтлая, слегка опализывающаяся, съ бледноватыми ребрышками клѣтокъ, покрытая многочисленными темно-бурыми точками, иногда сливающимися; только пространство заключенное въ клѣткахъ лишено точекъ. Брюшко болые густого зеленаго цвета, чѣмъ остальное туловище, и покрыто короткими, серебристыми волосками. Ноги бледно-зеленоватыя, белые, особенно заднія, покрыты мельчайшими буроватыми точками; голени съ такими-же, но болые рѣдкими точками по верхнему краю, вооруженными длинными, блѣдыми щетинками; такія-же щетинки имѣются и по верхнему ребру заднихъ бедръ; тарзы свѣтлые, но самый кончикъ 3-го членника и когти чернаго цвета.

Изъ доселѣ известныхъ 4-хъ видовъ *Solenoxanthus*, свойственныхъ преимущественно русской фаунѣ, новый видъ наиболѣе

близокъ къ *S. kirgisicus* Frey, отличаясь отъ него, какъ и отъ прочихъ видовъ, болѣе длинными усиками; у *S. kirgisicus* второй членникъ ихъ едва длиннѣе ширины головы, тогда какъ у нашего вида, онъ не только гораздо длиннѣе ширины головы, но и замѣтно длиннѣе ширины переднеспинки по заднему ея краю; кроме того у нашего вида переднеспинка и щитокъ одноцвѣтные, тогда какъ у *S. kirgisicus* эти части, также какъ и надкрылья, покрыты черноватыми точками.

Единственный экземпляръ этого вида влетѣлъ въ комнату, на свѣтъ огня, въ сентябрѣ мѣсяца.
