

plus élargie en avant, où elle est trisériée; carènes discoïdales unisériées; marge des élytres bisériée, les cellules grandes et irrégulières; espace latéral bisérié, à cellules d'égale largeur. Long. 4—4,5, larg. 1,7—1,9 mm.

*Gouvern. Taurique: Alechki (Алешки) (10. VI. 1901. Jatsentkovsky!).*

Туловище снизу, голова, усики и бедра черного цвѣта, середина переднеспинки буроватая, вся же наружная сторона блѣдно-желтовато-сѣрая. Голова съ поверхностью мелко-зернистой и съ обычными двумя парами желтоватыхъ шиповъ; усики короткіе, толстые, 3<sup>я</sup> членикъ цилиндрической, толще прочихъ, покрытъ мелкими бугорками и очень короткими прилегающими волосками. Переднеспинка съ боковыми краями въ два ряда клѣтокъ, кпереди болѣе расширенными, округленными, съ тройнымъ рядомъ клѣтокъ; шейный пузырь небольшой, узкій, сверху округленный, незакрывающій головы; три кили вдоль переднеспинки высокіе, въ одинъ рядъ клѣтокъ. Надкрылья съ наружными краями листоватыми, въ два ряда очень неправильныхъ клѣтокъ черного цвѣта, клѣтки остальной части надкрылій буроватыя; боковое поле въ два ряда крупныхъ клѣтокъ, одинаковой величины; дискоидальная площадка, съ большими клѣтками только вдоль внѣшняго ребра, остальные же мелкія и болѣе свѣтлыя. Срединная бороздка груди окраена съ обѣихъ сторонъ листоватыми килами, раздѣленными на клѣтки, почти такой-же величины какъ и кили на переднеспинкѣ. Голени буровато-рыжаго цвѣта.

Новый видъ примыкаетъ непосредственно къ *D. marmorea* Вăг, но крупнѣе и шире его; боковые края надкрылій нашего вида слегка вырѣзаны передъ заднимъ концомъ и въ два ряда клѣтокъ; боковое поле также въ два ряда крупныхъ, одинаковой величины клѣтокъ, тогда какъ у *D. marmorea* наружное поле надкрылій въ одинъ рядъ клѣтокъ, а боковое поле, хотя и въ два ряда петель, но въ одномъ ряду петли гораздо мельче, чѣмъ въ другомъ.

### *Tuponia tincta*, n. sp.

Dessus rosé, plus foncé au sommet du corium et à la base de l'écusson; dessous, antennes et pattes jaunâtres, très pâles, sans points ni taches plus obscurs; élytres couverts de poils blanchâtres couchés; ongles et yeux noirâtres. Tête convexe; pronotum d'un tiers plus large, en arrière, que la nuque (yeux compris); antennes longues, à 2<sup>e</sup> article deux fois plus long que la largeur de la nuque; rostre ne dépassant pas les hanches postérieures, noirâtre au sommet; cuneus et membrane clairs, un peu enfumés, nervures de la membrane blanchâtres; tibiais à cils longs, blancs.

Long. ♀ 3,5, larg. 1,6 mm.

*Transcaspienne: Tedjène (A. Semenov!).*

Изъ многочисленныхъ представителей р. *Tuponia*, которыхъ въ одной фаунѣ Россіи считается до 14 видовъ, извѣстенъ только одинъ