Hemiptera-Heteroptera Таврической губерніи. Второе дополненіе *).

В. Е. Яковлева (Евпаторія).

Въ своемъ первомъ этюдѣ о *Hemiptera-Heteroptera* Таврической губерніи я, между прочимъ, выразилъ мнѣніе, что въ Крыму должно встрѣчаться не 400 видовъ, приведенныхъ въ спискѣ, а вдвое болѣе.

А. П. Семеновъ, въ рефератѣ моей статьи [1]), возсталъ противъ такого мнѣнія, а мое сравненіе крымской фауны съ венгерской назвалъ прямо неудачнымъ, на томъ основаніи, что фауна послѣдней страны должна быть, по его соображеніямъ, гораздо богаче таврической, на *значительную бѣдность* которой онъ уже имѣлъ случай указывать [2]).

Въ послѣдней статьѣ, дѣйствительно, имѣется такое положеніе: „горная часть Крыма представляетъ дошедшій до насъ въ почти неизмѣненномъ видѣ обломокъ балкано-малоазійской природы со свойственными ей, хотя и сильно обѣдненными, фауной и флорой, которыя въ современную намъ эпоху отчасти комплектуются выходцами изъ степи".

Такъ какъ я занимаюсь спеціально гемиптерологической фауной, то и буду говорить только о ней; однако, за отсутствіемъ матеріаловъ съ южнаго берега и прилегающихъ къ нему горъ, я ничего не могу сказать относительно обѣдненія этой части Крыма элементами чуждой теперь ей фауны, но что касается до фауны полужесткокрылыхъ вообще всего Крыма, то долженъ замѣтить, что она очень богата, гораздо богаче любой мѣстности Европейской Россіи, насколько позволяютъ судить о томъ свѣдѣнія имѣющіяся въ литературѣ.

Относительно сопоставленія крымской фауны съ венгерской, которое А. П. Семеновъ призналъ неудачнымъ, я совершенно противнаго мнѣнія. Венгрія, какъ страна наиболѣе къ намъ близ-

*) См. Horae Soc. Ent. Ross., XXXVII, 1905—1906, pp. 220—246; Revue Russe d'Entom. 1905, pp. 221—224.

[1]) Русск. Энт. Обозр., V, 1905, стр. 179.

[2]) Зап. Имп. Ак. Наукъ по физ.-мат. отд., т. VIII, № 6, 1899.

кая [3]), и, въ то же время, наиболѣе полно изслѣдованная, какъ разъ подходила для Крыма въ качествѣ указателя степени изученности нашей фауны и того предѣла, котораго мы, крымскіе изслѣдователи, должны достигнуть въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ.

Не надо забывать, что изученіе полужесткокрылыхъ Крыма началось, можно сказать, на этихъ дняхъ, тогда какъ изслѣдованія венгерской фауны имѣютъ за собою столѣтнюю давность, при чемъ одинъ Dr. Horváth посвятилъ этому дѣлу 35 лѣтъ, и когда онъ, въ память тысячелѣтія Венгріи, далъ списокъ всѣхъ полужесткокрылыхъ его страны, то это былъ, казалось, уже окончательный итогъ дѣятельности венгерскихъ энтомологовъ; однако и послѣ того фауна Венгріи продолжала и донынѣ продолжаетъ обогащаться новыми для нея, ранѣе не замѣченными видами.

Изъ этого видно, что богатство фауны какой-либо страны открывается не сразу, что потребны продолжительные, многолѣтніе сборы для того, чтобы имѣть о ней болѣе или менѣе точное представленіе. Поэтому, не будетъ ли слишкомъ преувеличеннымъ заявленіе А. П. Семенова о значительной бѣдности крымской фауны, изученіе которой только-что началось?

При составленіи своего перваго списка я былъ убѣжденъ въ его крайней неполнотѣ, такъ какъ въ немъ было множество пробѣловъ; нѣкоторыя семейства прямо поражали своимъ убожествомъ; но надо было съ чего-нибудь начать, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ; важенъ былъ починъ, какимъ и былъ мой первый списокъ; за дополненіями дѣло не стало: въ 1905 г. прибавилось всего 11 видовъ (почти исключительно евпаторійскихъ), но въ настоящемъ, 1906 г., благодаря обширнымъ сборамъ А. Н. Кириченко, а также коллекціи В. Г. Плигинскаго, число новыхъ для Крыма видовъ достигло уже до 70; и это далеко не все: въ моей коллекціи хранятся десятка два-три видовъ невыясненныхъ, которыхъ я, по неимѣнію матеріаловъ для сравненія и изъ опасенія ошибокъ, оставилъ неопредѣленными, разсчитывая на помощь моихъ энтомологическихъ друзей—проф. Reuter'а и д-ра Horváth'а поставленныхъ въ условія болѣе благопріятныя, чѣмъ я.

Такимъ образомъ, въ послѣдніе два года (1905—1906 гг.) численность крымскихъ полужесткокрылыхъ достигла по меньшей мѣрѣ 500 видовъ; но, если принять въ разсчетъ общій характеръ южнорусской фауны, многіе элементы которой должны встрѣтиться въ Крыму и заполнить тѣ пробѣлы, которые замѣтны для каждаго гемиптеролога въ большинствѣ семействъ, то численность крымскихъ *Heteroptera* достигнетъ, рано или поздно, того уровня, на которомъ она стоитъ въ Венгріи.

Чтобы предположеніе это не казалось голословнымъ, я считаю нужнымъ привести нѣкоторыя фактическія данныя и соображенія.

---

[3]) Даже и по фаунѣ; Dr. Horváth, ознакомившись съ моимъ первымъ этюдомъ, писалъ мнѣ объ этомъ сходствѣ.

Такъ какъ крымскія полужесткокрылыя собирались въ большинствѣ случаевъ не спеціалистами, то ими брались преимущественно виды крупные, бросающіеся въ глаза, на мелочь же, за рѣдкими исключеніями, не обращалось никакого вниманія; поэтому, если взять для сравненія съ венгерской фауной семейства и подсемейства, въ которыхъ преобладаютъ формы крупной величины, то вовсе нельзя замѣтить разительной разницы въ численности видовъ; если же таковая встрѣчается, то никакъ не вслѣдствіе бѣдности фауны (о которой не можетъ быть рѣчи), а только благодаря ограниченности и кратковременности мѣстныхъ изслѣдованій.

Изъ сравненія, между прочимъ, оказывается:

Въ	подсем.	*Scutellerina*	въ	Крыму—	27	вид.,	въ	Венгріи—	27.
„	„	*Cydnina*	„	„	16	„	„	„	19.
„	сем.	*Coreidae*	„	„	42	„	„	„	47.
„	„	*Reduviidae*	„	„	29	„	„	„	28.
„	„	*Nepidae*	„	„	3	„	„	„	2.
„	„	*Notonectidae*	„	„	3	„	„	„	3.

Такимъ образомъ, если семейства съ крупными формами мало или вовсе не отстаютъ по численности отъ венгерскихъ, то нѣтъ основанія предполагать, чтобы въ остальныхъ семействахъ, въ которыхъ преобладаютъ мелкія формы, крымскихъ видовъ должно было быть меньше, чѣмъ венгерскихъ. Возможно и вполнѣ естественно ожидать разницы въ количествѣ видовъ въ большинствѣ семействъ той и другой фауны, но общее число видовъ должно быть приблизительно одинаково.

Въ настоящій списокъ войдутъ только виды впервые замѣченные въ Крыму; что же касается до новыхъ мѣстонахожденій видовъ, уже включенныхъ въ мой первый списокъ, то я отлагаю эти свѣдѣнія до другого раза; только списокъ fam. *Tingitidae* я долженъ былъ вновь передѣлать, согласно вышедшей въ этомъ году монографіи д-ра Horváth'a, при чемъ въ него пришлось ввести всѣ виды извѣстные изъ Крыма и ранѣе; виды же, указанные для Крыма впервые, отмѣчены звѣздочкой.

Fam. **Pentatomidae.**

Odontoscelis hispidulus Jak. Найденъ А. Н. Кириченко на г. Аргамышѣ (15. V. 06) въ одномъ экз. Видъ этотъ былъ описанъ изъ ю.-в. угла Европейской Россіи, но впослѣдствіи Dr. Horváth отмѣтилъ его для Венгріи; затѣмъ онъ нашелся въ Семирѣчьѣ и въ Египтѣ.

Psacasta neglecta H.-S. Найденъ В. Г. Плигинскимъ въ окрестностяхъ Севастополя, въ числѣ трехъ экз.

Eurygaster maroccana F. Крымъ (Горскій).

Crypsinus angustatus Bär. Отузы, 1 экз. (Кир.). Былъ описанъ первоначально съ береговъ Волги, а затѣмъ замѣченъ въ Западной Европѣ и Туркестанѣ.

Примѣч. Въ 30-мъ выпускѣ Wytsman, Gen. Insect. H. Schouteden (p. 20) установилъ второй видъ этого рода—*C. jakowleffi*, основываясь на разницѣ въ длинѣ члениковъ усиковъ, замѣченной имъ при штудированіи моего описанія *C. angustatus* (Horae Soc. Ent. Ross., XVIII, 1884, p. 231); такъ какъ въ мои діагнозы вкралась описка [4]), къ сожалѣнію оставленная безъ исправленія, которая только и послужила поводомъ къ установленію новаго вида, то названіе Schouteden'a должно быть отнесено къ синонимамъ *C. angustatus*.

Vilpianus galli Wff. Керчь, Шах-мамай (Кир.). Распространеніе этого вида по южной Россіи еще мало извѣстно.

Sternodontus affinis Westw. (=*obtusus* M. R.).

Немногочисленные представители этого рода, вообще очень рѣдкіе въ коллекціяхъ, извѣстны только въ палеарктической области гдѣ распространеніе ихъ представляетъ замѣчательныя особенности; такъ, въ Европѣ они встрѣчаются только въ предѣлахъ средиземноморской подобласти, тогда какъ въ Сибири поднимаются очень высоко къ С.,—до Якутска, откуда я имѣю экз. *St. similis* Stål; въ западной и средней Азіи ихъ не замѣчено, но на самой южной окраинѣ Закавказья встрѣчается еще одинъ видъ.

Что касается до *St. affinis*, то до сихъ поръ онъ былъ извѣстенъ изъ южной Франціи, сѣв. Италіи и Иллиріи; находка его въ Крыму, и при томъ въ значительномъ количествѣ (Агармышъ, Кир.), раздвигаетъ границу его на востокъ.

Недурной, хотя грубоватый рисунокъ этого вида данъ Schouteden'омъ въ 30-мъ вып. Wytsman, Gen. Ins., 1905.

St. debilicostis Put. Агармышъ, 2 экз. (Кир.).

Отличительные признаки этого вида, приведенные д-ромъ Puton'омъ, вполнѣ совпадаютъ съ нашими экземплярами, но для меня видовое значеніе *St. debilicostis* пока неясно, такъ какъ крымскіе экз. весьма напоминаютъ, судя по описанію, *St. purpureus* Reut. изъ Сибири, а потому нуждаются въ сличеніи. Хотя до сихъ поръ этотъ малоизвѣстный видъ былъ замѣченъ только въ Иллиріи (Горицъ), но это обстоятельство нисколько не препятствуетъ тождеству его съ сибирскимъ видомъ; такому сближенію есть уже примѣры: такъ, одинъ видъ *Aelia* былъ описанъ почти одновременно изъ Сибири, какъ *A. sibirica* Reut., и изъ Иллиріи, какъ *A. henschi* Montd.; одинъ видъ *Polymerus* былъ описанъ мною изъ Иркутска, какъ *P. aterrimus*, и изъ Венгріи, какъ *P. carpathicus* Horv. и т. п.

---

[4]) Именно, показано, что второй членикъ усиковъ вдвое *короче* третьяго, тогда какъ слѣдовало сказать, что онъ вдвое *длиннѣе* его.

Geotomus punctulatus Costa. Нѣсколько экз., собранныхъ В. Г. Плигинскимъ въ окр. Севастополя. Въ предѣлахъ Европ. Россіи извѣстенъ былъ до сихъ поръ только изъ Сарепты.

Sehirus biguttatus L. Найденъ тѣмъ-же собирателемъ въ окрест. Севастополя въ одномъ экз. Распространенъ по всей Европ. Россіи, начиная съ Финляндіи (65°), но на югѣ встрѣчается рѣдко.

Sciocoris helferi Fieb. Въ одномъ изъ моихъ прежнихъ сообщеній видъ этотъ былъ показанъ для Крыма, по сбору проф. М. М. Усова.

Palomena viridissima Poda. Старый Крымъ (Кир.). Распространенъ по всей палеарктической области, кромѣ степныхъ мѣстностей.

Eurydema fieberi Schum. Керчь (Кир.). Въ фаунѣ Европ. Россіи распространеніе этого вида мало извѣстно; недавно E. Csiki нашелъ его въ окрестностяхъ Саратова.

Fam. **Coreidae.**

Spathocera lobata H.-S. Агармышъ (Кир.). Встрѣчается по всему югу Европ. Россіи, но въ Крыму до сихъ поръ замѣченъ не былъ.

Gonocerus juniperi H.-S. Агармышъ, на можжевельникѣ (Кир.).

Coriomeris affinis H.-S. Керчь (Плиг.). Оба эти вида свойственны средиземноморской подобласти; распространеніе ихъ по Россіи еще мало выяснено.

C. vitticollis Reut. Этотъ недавно отличенный (1900) видъ, распространенный въ Закавказьѣ и въ среднеазіатскихъ русскихъ владѣніяхъ, встрѣчается также и въ Крыму; я его нашелъ въ Евпаторіи (3. VII. 06) въ одномъ экземплярѣ, но осеннее его поколѣніе (конецъ сентября и начало октября) оказалось довольно многочисленнымъ.

Fam. **Berytidae.**

Berytus nigrolineatus Jak. var. **pallidus** nov. Агармышъ 1 экз. (Кир.).

B. semisetosus, n. sp. Агармышъ 2 экз. (Кир. 29. V. 06).

Обѣ эти новыя формы принадлежатъ къ той группѣ, у которой перепонка надкрылій имѣетъ пять простыхъ жилокъ, не соединяющихся между собой; синоптическій обзоръ видовъ этой группы даетъ слѣдующую характеристику.

1. (—). Les deux nervures internes de la membrane libres, non réunies après leur base.

2. (5). Antennes hérissées de longues soies dressées; crète céphalique allongée, lancéolée.

3. (4). Elytres glabres, concolores; antennes et pattes concolores; pattes hérissées de longeus soies dressées; 1-er article des antennes un peu plus long que le 3-e. Long. 8—9 mm.

B. hirticornis Brul.

4. (3). *a*. Elytres sétuleuses, avec des bandes longitudinales noires; massue du 1-er article des antennes, articles 2-e et 3-e au sommet noirs; massue des fémurs noire; 1-er article des antennes un peu plus court que le 3-e. Long. 9 mm.

B. nigrolineatus Jak.

b. Elytres concolores, sans bandes noires.

Id., var. **pallidus** nov.

5. (2). Antennes glabres, ou très brièvement poilues.

6. (9). Elytres sétuleuses; antennes à 1-er article plus court que le 3-e.

7. (8). Crète céphaliques en triangle émoussée; massues du 1-er article des antennes et des fémurs noires; élytres avec des bandes longitudinales noires. Long. 8,2 mm.

B. semisetosus, n. sp.

8. (7). Crète céphalique plus courte, sécuriforme; pattes, antennes et élytres concolores.

B. setipennis Saund.

9. (6). Elytres glabres.

10. (11). Antennes plus longues; massue du 1-er article des antennes et des fémurs peu épaisses et concolores. Long. 7—8,5 mm.

B. clavipes F.

11. (10). Antennes plus courtes; massues du 1-er article des antennes et des fémurs noires, aussi longues ou plus longeus que le 4-e article.

12. (13). Crète céphalique assez longue, lancéolée; nervures de la membrane noirâtres à la base; 2-e nervure externe très épaissie, costiforme sur toute sa longueur. Long. 6—7,5 mm.

B. costulatus Jak.

13. (12). Crète céphalique arrondie, moins acuminée; nervures de la membrane normales, concolores. Long. 5—6 mm.

B. minor H.-S.

Berytus semisetosus, n. sp.

Туловище очень узкое, сверху блѣдно-окрашенное, только голова и передняя половина переднеспинки—черноватыя; голова нѣсколько длиннѣе переднеспинки, отростокъ ея вытянутъ въ видѣ трехугольника, скругленнаго на вершинѣ, съ верхнимъ краемъ приподнятымъ нѣсколько выше остальной части головы и нижнимъ—едва вырѣзаннымъ; хоботокъ къ концу чернѣющій, 1-й членикъ его достигаетъ до половины глаза, а 2-й одинаковой длины съ 3-мъ; усики равны длиною двумъ третямъ туловища (съ надкрыльями) 1-й членикъ ихъ едва короче 3-го и покрытъ бѣловатыми, чрезвычайно короткими шипиками; булава его, вершина 3-го членика и весь 4-й чернаго цвѣта; булава перваго членика умѣренной толщины и не длиннѣе 4-го членика.

Переднеспинка плоская, съ тремя продольными ребрами, изъ которыхъ среднее, наиболѣе развитое, бѣлаго цвѣта; поверхность ея довольно грубо пунктирована, безъ щетинокъ. Надкрылья узкія, длинныя, такъ что перепонка продолжается гораздо далѣе брюшка; боковые края ихъ почти прямые; мембранальный шовъ, продольныя полоски между ребрами и острый конецъ corium—черные, или черноватые; поверхность надкрылій покрыта короткими бѣловатыми щетинками; перепонка очень узкая, на вершинѣ пріостренная; промежутки между жилками съ черными полосами.

Ноги длинныя, одѣтыя очень короткими бѣловатыми, шиповидными волосками; бедра передней пары выдаются гораздо далѣе передняго конца головы; булава бедръ длинная, постепенно утолщающаяся, чернаго цвѣта.

Дл. 8,2 mm., шир. 0,7—0,8 mm.

Два экземпляра этого вида по своей плоской переднеспинкѣ и очень съуженной перепонкѣ относятся къ короткокрылой формѣ, и напоминаютъ *B. nigrolineatus*, но у этого послѣдняго усики одѣты очень длинными щетинками, при чемъ булава 1-го членика гораздо короче 4-го членика; головной отростокъ длиннѣе и заостреннѣе, а верхній его край (если смотрѣть сбоку) лежитъ въ одной плоскости съ головой.

Berytus simplex, n. sp.

Агармышъ (Кир.)!

Видъ этотъ относится къ другой группѣ *Berytus*, у которой двѣ внутреннія жилки перепонки соединены, недалеко отъ своего начала, особой поперечной жилкой, образуя, такимъ образомъ, замкнутую въ основаніи перепонки клѣтку.

Описываемый видъ близокъ къ *B. montivagus* Fieb., отличаясь отъ него, главнымъ образомъ, нижеслѣдующими признаками:

1. (2). Crète céphalique sécuriforme, légèrment arrondie à l'extrémité; antennes à 1-er article un peu plus long que le 3-e et à 4-e article grand, noir, de moitié plus long que la massue du 1-er article; membrane avec des bandes noires longitudinales. Long. 5,5—6 mm.

B. montivagus Fieb.

2. (1). Crète céphalique plus courte et tres arrondie au sommet; antennes à 1-er article un peu plus court que le 3-e, et à 4-e article brun dans sa moitié apicale, petit, aussi long que la massue du 1-er article; membrane concolore, sans bandes distinctes. Long. 7 mm., larg. 1,4 mm.

B. simplex, n. sp.

Примѣч. Въ первомъ спискѣ таврическихъ полужесткокрылыхъ мною былъ показанъ *B. signoreti* Fieb.; въ настоящее время, за утратой единственнаго экземпляра, который я относилъ къ этому виду съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ, я считаю за лучшее вычеркнуть этотъ видъ изъ списка.

Metacanthus elegans Curt. Агармышъ, нерѣдко (Кир.).

Общеевропейскій видъ, очень мало извѣстный въ фаунѣ Россіи; онъ показанъ только для Литвы (Горскій) и Туркестана (Ошанинъ).

Fam. **Lygaeidae.**

Orsillus depressus M. R. Агармышъ (28. IV. 06 и 8. V. 06), въ трехъ экземплярахъ (Кир.). Замѣченъ впервые въ фаунѣ Россіи.

Cymus claviculus Fall. Евпаторія, нѣсколько экз. на берегу Мойнакскаго озера (!).

Macroplax preyssleri Fieb. Агармышъ (Кир.). Въ фаунѣ Россіи извѣстенъ былъ только съ береговъ Балтійскаго моря.

Proderus crassicornis Jak. Керчь (7. III. 02. Кир.). Въ русской фаунѣ до сихъ поръ былъ извѣстенъ только изъ Закавказья; поэтому находка его въ Крыму является совершенною неожиданностью.

Stygnocoris fuligineus Geoffr. Евпаторія (!), Агармышъ (Кир.).

Aphanus saturnius Rossi. Керчь (25. I. 02), въ одномъ экз. (Кир.).

Gonianotus marginepunctatus Wff. Севастополь (Ульянинъ).

Drymus sylvaticus F. Агармышъ (3. VI. 06. Кир.). Общераспространенный видъ, ранѣе въ Крыму не замѣченный.

Scolopostethus decoratus Hahn. Старый Крымъ (15. VII. 06. Кир.).

Taphropeltus hamulatus Thms. Агармышъ (4. VII. 06. Кир.).

Оба послѣдніе вида въ фаунѣ Россіи были извѣстны только изъ Закавказья.

Fam. **Tingitidae.**

Piesma capitata Wff. Керчь (Яц.), Агармышъ (Кир.).

* **P. maculata** Lap. Агармышъ (Кир.).

P. quadrata Fieb. Евпаторія (!).

P. variabilis Fieb. Евпаторія (!), Ѳеодосія (Рет.), Керчь (Кир.).

P. kolenatii Fieb. Евпаторія (!), Ѳеодосія (Horv.).

P. salsolae Beck. Евпаторія (!).

* **Cantacader quadricornis** Lep. Отузы (Кир.).

Campylostira orientalis Horv. Ѳеодосія (Рет.).

Acalypta nigrina Fall. Тэрке-яйла (Mus. Taur.).

A. hellenica Reut. Ѳеодосія (Рет.).

* **Biscria sareptana** Jak. var. **adelpha** Horv. Ѳеодосія (Horv.).

* **Dictyonota strichnocera** Fieb. (=*idonea* Jak.). Алешки (Яц.).

D. tricornis Schr. Евпаторія (!), Симферополь (Mus. Taur.), Ѳеодосія (Рет.), Старый Крымъ (Кир.).

D. aridula Jak. Евпаторія (!). Замѣчена еще въ Венгріи и Греціи.

D. henschi Put. (=*eupatoriae* Jak.). Евпаторія (!). Встрѣчается также въ Венгріи и Италіи.

Derephysia cristata Pz. Обыкновенна, а годами многочисленна подъ Евпаторіей; въ другихъ же мѣстахъ Крыма еще не встрѣчалась.

Hyalochiton komarovi Jak. Судакъ (Horv.), Агармышъ (Кир.), Севастополь (Плигинскій).

Stephanitis pyri F. Повсемѣстно въ садахъ.

Lasiacantha capucina Germ. Сарабузъ (Mus. Taur.), Агармышъ (Кир.).

* **L. gracilis** H.-S. Агармышъ (Кир.).

Tingis (Lasiotropis) ragusana Fieb. Алма (Баж.). Кишлафъ (Horv.), Агармышъ нерѣдко (Кир.).

T. hellenica Put. (=*corniculata* Jak.). Кастель, Алушта (!).

* **T. ciliaris** Put. (=*balassogloi* Jak.) Агармышъ (Кир.), Севастополь (Плиг.).

T. reticulata H.-S. (=*ciliata* auct.). Тарнаиръ (Mus. Taur.).

T. (*s. str.*) **auriculata** Costa. Евпаторія (!), Тарнаиръ (!), Шах-мамай (Кир.).

T. angustata H.-S. (=*taurica* Jak.). Тарнаиръ.

T. (Tropidochila) kiesenwetteri M. R. Алма (Баж.).

T. caucasica Jak. Евпаторія, годами нерѣдко (!), Фриденталь (Horv.), Старый Крымъ и Агармышъ (Кир.).

T. geniculata Fieb. Евпаторія (!), Симферополь (!), Ѳеодосія (Рет.), Агармышъ (Кир.).

* **Catoplatus anticus** Reut. var. **syriacus** Horv. Евпаторія, нерѣдко (!). Видъ новый для русской фауны.

* **C. carthusianus** Gz. Евпаторія, обыкновененъ (!), Ѳеодосія, Аиб-эли Изюмовка (Рет.), Старый Крымъ, Агармышъ, Шах-мамай (Кир.), Керчь (Яц.).

* **C. flavipes** Horv. (=*horvathi* Put.). Найденъ на Агармышѣ всего въ 2-хъ экземплярахъ (Кир.). Въ фаунѣ Россіи замѣченъ впервые.

Copium cornutum Thunb. Симферополь, Тарнаиръ (Mus. Taur.), Ѳеодосія (Рет.), Старый Крымъ и Агармышъ (Кир.).

C. teucrii Host. Евпаторія, очень рѣдко (!), Агармышъ (Кир.).

Oncochila simplex H.-S. Алма (Баж.), Агармышъ (Кир.), Керчь (Яц.).

* **O. scapularis** Fieb. Старый Крымъ, Агармышъ (Кир.).

Monanthia montandoni Horv. Геническъ.

M. platyoma Fieb. Евпаторія (!), Агармышъ (Кир.), Ѳеодосія (Рет.), Керчь (Яц.).

* **M. putoni** Montd. Аиб-эли (Horv.).

* **M. nassata** Put. Агармышъ, нерѣдко (Кир.).

M. symphyti Vall. (=*vesiculifera* auct.). Чалдукъ (Рет.).

M. echii Schr. (=*wolffi* auct.). Агармышъ (Кир.), Ѳеодосія (Рет.), Керчь (Яц.).

M. rotundata H.-S. (=*echii* auct.). Евпаторія (!), Суунджи (Рет.), Тэрке-яйла (Mus. Taur.).

Serenthia atricapilla Spin. Керчь (Яц.).

S. laeta Fall. Ѳеодосія (Рет.), Евпаторія—весною 1906 года встрѣчался во множествѣ на берегу Мойнакскаго озера (!).

Fam. **Aradidae.**

Aradus lugubris Fall. Керчь (Кир.). Видъ безразличный, свойственный всей палеарктической области, за исключеніемъ степныхъ мѣстностей.

A. betulae L. Старый Крымъ (Кир.). Въ половинѣ мая найдена очень большая колонія этого вида, также распространеннаго по всей палеарктической области, но рѣдкаго на югѣ.

A. caucasicus Kti. Козьмодемьянскій монастырь, одинъ экз. (Кир.). До сихъ поръ былъ извѣстенъ изъ восточной половины Закавкавья; поэтому нахожденіе его въ Крыму было трудно предполагать; здѣшній экземпляръ нѣсколько меньше ростомъ и болѣе сѣраго оттѣнка.

Aradus taurícus, n. sp. Козьмодемьянскій монастырь, одинъ экз. (Кир.).

♀. D'un brun plus ou moins obscur, antennes et tibias plus pâles. Tête aussi large que longue (1,5 mm.); tubercule antennifère légèrement courbé et pointu au sommet, avec une petite dent sur les côtés; antennes aussi longues que la tête et le pronotum réunies, cylindriques, à 2-e article un peu plus épais vers la base et d'un tiers plus long que le suivant; article 3 graduellement atténué vers la base et d'un quart plus long que le 4-e; bec d'un brun obscur, court, atteignant les hanches antérieures.

Pronotum d'un tiers plus court au milieu que la tête, plus étroit que la base de l'abdomen et près de trois fois (2,7 mm.) plus large que long, rétréci en avant, à bords droits, irrégulièrement denticulés, angle huméral dilaté, finement crénelé; carènes discoïdales parallèles; entières; bords latéraux un peu plus clairs que le disque, bord postérieur légèrement échancré. Ecusson plus long que large, triangulaire, aigu au sommet, assez excavé, d'un brun noirâtre; son extrème pointe jaunâtre.

Elytres beaucoup plus courts que l'abdomen, dont ils laissent à decouvert les 4 derniers segments, à corium roussâtre, un peu plus long que l'écusson, largement arrondis et crénelés à la base, puis

droits; membrane très courte, linguiforme, avec quelques nervures blanchâtres. Abdomen largement ovalaire, d'un brun noirâtre, avec quelques taches plus claires; connexivum large, à taches roussâtres, peu distinctes. Pattes courtes, brunes; cuisses jaunâtres à la base et au sommet; tibias d'un jaunâtre sale, avec un anneau apical noir.

Long. 8,5 mm., larg. (abdom.) 4,5 mm.

Fam. **Gerrididae.**

Hydrometra stagnorum L. Севастополь (Плиг.). Нѣсколько экз. крупной величины, до 13 mm.

Gerris paludum F.

G. costae H.-S.

G. argentata Schml.

Всѣ три вида были собраны А. Н. Кириченко въ окрестностяхъ Керчи.

Fam. **Reduviidae.**

Metapterus linearis Costa. Агармышъ (Кир.), довольно много личинокъ и только одинъ вполнѣ развитой экз. Въ фаунѣ Россіи извѣстенъ былъ только съ нижняго теченія Волги (Сарепта, Астрахань) и изъ Туркестана.

Allaeorrhynchus flavipes Fieb. Старый Крымъ и Агармышъ (Кир.) по одному экз. До сихъ поръ въ русской фаунѣ былъ отмѣченъ только для Закавказья.

Fam. **Acanthiidae.**

Acanthia litoralis L. Евпаторія (!). Собрано три экз. на берегу Мойнакскаго озера; изъ нихъ два ♂ сполна чернаго цвѣта и одна ♀ съ бѣловатыми пятнами на надкрыльяхъ.

Fam. **Cimicidae.**

Piezostethus ciliatus Jak. Евпаторія, изрѣдка (!). Видъ описанный изъ Астрахани и впослѣдствіи замѣченный въ Закавказьѣ (Horv.).

Fam. **Capsidae.**

Stenodema trispinosum Reut. Евпаторія, 1 экз. (!). Недавно (1904) отличенный Reuter'омъ видъ, распространенный по всей Сибири, а въ Европ. Россіи извѣстный только съ Соловецкихъ острововъ на Бѣломъ морѣ. Здѣшній экз. ничѣмъ не разнится отъ сибирскихъ, кромѣ болѣе узкой формы туловища.

Leptopterna ferrugata Fall. Старый Крымъ (Кир.).

Calocoris fulvomaculatus De G. Старый Крымъ, Агармышъ (Кир.).

C. angularis Fieb. Reuter показываетъ этотъ видъ для Феодосіи и Ялты (по сбору Ретовскаго).

Lygus campestris L. Агармышъ (Кир.).

Polymerus holosericeus Hahn. Старый Крымъ, Агармышъ (Кир.).

Plagiorrhamma suturalis H.-S. Керчь, въ половинѣ VIII. 06. (Кир.).

Orthocephalus vittipennis Hahn. Агармышъ (Кир.).

Halticus pusillus H.-S. То-же.

Cyllocoris histrionicus L. То-же.

Globiceps flavomaculatus F. То-же.

Gl. fulvicollis Jak.: Bull. Mosc. 1877, II, p. 292; Reut., Hem. Gymn. Eur., III, p. 388; Reut.: Öfv. Finsk. Förh., XLIV, 1902, p. 177; Horv.: Rev. d'Ent., VII, 1888, p. 181; = *dubius* Reut. Öfv. Finsk. Förh., XLIII, 1901, p. 176.

Первоначально былъ описанъ изъ окрестн. Сарепты; затѣмъ оказался свойственнымъ южной Россіи: Купянскъ (Ивановъ!), Елисаветградъ (Яценковскій!), Новороссійскъ (Horv.) и наконецъ найденъ А. Н. Кириченко въ Крыму, въ окрестн. Стараго Крыма и на Агармышѣ; въ азіатскихъ предѣлахъ извѣстенъ съ В. склона Бонтубоя (Дубянскій! 24. VII. 04) и съ Иссыкъ-куля (Джилларыкъ), откуда его слабое видоизмѣненіе было описано Reuter'омъ подъ именемъ *Gl. dubius*. Видъ, сколько извѣстно до сихъ поръ, свойственъ исключительно русской фаунѣ.

Orthotylus parvulus Reut. Евпаторія, изрѣдка на *Chenopodiaceae* въ концѣ іюля и въ августѣ (!). До сихъ поръ былъ извѣстенъ только изъ Астрахани.

Solenoxyphus lepidus Put. Керчь, въ половинѣ VIII. 06, два экз. (Кир.).

Psallus diminutus Kb.

Ps. variabilis Fall.

Criocoris crassicornis Hahn.

Послѣдніе три вида собраны А. Н. Кириченко на Агармышѣ.