

Sexguttatus. Herrich - Schaeff. III. p. 77. t. 98. f. 295.

» Meyer. I. 92. 77.

Niger; supra aurantiaco-luteus et nigro-fuscoque pictus.

Caput nigrum, nitidum, regionibus orbitalibus luteis; *pronotum*. antice angustius, postice dimidio latius, aurantiacum, vittis duabus longitudinalibus conicis nigris, quarum basis usque ad marginem posticum tendit, apex in maculam semi-orbicularem in alteram confluentem marginem anticum non attingit; *episternum* nigrum; *scutellum* aurantiacum, basi nigrum; *hemielytra* aurantiaco-lutea, *clavo* basi luteo ceterum nigro-fusco, *corio* macula media obsolete triangulari alteraque externa minori nigro-fusca, *appendicis* apice nigro-fusco; *membrana* fusco-pallida, *cellula* fusca; *antennae* fuscae, *pedes* pallide-fusci aut fusco-testacei; *venter* niger, segmentis tenuissime aurantiaco-marginatis.

Long: 3 $\frac{1}{2}$ lin.

Lat: 1 lin.

Habitat in pratis subalpinis Caucasi.

γ . *Hemielytri* margine externo ciliato.

Subgenus: BLEPHARIDOPTERUS. m.

(Α βλεφαρίς, ιδος, cilium et πτερόν, ου, ala.)

*. *Luridus*, *pronoto* gibboso.

Spec. 81. *Collaris*. Fallén. M. C. S. 103. 18.

» » H. S. 125. 19.

» Hahn. II. p. 120. t. 66. f. 203.

» Herrich-Schaeff. N. E. I. 48 et 83.

» Meyer. I. 83. 63.

Gerris errans. Wolff. Jc. C. fig. 155.

Thorace angustato, antice gibbo duplicato; *hemiely-*