

pag. 37. tab. 4. fig. 37. — *Lygæus striatus* PANZ. Faun. Germ. fas. n. fig. 22. — *Encycl. pl.* 374. fig. 10.

Longueur 6 lig. Antennes noires, leur premier article ferrugineux, le troisième blanc à sa base. Tête noire avec une tache d'un blanc-jaunâtre à la partie supérieure de l'orbite des yeux. Corselet noir ayant une tache dorsale plus ou moins étendue de couleur jaune ou ferrugineuse, et quelquefois les bords latéraux de cette couleur. Écusson noir avec ses côtés plus ou moins ferrugineux. Elytres rayées longitudinalement de noir et de ferrugineux; l'extrémité de leur partie coriace de cette dernière couleur. Dessous du corps noir; bord postérieur de la poitrine et des cinq premiers segments de l'abdomen blanc. Pattes ferrugineuses avec l'extrémité des jambes postérieures pâle. Femelle.

Nota. C'est à tort que Fabricius et De Géer rapportent à ce Miris la Punaise n.º 38 de Geoffroy. Ce synonyme appartient à l'espèce suivante.

4. MIRIS écrit, *M. scriptus*.

Miris pedibus ambulatoriis, niger, elytris luteo striatis, partis coriaceæ apice pedibusque ferrugineis, thorace posticè luteo trilineato.

Miris scriptus. LAT. *Gen. Crust. et Ins.* tom. 3. pag. 125. — *Capsus scriptus.* FAB. *Syst. Rhyngot.* pag. 247. n.º 32. Mâle. — COQUEB. *Illust. Icon. tab.* 10. fig. 13. — La Punaise rayée de jaune et de noir. GEOFF. *Ins. Paris.* tom. 1. pag. 454. n.º 38. Mâle.

Longueur 3 lig. $\frac{1}{2}$ à 4 lig. Antennes noires avec le milieu de leur premier article et la base du second de couleur ferrugineuse; une très-petite portion de la base du troisième article est blanche. Partie antérieure de l'orbite des yeux d'un blanc-jaunâtre. Corselet noir, son bord antérieur et trois lignes longitudinales de son lobe postérieur de couleur jaunâtre. Elytres noires, rayées de blanc-jaunâtre; leur partie coriace terminée par une tache ferrugineuse. Écusson noir. Pattes ferrugineuses; tarsi et extrémité des jambes noirs. Milieu des quatre premières jambes blanchâtre. Dessous du corselet taché de blanchâtre. Abdomen ferrugineux, son milieu ainsi que la coulisse qui renferme la tarière de couleur noir. Femelle.

Le mâle diffère en ce que ses antennes et son abdomen sont entièrement noirs: il a les pattes plus brunes que celles de la femelle.

5. Miris de Carcel, *M. Carcelii*.

Miris pedibus ambulatoriis, niger, thorace, scutello elytris que rubris nigro maculatis, abdomine rubro marginato.

Longueur 4 lig. Antennes noires; base du troisième article blanche, le dernier brun. Tête noire.

Corselet noir, ses bords latéraux et une petite ligne longitudinale sur son lobe antérieur de couleur rouge. Écusson noir, rouge à son extrémité; élytres rouges ayant chacune deux taches noires, l'une vers la suture à côté de la pointe de l'écusson, l'autre vers l'extrémité: membrane enfumée. Ventre noir bordé de rouge; cette bordure s'élargissant un peu auprès de l'anus. Pattes noires; milieu des jambes blanc à sa partie extérieure. Femelle.

Le mâle diffère en ce qu'il a le dessus du corselet rouge avec deux taches noires; la couleur rouge descend davantage sur les côtés qui ont chacun une tache noire et l'abdomen a beaucoup plus de rouge que dans la femelle, cette couleur formant deux lignes de chaque côté et bordant inférieurement les segments du ventre entre ces deux lignes; les cuisses postérieures ont un peu de rouge en dessous vers leur base.

Nous devons cette espèce à M. Carcel qui l'a prise dans l'Anjou.

Nota. Le *Lygæus sexpunctatus* n.º 100. FAB. *Syst. Rhyngot.* n'est peut-être qu'une variété du mâle. Cet auteur donne des cuisses rousses, un écusson noir et la couleur dominante du dessus du corps rousse à l'individu qu'il décrit comme étant d'Espagne.

On doit rapporter à cette seconde subdivision les *Lygæus campestris* n.º 154, *pratensis* n.º 155 et *striatellus* n.º 164. Les *Capsus gothicus* n.º 20. (PANZ. *Faun. Germ. fas.* n. fig. 15.), *albomarginatus* n.º 24, *flavomaculatus* n.º 30. (PANZ. *id. fas.* n. fig. 16.), les *Miris lævigatus* n.º 2. (PANZ. *id. fas.* n. fig. 21.) et *lateralis* n.º 3. FAB. *Syst. Rhyngot.* ainsi que le *Lygæus vulneratus* PANZ. *id. fas.* n. fig. 22.

CAPSE, *Capsus*. FAB. LAT. *Cimex*. LINN. GEOFF. DE GÉER.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères, famille des Géocoris, tribu des Longilabres.

Les Longilabres qui ont les antennes de quatre articles et qui manquent d'ocelles forment un groupe (voyez pag. 52 de ce volume), dans lequel les Astemmes se distinguent par leurs antennes filiformes et les Miris parce que chez eux ces organes vont en diminuant insensiblement de grosseur depuis la base jusqu'à l'extrémité.

Antennes longues, insérées à nu sur les côtés de la tête en devant et tout près des yeux, composées de quatre articles; le premier dépassant de beaucoup l'extrémité de la tête, le second le plus long de tous, terminé en massue; les deux derniers pris ensemble plus courts que le second, brusquement plus minces que les précédents. — *Bec* long, atteignant au moins les branches intermédiaires, composé de quatre articles et renfermant un suçoir de quatre soies. — *Tête* petite, triangulaire, rétrécie postérieurement. — *Yeux*