

poils courts épars de couleur dorée. Deuxième et troisième articles des antennes d'égale longueur, le deuxième flave dans sa deuxième moitié, le troisième flave presque en entier, excepté un mince anneau noir à sa base, le quatrième brun. Corps opaque en dessus et en dessous. Pronotum pointillé, avec deux grandes taches lisses occupant presque entièrement le tiers antérieur de sa surface. Clavus distinctement, Cories un peu plus faiblement ponctuées en séries régulières : elles sont d'un ferrugineux foncé tachées de macules carrées ou ovales jaunes et blanches : deux de ces taches sur les Cories sont situées le long de la suture du Clavus, deux autres sur le bord marginal, l'une un peu en avant du milieu, l'autre à l'extrémité; une autre à l'angle interne de la Corie, près de l'extrémité de la suture; quelques autres plus indéterminées ou moins visibles sur le reste de la surface. La membrane est brune avec les nervures blanches; l'écusson est noirâtre, avec une petite ligne longitudinale jaune à son extrémité.

*Ozophora Burmeisteri* Guérin. — Guadeloupe, 8 ex.

**Dysdercus Delauneyi**, nov. sp. Sanguineus, antennis nigris, exceptis annulo basali albo quarti articuli, primique parte basali sanguineâ : articulo apicali rostri, Pronoti parte posticâ, hemelytris totis cum membranâ extûs albo-cinctâ, pedibusque (exceptâ parte basali femorum) parteque basali segmentorum omnium ventris, nigris. Long. 10 à 12 mill.

**Variat** : Pronoti parte posticâ et hemelytris fusco-rubris aut obscurè rubro-maculatis. Affinis *D. ruficollis* Linné. Guadeloupe, 1 ex., Martinique, 12 ex.

D'un rouge sanguin, avec les antennes noires, moins un anneau blanc à la base du quatrième article, et la base du premier article qui est rouge; le dernier article du bec, la base du Pronotum, les Hémélytres, ainsi que la membrane, moins une fine bordure blanche de celle-ci, les pattes, moins la base des cuisses, sont noirs, ainsi qu'une bande transversale à la base de chacun des segments du ventre.

**VARIÉTÉ** : Base du pronotum et hémélytres plus ou moins obscurément rougeâtres ou tachées de rouge obscur; mais membrane toujours noire bordée de blanc.

Voisin du *D. ruficollis* Linné, mais paraît bien distinct par les bandes noires des segments ventraux, et la couleur générale qui varie peu.

*Dysdercus Andrew* Linné. — Guadeloupe, 1 ex.

*Aneurus politus* Say. — Guadeloupe, 1 ex.

*Lygus contaminatus* Fallén. — Guadeloupe, 9 ex.

**Pœciloscytus** (s. g. **Charagochilus**) **irroratus**, nov. sp. Ferrugineo-fuscus, pilis sub-argenteis suprâ et subtus guttatus :