

**\*Dicyphus annulifer** n. sp. (Tafel, Fig. 2).

♀: Kopf ganz schwarz, glänzend, über den Augen ein viertel breiter als lang, das Auge ein wenig mehr als halb so lang (3:5) wie der Scheitel zwischen den Augen; Saugrohr gelb; Antennen fein behaart; erstes Antennenglied schwarz, an der Basis gelblich,  $\frac{2}{3}$  der Kopflänge, zweites ganz schwarz, 3 mal so lang als das erste, mit dem dritten Glied gleichlang.

Pronotum schwarz,  $\frac{1}{3}$  länger als der Kopf,  $\frac{2}{3}$  so lang wie hinten breit; die Seitenränder und der Hinterrand schwach bogig eingebuchtet; der Halsring deutlich abgesetzt, weiss.

Schildchen schwarz, ein wenig kürzer als das Pronotum; Brustseiten schwarz, Hüften gelb.

Flügeldecken 5 mal so lang wie das Pronotum, nach hinten schwach erweitert, durchsichtig gelb, mit gelblichweisser regelmässiger Behaarung; an der Basis des Corium, an der Grenze zwischen Corium und Cuneus und an der Spitze des letzten kleine undeutliche braunschwarze Flecken; Membran schwach rauchfarbig, mit gleichfarbigen Adern.

Beine blassgelb mit feiner gelblicher Behaarung; die Schenkel an der Spitze mit kleinen dunkleren Flecken; die Hinterschiene 4 mal so lang wie die Tarsen; das zweite Glied der Tarsen angedunkelt, halb so lang wie das erste Glied.

Bauch grösstenteils hell, Rücken angedunkelt.

Länge: 4 mm.

*Holotype* (N:o 4029) im Zoologischem Museum zu Helsingfors.

Diese neue Art gleicht den Arten *errans* Wlff. und *nigrifrons* Reut. (aus Mittel-China). Sie unterscheidet sich aber von diesen sofort durch den breiteren Scheitel, das kürzere Pronotum, den weissen Halsring, durch die Kürze des ersten Antennengliedes sowie durch die helle Behaarung des Körpers u. s. w.

Amur Fl., Nikolajewsk 28. VIII. — 1 Ex.

\**Philophorus clavatus* L.? Ussuri, Spasskaja 10. IX. — 1 def. Ex.

\**Blepharidopterus angulatus* Fall. Amur Fl., Nikolajewsk 1. IX. — 1 Ex.