

Gruppe. Auch *D. Bolivari* scheint mit *D. hyalinipennis* am nächsten verwandt zu sein. Sie unterscheidet sich von dieser durch die dimorphe Ausbildung der Flügeldecken, durch die orangerote Farbe auf dem Kopfe, Pronotum und den Flügeldecken, sowie durch die geringere Grösse. Wie *D. Escalerae* ist *D. Bolivari* dimorph, sie ist aber durch verschiedene Farbe des 1. Antennengliedes, des Pronotums, der Flügeldecken und der Schenkel von der letztgenannten unterschieden. — Die neue Art wird dem hervorragenden spanischen Entomologen Prof. I. BOLIVAR gewidmet.

Sierra Morena, Santa Helena, auf Kräutern am Ufer eines kleinen Baches in der Nähe vom Bahnhofe, 6.4 — 3 St.

Mimocoris Scott.

M. coarctatus Muls.

Sierra Nevada, 21—24.7 — 1 langgeflügeltes ♂, 1 kurzgeflügeltes ♀.

Pilophorus Westw.

P. confusus Kbm.

Sierra Nevada, 21—24.7 — 2 St.

Blepharidopterus Klti.

B. angulatus Fall.

Malaga, 29.7 — 6 St.

Orthotylus Fieb.

O. sp.

Algeciras, 15—22.4 — 11 St.

O. sp.

Algeciras, 18.7 — 5 St.; Sierra Nevada, 23.7 — 18 St.

O. sp.

Algeciras, 18.7 — 4 St.

O. sp.

Cordoba, 12.4 — 4 St.

O. sp.

Malaga, 29.7 — 2 St.

Hypsitylus Fieb.

H. prasinus Fieb.

Algeciras, auf *Daphne gnidium* auf Hügeln S von der Stadt, 16—19. 4. — 18 St.

Heterocordylus Fieb.

H. montanus n. sp.

♂: Körper schwarz, mit weissen Schuppen und feinen weissen Haaren besetzt. Schiene teilweise rostbraun.