

drittes Glied beinahe ein Drittel kürzer als das zweite, Basalteil gelb, Spitzenteil schwarz, viertes Glied überwiegend gelb; Rostrum rotbraun, bis zu den Mittelhöften reichend, erstes, zweites und viertes Glied etwa gleich lang, das dritte Glied kürzer.

Pronotum im vorderen Teil hellgelb, im hinteren Teil, mit Ausnahme des hintersten Randes, glänzend schwarz.

Schildchen grau, Spitze ein wenig heller.

Flügeldecken einfarbig grau, Cuneus mit Ausnahme des Innenwinkels und der Spitze jedoch braungelb, halbdurchsichtig.

Membran dunkelgrau, einfarbig, Adern tief schwarz.

Brust in der Mediane und an den Seiten schwarz, dazwischen ein hellerer Strich, der sich über den Seitenteil der Bauchsegmente erstreckt, die letztgenannten sonst schwarz.

Schenkel rostbraun, Schiene gelb mit schwarzen Dornen von der Länge der Schienenbreite; Spitze der Schiene und des dritten Tarsengliedes schwarz; das letztgenannte kürzer als die zwei Basalglieder zusammengenommen.

Länge: 9 mm; Breite: 3,7 mm.

*A. funebris* Reut. steht *A. triannulatus* Stål am nächsten. Sie unterscheidet sich jedoch gleich von dieser Art u. a. durch ihre Grösse und durch den scharfen Farbenunterschied der vorderen und hinteren Teile des Pronotums.

Suchan, 10.7, 8.7, 20.7, 22.7 — 14 St.; Tigrovaja, Sitz, 15.7 — 5 St.

*A. obliquefasciatus* n. sp. (Tafel I, Fig. 6).

Körper schwarz, auf den Flügeldecken helle Zeichnungen; Flügeldecken mit anliegenden gekrümmten Härchen besetzt.

Kopf glänzend schwarz, Augen rötlich; Antennen schwarz (die zwei letzten Glieder fehlen bei den vorliegenden Stücken), erstes Glied so lang wie der Kopf (von vorn gesehen), zweites Glied fast dreimal so lang wie das erste, fast ein Drittel länger als das Pronotum am Hinterrande breit.

Pronotum und Schildchen schwarz, undeutlich gerunzelt und fein chagriniert; Pronotum im vorderen Teil jedoch fast glatt.

Flügeldecken matt schwarz, ein schräger, nach hinten zugespitzter Fleck an der Clavus-Corium-Naht weiss; die Basis des Corium bleibt jedoch schwarz; Cuneus mit Ausnahme des Innenwinkels und der Spitze weisslichgelb; Membran matt grauschwarz, Adern schwarz.

Unterseite schwarz, ein Fleck auf der Hinterbrust um die Orifizien herum gelb.

Beine ganz schwarz, die zwei ersten Glieder der Hintertarsen rostbraun, zusammen ein wenig länger als das dritte Glied.

Länge: 8,5 mm; Breite: 3,2 mm.