

**L. pratensis** L. — *Esp*: Tanger, 25.—26. 4., 6 Ex. — *Lit*: Lalla Mimouna, 6.—7. 7., 1 Ex.; K'nitra, Forêt de Mamora, 20. 6., 1 Ex. (Alluaud), 1 Ex.; Rabat, auf der Saline zwischen der Stadt und Salé, 19. 6., 2 Ex., 28. 5. 1937 (Rungs, (A. Théry), 17 Ex.; Casablanca, 6. 5., 2 Ex.; Mogador, auf verschiedenen Pflanzungen auf der Düne bei der Stadt, u.a. auf *Lotus Salzmanii*, 9. 5., 7 Ex., (Alluaud), 3 Ex.; Marrakech, 20. 5., 1 Ex., (VIDAL) — *Nord*: Fés, 18. 1. 1935 (Bleton), 4 Ex. (VIDAL); Volubilis, 400 m, (Alluaud), 1 Ex. — *Atl*: Atlas med., Azrou (1250 m), 23. 6., 6 Ex., (Alluaud), 3 Ex., (VIDAL); Atlas med., Ras-el-Ma, 24. 6., 2 Ex., (Théry), 1 Ex.; Ifrane, 7. 1937 (VIDAL), 1 Ex.; Timhadit (1900 m) (Alluaud), 3 Ex.; Atlas mai., Amismiz, auf dem Niveau des Dorfes (1000 m), 26. 5., 1 Ex.; Atlas mai., Reraïa-Tal, in verschiedenen Höhen, vom Dorfe Asni (1250 m) bis zum Dorfe Arround (2000 m), 30. 5.—15. 6., 17 Ex. — *Or*: Oujda (VIDAL), 18. 5. 1935, 2. 7. 1935 (Vidal), 3 Ex.; Berkane (Vidal), 1 Ex.; Guéfait (VIDAL), Ras Foughal (VIDAL); Taforal, Avril 1935 (Vidal), 1 Ex.

Verbr. Palearktische Region, nearktische Region sowie nördlicher Teil der neotropischen Region.

**L. brachycnemis** Reut. — *Atl*: Tazzeka (VIDAL, a). — Verbr. Algerien, Syrien.

**L. atomarius** Mey D. — *Atl*: Azrou (VIDAL). — Verbr. Mittel- und Südeuropa, Kleinasien.

**L. visciola** Put. — *Esp*: Tizzi Ifri (VIDAL). — Verbr. England, Frankreich.

**L. parvulus** Reut. — *Esp*: Tizzi Ifri (1900 m), 26. 6. 1935 (VIDAL), 4 Ex. — *Lit*: Rabat (Théry), 1 Ex.; Safi, 7.—8. 5., 23 Ex.; Mogador, auf verschiedenen Bäumen, vorzugsweise auf *Argania spinosa*, sowohl bei der Stadt wie in den *Argania*-Wäldern in der Umgebung derselben, 12.—14. 5., 13 Ex.; Djebel Amsiten, auf verschiedenen Höhen (400—800 m) in der Nähe des Forsthauses Tis Rarin, 16. 18. 5., 4 Ex. — *Atl*: Atlas mai., Amismiz, auf Machien bis ca 1400 m Höhe, 24.—26. 5., 8 Ex.; Atlas mai., Reraïa-Tal, in der Umgebung des Dorfes Asni, 1.—3. 6., 5 Ex. — Verbr. Die Art ist bisher nur aus Algerien bekannt und somit für Marokko neu.

**L. conspurcatus** Reut. — *Lit*: Rabat (A. Théry), 3 Ex.; Safi, 7.—8. 5., 2 Ex. — *Or*: Martinprey (VIDAL); Berkane, 22. 10. 1935 (Vidal), 1 Ex. — Verbr. Pyrenäische Halbinsel, Kanarische Inseln, Algerien, Tunesien.

Var. *annulatus* nom. nov. (= var.  $\beta$  Reut. Enum. Hem. Gymn. Eur. 5. S. 87). Diese Farbenform tritt zusammen mit der typischen Form auf. Sie ist durch die dunkelgefärbten Enden des 2. und 3. Antennengliedes sowie durch das ganz einfarbige Corium und die oft helle Cuneusspitze gekennzeichnet. Wie schon REUTER hervorhebt, umfasst die Varietät nur weibliche Exemplare. — *Lit*: Rabat (A. Théry) 2 Ex. — *Atl*: Atlas mai., Reraïa-Tal, auf Gebüsch und Laubbäumen am Flussufer in der Nähe des Dorfes Asni (1250 m), 1. 6., 6 Ex. — *Or*: Berkane, 23. 12. 1935, 21. 1. 1936 (Vidal), 2 Ex.

**L. campestris** L. — Alle mir vorliegenden Exemplare dieser Art gehören der Farbenvarietät *algiricus* Reut. an. Diese liegt früher nur aus Algerien vor. VIDAL gibt die Hauptform (?) aus *Or*: Oujda und Saidia an. Verbr. der Hauptform: Europa, Kaukasien, Sibirien, Teile der nearktischen Region.

Var. *algiricus* Reut. — *Nord*: Meknes (Coll. Théry), 1 Ex.; Volubilis (400 m) (Alluaud), 1 Ex. — *Atl*: Atlas med., Azrou, im Dorfe und an Wegrändern in der