

Camptobrochis Fieb.

C. lutescens Schill. — *Atl*: Atlas med., Azrou (za 1250 m), 23.—25. 6., 3 Ex. — Verbr. Mittel- und Südeuropa, Kleinasien, Kaukasien, Algerien. Neu für Marokko.

C. punctulatus Fall. — *Esp*: Tanger, 15. 7., 1 Ex. — *Lit*: Rabat, auf der Saline zwischen Stadt und Salé, 19. 6., 12 Ex., (A. Théry), 9 Ex.; Casablanca, 6. 5., 1 Ex.; Safi, 7.—8. 5., 1 Ex.; Engil, 15. 10. 1937 (Bleton), 1 Ex. — *Nord*: Fes Lumiere, 12. 7. 1937 (Otin), 1 Ex. — *Atl*: Ifrane Oued, 14. 7. 1937 (Otin), 1 Ex.; Azzaba, 25. 5. 1937 (Otin), 1 Ex.; Atlas med., Azrou, auf Kräutern, an Wegrändern, 23.—25. 6., 2 Ex.; Ras-el-Ma, 24. 6., 1 Ex.; Atlas mai., Amismiz, auf dem Niveau des Dorfes (za 1000 m), 26. 5., 4 Ex.; Reraïa-Tal, in verschiedenen Höhen, vom Dorfe Asni (1250 m) bis S vom Dorfe Arround in 2100 m Höhe. An dem letztgenannten Ort auf *Achillea ligustica* am Ufer des Nebenflusses Oued Ait Mesane, 29. 5.—15. 6., 7 Ex. — *Or*: Oujda (VIDAL), 5. 7. 1935, 28. 10. 1935, 3 Ex. (Vidal); Berkane (VIDAL).

Verbr. Europa, Syrien, Persien, Kaukasien, Turkestan, Sibirien, China, Kanarische Inseln, Nordafrika.

Deraeocoris Kbm.**D. pilosula** n. sp.

Körper oval, Oberseite stark punktiert, dicht gelblich behaart. Grundfarbe gelbbraun, mit braunschwarzen, undeutlich begrenzten Flecken.

Vorderer Teil des Scheitels, Stirn, Clypeus mit Ausnahme der Spitze sowie Zügel glänzend schwarz. Augen schwarz. Antennen braun, Spitze des 2. Gliedes etwas verdickt und schwarzgefärbt. Alle Glieder der Antennen mit aufrecht stehenden Haaren, die wenigstens $1\frac{1}{2}$ mal so lang sind als die Breite der Glieder. Spitzenteil des 2. Gliedes sowie 3. und 4. Glied mit anliegenden kürzeren Haaren. 3. und 4. Glied gelblich, etwa gleich lang, zusammen ein Drittel des 2. Gliedes ausmachend.

Pronotum gelb, stark schwarz punktiert. Hinterrand gelb, Buckel glänzend, unpunktiert, schwarz mit gelblichem ovalem Mittelfleck. Seiten sowie 2 runde Flecken am Hinterteil schwarz. Eine Medianlinie bleibt gelblich. Pronotum am Vorderrande halb so breit als am Hinterrande, in der Mediane halb so lang wie am Hinterrande breit. Schildchen gewölbt, schwarz mit gelber Spitze, gelben Innenwinkeln und feiner gelber Medianlinie.

Flügeldecken stark punktiert, gelb mit schwarzbraunen nicht deutlich abgegrenzten Flecken. An der Cuneusnaht bei einigen Exemplaren 2 kleine gelbliche Flecke. Cuneus schwarzbraun, mit kleinem gelbem Fleck am Innenrande sowie einem Fleck am Innenwinkel. Membran schwarzgrau mit schwarzen Adern. Von der Hinterspitze des Cuneus zieht sich über den hinteren Teil der Membran ein weisser nach innen verbreiteter Querfleck.

Beine weisslich behaart, Haare an den Schienen etwa ebenso breit wie die Schiene selbst. Schenkel braunschwarz, gleich vor der Spitze mit gelblichem schmalem Ring versehen, Schiene mit 3 hellen Ringen. Die Ringe sind alle gleich lang. 3. Glied der Hintertarsen so lang wie 1. und 2. zusammengenommen.