

28. *LYGÆUS BICINCTUS* (Mihi). — Long. 7 mill.

Noir, avec la tête rouge, une bande transversale jaune-orange, interrompue vers la base du corselet, deux bandes de même couleur sur les élytres, la seconde interrompue, un point blanc sur la partie membraneuse des élytres; à l'exception du labre, des yeux et des antennes, la tête est rouge: elle est triangulaire, aiguë; les yeux sont saillants; le corselet noir, orné vers la base de deux grandes taches jaunes presque unies et remarquable par une côte tranchante longitudinale au milieu du limbe; les élytres sont parallèles; les pattes grêles; l'abdomen noir luisant; la poitrine noire tachée de rouge.

29. *MACROPLAX* (Fieber, Eur. Mem. 1861) *LUCTUOSUS* (Mihi). — Long. 4 mill. — Lifu (1).

Petit, noir; partie coriace des homélytres blanche, avec une tache noire, arrondie au milieu: partie membraneuse rembrunie; tête très pointue, finement granuleuse, ainsi que le corselet.

Vit sur un *Sida* que Forster appelle *Indica*, mais qui, je crois, est une espèce distincte.

30. *OPHTHALMICUS MEMBRANÆUS* (Mihi). — Long. 5 1/2 mill., larg. 1 6/10 mill. — Lifu.

Allongé, à tête un peu plus large que le corselet. Yeux saillants. Corselet à peine plus étroit en avant, carré-pointillé. Élytres diaphanes, n'ayant de coriace que la bordure de la première partie, légèrement plus courtes que l'abdomen. Ailes irisées, diaphanes, de la longueur des élytres. Dessus du corps brun-foncé ou même noir; dessous jaune-foncé.

Genre *Ocypus* (Mihi). Faisant partie du groupe des *Capsites*.

Rostre des Cicadaïres plus que des Hémiptères propres. Antennes de quatre articles, filiformes à deuxième article presque aussi long que tous les autres réunis, insérées entre et à la base des yeux, espacées entre elles. Tête large, en triangle évasé, non séparée du corselet par un étranglement. Yeux latéraux, saillants, oblongs. Ocelles nuls? Corselet en carré long, transversal, à peine plus large que la tête. Écusson médiocre. Partie coriace des élytres, munie le long du côté interne d'un sillon. Cuisses postérieures très grosses, propres au saut.

(1) Cette espèce viendrait se placer à côté du *M. Helferî* Fieber. (Signoret.)