

31. *OCYPUS VARIEGATUS* (Mihi). — Long. 2 8/10 mill. (1).

Petit, jaune, variolé de brun. La tête est jaune, ornée à la partie supérieure de lignes noires, transversales, flexueuses, interrompues. Les antennes jaunes sont rembrunies au bout. Le rostre jaune a la tranche jaune. Les yeux sont d'un brun-rougeâtre. Le corselet jaune-brun a la base légèrement bordée de jaune-citron, et sur le limbe une ligne longitudinale de même couleur. L'écusson est jaune, rembruni à la base et au milieu. La partie coriace des élytres est d'un brun-jaune, avec deux taches foncées. La partie membraneuse diaphane, offre des arcs concentriques enfumés. Le dessous du corps et les pieds sont jaune-safran. Les cuisses postérieures offrent au côté extérieur des lignes noires.

32. *DYSDECUS* (Am. et Serv.) *SIDÆ* (Mihi). (2). — Long. 9 mill. — Lifu.

Tête rouge, sauf l'origine du rostre, les antennes et une tache derrière chaque œil, qui sont d'un noir profond. Corselet rouge, bordé de blanc en avant et orné d'une bande transversale noire derrière la bordure. Écusson noir; partie coriace des élytres rouge avec un point noir sur chacune d'elles: partie membraneuse noire, légèrement bordée de diaphane. Ailes brunes. Dos rouge avec une tache noir-brillant vers l'extrémité. Base des cuisses rouge. Pieds noirs. Poitrine noire, annelée de blanc. Abdomen blanc annelé de noir.

33. *PHYSATOCHEILA* (Fab.) *IRREGULARIS* (Mihi). — Long. 25 mill. (3).

— Lifu.

Petit, ovale allongé, rétréci aux extrémités, gris, avec le corselet, une bande transversale sur les élytres et pieds d'un fauve presque doré. Dessus du corps couvert de points. La tête est petite, noir-brun, avec un duvet soyeux argenté. Les yeux oblongs, entiers, latéraux, rouges. Les antennes insérées au-dessus du labre, rapprochées entre elles à leur naissance, ont les deux premiers articles épais, courts, égaux entre eux, le troisième extrêmement long, le quatrième au moins trois fois plus court que le précédent, terminé par une massue ovale. Je n'ai pu distinguer les ocelles. Le corselet étroit en avant, puis dilaté sur les côtés et relevé

(1) Cette espèce se rapproche beaucoup pour la forme du *Capsus leucocephalus* Fallen, mais du double plus petit; il entrerait peut-être dans les nouvelles divisions créées par M. Fieber, par exemple dans le genre *Stiphrosoma* Fieb. (Signoret.)

(2) Cette espèce ressemble beaucoup au *D. pæcilus* H.-Schæff. et n'en est peut-être qu'une variété. (Signoret.)

(3) Espèce très voisine du *Phys. quadrimaculata* Wolff. Fieber, pl. 7, fig. 1 à 3. (Signoret.)