

basin tyli ducta, sitae; articulo primo omnium breviorē, apicem capitis superante, secundo primo plus quam duplo longiore, tertio $\frac{3}{4}$ secundi; quarto primo nonnihil longiore. Rostrum crassum, coxas posticas attingens, articulo primo crassissimo, secundo aequilongo, tertio et quarto brevioribus, hoc apicem versus gracilescente. Prothorax maxime convexum, fere annuliforme, marginibus lateralibus deletis, marginibus antico et postico rectis. Prosterni xyphus impressus; mesosternum pro et metasterni longius, convexum, xypho brevi, truncato. Pedes in parte postica segmentorum thoracis inserti, breve setosi, postici longi, femoribus incrassatis, articulis primo et secundo tarsorum aequilongis. Elytra valde abbreviata, scutello nonnihil longiora, postice truncata, venis destitutis. Alae nullae. Abdomen basi versus subito constrictus, fere petiolatus, postice dilatatus, convexus.

Orthocophalo Fieb. et Diplaco Stål affine, sed thoracis, elytrorum atque abdominis forma facile distinguendum genus.

Myrmecophyes tricondyloides (¹) nov. sp.

Niger, nitidus, subtiliter punctatus, scutello opaco; elytris apice late albomarginatis; antennarum articulis primo et secundo flavis, tertio et quarto infuscatis; rostro rufo, apice fusco; pedibus rufo-flavis, tibiis anterioribus apice, posticis totis tarsisque fuscis.

♂ Long. 3^{mm}, lat. 1^{mm}; ♀ long. 4^{mm}, latit. 1 $\frac{1}{2}$ ^{mm}.

Habitat in provinciis Rjasanensi et Tamboviensi Rossiae centralis (Mus. Univ. Ces. Mosc.).

(¹) Этотъ видъ былъ посланъ мною Фиберу, который возвратилъ его съ названіемъ *Myrmecophyes Oschanini* nov. gen. et spec., такъ какъ съ тѣхъ поръ прошло нѣсколькихъ два года, а Фиберомъ онъ до сихъ поръ не описанъ, то я и рѣшился сдѣлать это самъ