

ОПИСАНИЕ НОВЫХЪ ВИДОВЪ

**ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХЪ НАСЪКОМЫХЪ.**

В. ОШАНИНА.

---

1. *Tropicoris Basnini* nov.  $\frac{5}{2}$  sp.

Nitidus, viridi-metallicus, supra dense punctatus; capite, maculis prope oculos et apicem jugorum positis exceptis, marginibus lateralibus et postico et fascia transversali anteriori thoracis, lateribus scutelli nec non macula oblonga mesocorii cupreis; puncto basali medio et apicali scutelli atque connexivo testaceo-flavis; apice et basi segmentorum connexivi, angulis lateralibus thoracis productis, antennisque nigris; membrana elytrorum, corpore subtus, pedibusque dilute-testaceis, nitidis; pedibus dense nigropunctatis, tibiis apice tarsisque fuscis.

♀ Long. 18 mm.; latit. 10. mm.

Patria Kjachta Sibiriae orientalis. (Mus Univers. Cesar. Moscov.)

Голова трехъ-угольная, густо покрытая черными точками; лобный валикъ (tylus) къ концу слегка суживающийся, одинаковой длины со скулами (jugum); края головы слегка приподняты и заострены, цвѣтъ ея сверху темно красновато мѣдный, съ двумя метал-

лически зелеными пятнами на концах скулъ; два такія же пятна находятся близь глазъ; глазки блестящіе, краснаго цвѣта. Усики равняются длиною  $\frac{3}{4}$  тѣла; 4-й и 5-й членики самые длинныя, 1-й короче прочихъ и не достигаетъ вершины головы; цвѣтъ усиковъ черный, основная половина 1-го членика, а всѣ остальные у сочлененій желтыя. Переднеспинка поперечношестиугольная; передній край ея трапецидально вырѣзанный; передніе углы выдаются въ видѣ маленькихъ, направленныхъ кнаружи, шипиковъ; передне-боковые края вогнутые, пилообразно зазубренные; боковые углы сильно выдающіеся, вершиною своей обращенные назадъ; задне-боковые края извилистые; задній край прямой, обрубленный, одинаковой длины съ переднимъ краемъ щитика. Поверхность переднеспинки при самомъ основаніи горизонтальная, слегка выпуклая, потомъ наклонная, покрытая черными точками, сливающимися въ иныхъ мѣстахъ въ короткія, извилистыя, поперечныя линіи. Цвѣтъ переднеспинки металлически зеленый, задній и боковые края ея оторочены красноватомѣднымъ, полоса такого же цвѣта тянется поперегъ передней части переднеспинки, посреди она расширяется, но не достигаетъ передняго края. Щитикъ удлинненно трехъугольный, боковые края со вступающими углами; *trapezium* доходитъ почти до  $\frac{4}{5}$  его длины. Поверхность щитика у основанія выпуклая, у вершины плоская, покрытая точками, сливающимися у основанія въ короткія поперечныя линіи; небольшое, срединное, желтое, продольное пятно у основанія, два такихъ же на боковыхъ углахъ и самый конецъ щитика гладкіе. Его выпуклая часть металлически зеленого цвѣта; боковые края красновато-мѣдные. Надкрылья уже и длиннѣе брюшка; вершинный уголъ *scutum*'а острый; перепоночный шовъ (*sutura membranaea*) прямой. *Scutum* и *clavus* металлически зеленые, покрытые точками того же цвѣта; на *mesoscutum*,

продольное къзади расширенное, мѣдно-красное пятно; перепонка коричневая съ 7 не развѣтляющимися жилками. *Connexivum* желтоватый съ четырехугольными черными пятнами, помѣщенными на сочлененіяхъ сегментовъ; только на этихъ черныхъ пятнахъ есть точки. Нижняя поверхность тѣла свѣтло-коричневая, блестящая, съ разсѣянными черными точками; на шестомъ брюшномъ членикѣ небольшое, продольное, черное пятно. Шипикъ при основаніи брюшка короткій. Ножки свѣтло-коричневые, густо покрытыя черными точками; концы голеней и лапки черные. Хоботъ достигаетъ основанія 3-го брюшнаго членика, свѣтло-коричневый; 4-й членикъ черноватый.

Видъ этотъ рѣзко отличается отъ *Tropicoris rufipes* L. своимъ лобнымъ валикомъ и заднимъ краемъ передне-спинки; онъ вѣроятно очень близокъ съ *T. metalliferus* Motsch. (Bull. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, 1859. № 4, p. 501), если только этотъ послѣдній дѣйствительно относится къ роду *Tropicoris* (<sup>1</sup>), но первый отличается отъ послѣдняго окраской вершины щитика. Видъ этотъ найденъ А. Х. Басниной близъ Кяхты, гдѣ онъ встрѣчается въ іюль и августѣ.

*Myrmecophyes* Fieb. in litt.

Elongatus. Caput triangulare, maxime declive, convexum, thorace latius; oculis magnis, globosis, in parte postica capitis positus, libere prominulis, fere pedunculatis; tylo ab vertice linea impressa separato. Antennae corporis longitudine, in linea ficta, e centro oculorum ad

(<sup>1</sup>) Мочульскій относитъ къ роду *Tropicoris Cimex nigricornis* Fabr., который имѣетъ съ *Tropicoris* общаго только одни выдавшіеся боковые углы средне-спинки; крайняя краткость діагнозы не позволяетъ судить о томъ принадлежитъ ли его *T. metalliferus* къ этому или къ другому какому нибудь роду.

basin tyli ducta, sitae; articulo primo omnium breviorē, apicem capitis superante, secundo primo plus quam duplo longiore, tertio  $\frac{3}{4}$  secundi; quarto primo nonnihil longiore. Rostrum crassum, coxas posticas attingens, articulo primo crassissimo, secundo aequilongo, tertio et quarto brevioribus, hoc apicem versus gracilescente. Prothorax maxime convexum, fere annuliforme, marginibus lateralibus deletis, marginibus antico et postico rectis. Prosterni xyphus impressus; mesosternum pro et metasterni longius, convexum, xypho brevi, truncato. Pedes in parte postica segmentorum thoracis inserti, breve setosi, postici longi, femoribus incrassatis, articulis primo et secundo tarsorum aequilongis. Elytra valde abbreviata, scutello nonnihil longiora, postice truncata, venis destitutis. Alae nullae. Abdomen basi versus subito constrictus, fere petiolatus, postice dilatatus, convexus.

Orthocophalo Fieb. et Diplaco Stål affine, sed thoracis, elytrorum atque abdominis forma facile distinguendum genus.

*Myrmecophyes tricondyloides* (¹) nov. sp.

Niger, nitidus, subtiliter punctatus, scutello opaco; elytris apice late albomarginatis; antennarum articulis primo et secundo flavis, tertio et quarto infuscatis; rostro rufo, apice fusco; pedibus rufo-flavis, tibiis anterioribus apice, posticis totis tarsisque fuscis.

♂ Long. 3<sup>mm</sup>, lat. 1<sup>mm</sup>; ♀ long. 4<sup>mm</sup>, latit. 1  $\frac{1}{2}$  <sup>mm</sup>.

Habitat in provinciis Rjasanensi et Tamboviensi Rossiae centralis (Mus. Univ. Ces. Mosc.).

(¹) Этотъ видъ былъ посланъ мною Фиберу, который возвратилъ его съ названіемъ *Myrmecophyes Oschanini* nov. gen. et spec., такъ какъ съ тѣхъ поръ прошло нѣсколькихъ два года, а Фиберомъ онъ до сихъ поръ не описанъ, то я и рѣшился сдѣлать это самъ

ненные, бедра ихъ расширенныя, первый и второй членики лапки одинаковой длины, короче третьяго.

Голова и туловище чернаго цвѣта, мелко точечныя, съ довольно сильнымъ блескомъ, только щитикъ матовый. Основная непрозрачная часть надкрылій черная, блестящая, задняя ихъ половина бѣлая. Первые два членика усиковъ желтые, послѣдніе два буроватые. Ножки красноватожелтыя, шипики черныя; конецъ голени двухъ переднихъ паръ, голени заднихъ ножекъ и лапки бурые. Хоботъ красноватый, конецъ его черный.

Видъ этотъ найденъ мною въ іюнѣ и іюлѣ въ Лебедянскомъ и въ Данковскомъ уѣздахъ.

*Lusanda* (4) *taurus* n. sp.

Sordide-pallido-flavescens, supra dense fusco irrorata, linea longitudinali media verticis thoracisque pallide flava, processibus frontis vertice nonnihil longioribus, extus apicem versus impressis, nigris; genis et fronte medio nigris, clypeo lineisque longitudinalibus inferioribus processuum frontis flavidis; tegminibus sordide griseis, fusco granulatis, venis fuscis; alis nullis; pedibus luteis, fusco irroratis et lineatis, coxis posterioribus extus longitudinaliter fusco lineatis.

♂ Long. cum. tegmin. 5 mm.; lat. 2,75 mm.

Patria Elisabethopol Transcaucasiae (Mus. Univers. Cesar. Mosc.).

Голова съ двумя довольно большими коническими выростами, образующими между собою острый уголъ; до конца на вѣншей поверхности они глубоко вдавлены; длина ихъ превосходить длину темени. Темя съ продольною бороздкою, не доходящею до основанія выростовъ. У основанія и съ боковъ темя ограничено

(4) См. Stål въ Berl. Entom. Zeitschr. vol. III. p. 322.

ненныя, бедра ихъ расширенныя, первый и второй членики лапки одинаковой длины, короче третьяго.

Голова и туловище чернаго цвѣта, мелко точечныя, съ довольно сильнымъ блескомъ, только щитикъ матовый. Основная непрозрачная часть надкрылій черная, блестящая, задняя ихъ половина бѣлая. Первые два членика усиковъ желтые, послѣдніе два буроватые. Ножки красноватожелтыя, шипики черные; конецъ голеней двухъ переднихъ паръ, голени заднихъ ножекъ и лапки бурые. Хоботъ красноватый, конецъ его черный.

Видъ этотъ найденъ мною въ іюнѣ и іюль въ Лебедянскомъ и въ Данковскомъ уѣздахъ.

*Lusanda* (1) *taurus* n. sp.

Sordide-pallido-flavescens, supra dense fusco irrorata, linea longitudinali media verticis thoracisque pallide flava, processibus frontis vertice nonnihil longioribus, extus apicem versus impressis, nigris; genis et fronte medio nigris, clypeo lineisque longitudinalibus inferioribus processuum frontis flavidis; tegminibus sordide griseis, fusco granulatis, venis fuscis; alis nullis; pedibus luteis, fusco irroratis et lineatis, coxis posterioribus extus longitudinaliter fusco lineatis.

♂ Long. cum. tegmin. 5 mm.; lat. 2,75 mm.

Patria Elisabethopol Transcaucasiae (Mus. Univers. Cesar. Mosc.).

Голова съ двумя довольно большими коническими выростами, образующими между собою острый уголъ; до конца на вѣшной поверхности они глубоко вдавлены; длина ихъ превосходить длину темени. Темя съ продольною бороздкою, не доходящею до основанія выростовъ. У основанія и съ боковъ темя ограничено

(1) См. Stål въ Berl. Entom. Zeitschr. vol. III. p. 322.

приподнятыми, тонкими киями; основной киль слегка вогнутый, боковые идут вдоль внутренних краевъ глазъ и продолжаются по наружному краю верхней поверхности выростовъ, на концѣ которыхъ заворачиваются внизъ и назадъ, образуя границу выше упомянутыхъ вдавленій, постепенно понижаются и исчезаютъ нагонецъ совершенно. Снизу основаніе выростовъ доходить до лицеваго щитика (clypeus), этотъ послѣдній выпуклый, безъ кия. Переднеспинка имѣетъ форму отръзка круга, задній край ея прямой, она въ полтора раза короче трехъугольной, снабженной продольной бороздкой среднеспинки. Надкрылья длиннѣе брюшка, выпуклыя, вѣншній край ихъ угловато изогнутый, жилки многочисленныя, образующія много неправильныхъ ячеекъ. Scutum вполне отдѣленъ отъ clavicula. Ножки волосаты, заднія голени съ двумя шипиками. Генитальныя пластинки самца на концѣ закругленныя, верхній край ихъ съ небольшою вырѣзкой, передъ которой сидитъ вертикальный, черный отростокъ, на концѣ своемъ загибающійся впередъ въ видѣ зубца, другой зубецъ, вершиной своею также направленный впередъ, находится на половинѣ высоты отростка. Анальный придатокъ удлинненный, къ вершинѣ расширенный, нижній край съ глубокою вырѣзкой

Цвѣтъ тѣла желтоватый. Темя и грудь сверху покрыты многочисленными, неправильными, бурыми крапинками; ихъ нѣтъ только на срединной линіи; идущей вдоль темени, передне и среднеспинки. Головные выросты снаружи и внутри черныя, на нижней поверхности ихъ идетъ продольная желтовато бѣлая линія; лицевой щитикъ и основаніе щекъ желтовато-бѣлыя. Надкрылья сѣроватыя, съ бурыми жилками, и такими же зернышками внутри ячеекъ. Брюшко сверху черное, основанія первыхъ члениковъ и срединная продольная полоса красновато-желтыя. Низъ брюшка бѣ-

ловато-желтый съ бурыми крапинками. Ляжки желтовато бѣлыя, заднія съ продольной бурой полосой. Ножки желтоватыя съ бурыми крапинками, особенно многочисленными на двухъ переднихъ парахъ; на наружной и внутренней поверхностяхъ бедръ и въ бороздкахъ голеней проходятъ бурыя, продольныя линіи; шипики голеней и послѣдній членикъ лапокъ бурые.

Столь описалъ другой видъ этого рода *L. fissiceps* (Berl. Ent. Zeit. vol. III p. 322) водящійся на Цейлонѣ.

*Aphalara pilosa* n. sp.

Luteo-viridis, immaculata, tegminibus vitreis, maculis minutis fuscis conspersis, corpore toto tegminibusque dense pilosis.

♀ Longit. cum tegminibus 3 mm.

Habitat prope Mosquam Rossiae. (Mus. Univ. C. Mosc.).

Цвѣтъ тѣла, усиковъ и ножекъ желтовато-зеленый; концы усиковъ и лапокъ буроватые, конецъ яйцеклада красновато-коричневый. Глоточный отростокъ короткій. Надкрылья покрытыя очень маленькими точками, прозрачныя съ небольшими буроватыми крапинками, болѣе многочисленными къ вершинѣ крыла. Все тѣло голова и надкрылья волосатыя; волоски очень густы на темени, передней среднеспинкѣ; на верхней поверхности тѣла они коротки и толсты, на нижней части брюшка они длиннѣе и тоньше. На надкрыльяхъ они расположены вдоль жилокъ и внутри ячеекъ.

Видъ этотъ очень близокъ къ *A. Artemisiae* Först. но рѣзко отличается какъ отъ этого, такъ и отъ всѣхъ другихъ мнѣ извѣстныхъ видовъ этого рода, волосатостью тѣла и надкрылій.