

41. (42). Das erste Fühlerglied braun, das zweite fast oder doppelt länger. Die Vordercoxen braun. Die Schenkel gelbrot — braun, die hinteren immer zur Spitze oder braunrot — braun.
quadrivittatus
42. (41). Das erste Fühlerglied und das basale Viertel des zweiten gelb—gelbrot, das mehr wie doppelt länger als das erste. Die Basalhälfte der Vordercoxen und alle Schenkel hell.
bisvittatus
43. (40). Alle Coxen einfarbig dunkelbraun. Grössere Art, $4\frac{2}{3}$ mm. lang.
breddini
44. (35). Nur etwa $\frac{1}{6}$ des zweiten Fühlergliedes an der Spitze gelblich, dasselbe doppelt länger und ebenso dick als das erste. Die Schenkel gelb, an den hinteren auch an der Spitze dunkel.
dubius
45. (34). Das zweite Fühlerglied einfarbig schwarz, das erste braungelb. Die Vordercoxen braungelb, an der Basis braun.
atratus
46. (25). Die Hemielytren graugelb-braungelb, braun gesprenkelt, der Cuneus braun oder ohne gelbem Quermakel an der Basis.
47. (50). Das zweite Fühlerglied einfarbig schwarz.
48. (49). Corium mit hellen Zeichnungen.
fuscans
49. (48). Corium einfarbig braun.
simillimum
50. (47.) Das apicale Viertel des zweiten Fühlergliedes weisslich.
anthocoroides

Fulvius pallidus n. sp.

(Fig. 9.)

Ziemlich gedrungen, matt, oben sehr kurz, weitläufig anliegend hell behaart, he die Hemielytren heller, die Basis und die äusserste Aussenspitze des Coriums heller übrigen Teile, die Seiten des Coriums schmal und der Cuneus rötlich braun, die Fühler, Rostrum und die Beine braungelb, die Unterseite braun.

Der Kopf ist nach vorne mässig vorgezogen und zugespitzt, ebenso lang als Halsschild. Die Augen sind gross und mässig vorspringend. Die Stirn ist sowohl bei Männchen als auch beim ♀ etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges, nach vorne sehr abfallend. Die Augen sind von oben gesehen gestreckt eiförmig, von der Seite gesehen

¹⁾ *Cylloceria quadrivittatus* Stål Rio Jan. Hem. I, p. 54 (1858). — *Fulvius Simoni* Reut., Ann. France, 1892, p. 391. — *F. quadrivittatus* Reut., Ent. Tidskr. Stockh., 1895, p. 144. — ²⁾ *Cylloceria bisvittatus* Stål, l. c. — *Fulvius* id. Reut. Ent. Tidskr. Stockh., l. c. — ³⁾ *F. breddini* Reut., Öfv. Finsk. Vet. S. XLIV, 1902, p. 156. — ⁴⁾ *Fulvius dubius* Reut., Ent. Tidskr. Stockh., 1895, p. 147. — ⁵⁾ *F. atratus* Dist. Centr. Amer., Hem. Rhynch. I, p. 282, T. XXVII, f. 18. — ⁶⁾ *F. fuscans* Dist. l. c., T. XXVII, f. 15. — ⁷⁾ *F. anthocoroides* Stål, Stett. Ent. Zeit., XXIII, 1862, p. 322. — Dist. l. c., p. 281, T. XXIII, f. 15. — Ent. Tidskr. Stockh., 1895, p. 149.