

Div. *Miraria*.

Lasiomiris lineatocollis Reut.

Matenesius marginatus Dist. l. c., p. 425, fig. 272.
Peradeniya, 24. V. 1902, Dr. Uzel, 2 Exx.

Div. *Mecistoscelaria*.

Mecistoscelis scirtetoides Reut.

Dist. l. c., p. 421, fig. 269.
Kandy, 8. III. 1896, Madarasz, 2 Exx.

Div. *Capsaria*.

Phytocoris uzeli n. sp.

Das ♂ gestreckt, das ♀ gedrungener, Kopf und Halschild nur schwach glänzend, das Schildchen und die Hemielytren fast matt, oben kurz anliegend hell behaart, auf dem Kopfe und auf dem Halsschilde ausserdem einige längere, dunkle, abstehende Haare. Schwarzbraun, der Kopf gelblich mit mehr oder weniger zusammenfliessenden, braunen Zeichnungen, auf dem Halsschilde die Scheibe vorne in der Mitte und der Basalrand sehr schmal braun—braungelb, das Schildchen und die Hemielytren braun—braunschwarz, der Aussenrand des Coriums mit einigen Flecken gelblich, der Cuneus in der Mitte braunrot. Die Membran braunschwarz, in der Mitte und an der Basis unregelmässig hell gefleckt, die Venen gelblich. Die Unterseite braunschwarz, auf dem Hinterkörper die Basis in der Mitte, die Spitze und eine abgebrochene Fleckenreihe jederseits braunrot, die Orificien des Metastethiums und die Hüften gelb, die Fühler gelb, das erste Glied mehr oder weniger zusammenfliessend braun gefleckt, die Basis des zweiten sehr schmal braunrot, die Spitze desselben meistens und die zwei letzten, die Basis ausgenommen, verdunkelt, das Rostrium und die Beine braun, die Spitze der vorderen Schenkel und die Schienen gelb, braun gefleckt.