

Beiträge zur Miriden-Fauna Australiens.

Von

B. POPPIUS.

Div. *Capsaria* Reut.

Pseudopantilius australis (Walk.)

Tasmanien King Insel, Mt. Wellington, Lea (comm. Schouteden).

Creontiades insularis n. sp.

Gestreckt, fettig glänzend, oben weitläufig mit kurz anliegenden, weissen Haaren besetzt, die auf dem Halsschilde vorne, auf dem Schildchen, auf dem Clavus, auf der hinteren Innenhälfte des Coriums und auf der Spitzenhälfte der Schenkel aus kleinen, runden, braunen Fleckchen entspringen, der Basalrand des Halsschildes in der Mitte, zwei Flecke an der Basis und die Spitze des Schildchens sowie die Klauen braunschwarz, auf der Stirn zahlreiche, sehr feine, gebogene Querlinien und der Clypeus in der Mitte rötlich.

Der Kopf ist von vorne gesehen etwa ebenso lang wie breit, etwa um die Hälfte schmaler als der Basalrand des Halsschildes, von der Seite gesehen etwa ebenso hoch wie lang, die Stirn der Länge nach gefurcht, ziemlich geneigt, der Clypeus stark hervortretend, vertical, von der Stirn deutlich abgesetzt, die Wangen klein, die Kehle kurz. Die Augen gross und vorspringend, ziemlich grob granuliert, nach unten sich bis auf die Kehle erstreckend, vorne leicht ausgeschweift, ihr Durchmesser beim ♀ nur wenig kürzer als