

fast doppelt breiter als der Vorderrand. — Long. 7.5, lat. 2 (♂) — 2.8 (♀).

West-Australien, ohne nähere Angaben, ♂ u. ♀ (comm. Schouteden).

Trigonotylus brevipes Jak.

Neu-Caledonien: Nouméa, 1 Stück.

Div. **Macrolopharia** Reut.

Teratocapsus n. gen.

Der Körper gestreckt, in der Mitte nicht gerundet, unbehaart, glänzend, Halsschild, Schildchen, Clavus, Corium und Propleuren kräftig und dicht punktiert. Der Kopf ist sehr stark geneigt, von oben gesehen viel, von vorne gesehen deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen ebenso hoch wie lang. Die Stirn zwischen den Augen sehr schmal, seicht concav, ohne Quer- oder Längsfurche, nach vorne sehr stark abgeneigt, der Clypeus ist wenig hervortretend, seicht gebogen, vertical, von der Stirn undeutlich abgesetzt, die Wangen sehr klein, die Kehle sehr kurz. Die Augen sehr gross und vorspringend, grob granuliert, bis auf die Unterseite des Kopfes sich ausdehnend, den Vorderrand des Halsschildes berührend. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhüften, das erste Glied ist wenig verdickt, die Kopfbasis nicht überschreitend. Die Fühler sind unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ist wenig verdickt, kurz, ebenso lang wie der Kopf von oben gesehen, unbehaart, das zweite viel länger, zur Spitze allmählich verdickt und hier dicker als das erste, dicht und anliegend, ziemlich kurz behaart, die zwei letzten etwas dünner als das zweite an der Basis, dicht und kurz anliegend behaart und ausserdem mit einigen langen und abstehenden Haaren bekleidet, unter einander gleich lang, etwas länger als das erste. Der Basalrand des Halsschildes ist breit gerundet, nur etwa $\frac{1}{3}$ breiter als der Kopf mit den