

sind kurz und fein, gekrümmt, an der Basis mit einem Zähnenchen, die Arolien frei. — Long. 4,2, lat. 1,7 mm.

Von *M. elevatus* Fieb. durch die Farbe, durch den kleineren, mehr geneigten Kopf und durch kürzere Fühlerglieder und von *M. herrichi* Reut. sofort durch die Farbe der Fühler zu unterscheiden.

Kaukasus: Erivan, Elenovka!, 6314', 6. VI. 1908, N. Brjanski, 3 ♀♀ (Mus. Helsingf., coll. Kiritschenko).

Macrotylus longulus n. sp.

Der Körper beim ♂ gestreckt und schmal, oben matt, schwarz behaart. Grün, der Kopf und der Halsschild vorne vom Hinterrande der Calli an schwarzbraun, die Stirn in der Mitte und die Augen braun, an der Basis des Kopfes ein halbmondförmiger, grüngelber Quersfleck, das Schildchen schwarz, in der Mitte jederseits ein grüngelber Längsfleck, in der Mitte des Apicalrandes auf dem Corium ein braunschwarzer Längsfleck, die apicale Innenhälfte des Coriums und die Venen der Membran hell gelbgrün, die Membran schwarzgrau, ein Fleck jederseits hinter den Zellen schwarz, ein Fleck innerhalb der Cuneusspitze sowie ein anderer in der Mitte des Aussenrandes hell. Die Unterseite und die Fühler schwarz, die Beine grünschwarz, die Hüften, die Schienen zur Spitze und die Füße schwarz.

Der Kopf horizontal, sowohl von oben wie von vorne gesehen länger als breit, nach vorne spitz vorgezogen. Die Stirn ist etwa $\frac{1}{3}$ breiter (♂) als der Durchmesser des Auges, vom breiten und hervortretenden Clypeus abgesetzt, die Augen gross und hervorspringend, fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich nur wenig über die Spitze der Hinterhüften. Die Fühler sind schwarz behaart, das erste Glied etwas verdickt, unbedeutend kürzer als die Stirn zwischen den Augen breit (♂), das zweite etwas dünner und fast $3\frac{1}{2}$ mal länger als das erste, das dritte kaum $\frac{1}{4}$ kürzer als das zweite, das letzte etwas kürzer als das erste. Der Halsschild