

geneigt, die Calli flach, wenig scharf abgesetzt, in der Mitte ziemlich von einander entfernt, die Apicalstrictur fehlt. Das flache Schildchen ist nur wenig länger als breit, an der Basis bedeckt, hinter derselben flach quer eingedrückt. Die Hemelytren sind sowohl beim ♂ wie beim ♀ nur etwas länger als der Hinterkörper, der Cuneus und die Membran stark geneigt, die grosse Zelle der letztgenannten mit leicht gerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterflügelzelle mit einem Hamus. Die Orificien des Metastethiums ziemlich klein, gerade, mit gerandeten Seiten. Die vorderen Beine von gewöhnlicher Länge, die Hinterbeine lang, die Hinterschenkel verdickt, innen abgeflacht, die Hinterschienen lang mit ziemlich langen, hellen Dörnchen, ohne schwarze Punkte, das erste Glied der Hinterfüsse etwas kürzer als das zweite, beide zusammen etwa ebenso lang als das letzte, die Klauen mässig gross, leicht gebogen, ohne Arolien.

Ist wohl am nächsten mit *Sthenarus* Fieb. verwandt, unterscheidet sich aber sofort durch den auffallenden Bau des Kopfes.

Typus: *Sth. variegatus* n. sp.

### ***Sthenaropsis variegatus* n. sp.**

Gelb, der Clypeus, zwei grosse Flecke in der Mitte der Stirn, hinten von orange begrenzt, auf dem Halsschilde die Seiten, die Calli und zwei grosse Querflecke in der Mitte des Basalrandes, in der Mitte desselben zusammenfliessend und in dieser Richtung verschmälert, und das Schildchen, eine breite Längsbinde in der Mitte ausgenommen, schwarz, auf dem Clavus der Scutellarrand schmal, die Commissur und die Sutura corii, auf dem Corium eine nach hinten erweiterte, etwas gebogene Längslinie in der Mitte, die von der Basis bis zum Apicalrande sich erstreckt, sowie ein kleines Fleckchen innerhalb der apicalen Aussenecke schwarzbraun, die dunklen Zeichnungen, auch auf dem Halsschilde, von gelbbraun umsäumt, der Aussenrand des Coriums schmal, derselbe