

Rostrum dünn, bis zur Spitze der Mittelhüften sich erstreckend, das erste Glied kurz, vom langen Peristom ganz eingeschlossen. Die Fühler mässig lang, kurz und anliegend behaart, ziemlich weit vor den Augen eingelenkt, das erste Glied ist wenig verdickt, kurz, die Kopfspitze nicht überragend, das zweite viel länger als das erste, zur Spitze etwas verdickt und hier ebenso dick als dasselbe, die zwei letzten dick, das dritte kürzer als das zweite, zur Spitze allmählich verdickt und hier kaum dicker als das letztgenannte, das letzte kürzer und ein wenig dicker als das dritte, gestreckt spindelförmig. Der Halsschild ist länger als breit mit etwas ausgeschweiften Seiten, der Vorderrand ebenso breit als der Basalrand, der letztgenannte sehr breit gerundet. Die Scheibe ist, ziemlich gewölbt und von der Seite gesehen ziemlich stark zur Basis geneigt, die Calli sind gross und gewölbt, wenig tief von einander getrennt, die Scheibe vor den Calli flach, ohne Apicalstricture, fein quer gestrichelt. Das Schildchen ist ganz klein, flach, nicht weiss beschuppt. Die Hemielytren erstrecken sich bis zur Spitze des vierten Dorsalsegments und sind an der Basis ebenso breit als der Basalrand des Halsschildes, erweitern sich aber ziemlich stark, aber geradlinig zur Spitze, von der Seite gesehen, zur Basis mässig geneigt. Der Clavus und das Corium mit aus silberweissen Schuppen gebildeten Querbinden, matt, der Cuneus ganz kurz, breit gerundet, stark glänzend und leicht aufgetrieben. Die Membran ganz kurz, die Cuneusspitze kaum überragend, glänzend, an der Suture etwas vorgezogen, die Venen erloschen. Die Orificien der Metastethiums mässig gross mit fast gerader, gekanteter Spalte. Der Hinterkörper glänzend, nach hinten ziemlich erweitert. Die Beine mässig lang, ganz kurz, anliegend behaart, die Schienen kurz braunschwarz bedornt, die Hinterschienen leicht gebogen, nicht zusammengedrückt. Das erste Glied der Hinterfüsse kürzer als das zweite, beide zusammen ebenso lang als das dritte. Die Arolien der Klauen fein, frei, convergierend.

Unterscheidet sich von *Pilophorus* HAHN durch den Bau des Kopfes, der Fühler, des Halsschildes, der Hemielytren und der Beine.

Typus : *P. brachypterus* n. sp.

PILOPHOROPSIS BRACHYPTERUS n. sp.

Braun, das Schildchen, die Coriumcommissur auf dem Clavus, die Spitze des Coriums, die Fühler und die Beine braunschwarz, der Cuneus, die Membran und der Hinterkörper schwarz, das erste Fühlerglied und die Vorderhüften braun, die Orificien des Metastethiums, die Spitze der Mittelhüften, die Hinterhüften, die Basis der