

Long. 7.5, lat. 1.5 mm.

Java, ohne nähere Angaben, 2 ♂♂ (Muséum Helsingfors).

BOTHYNOTINAE REUTER.

Div. DASHYMENIARIA REUTER.

44. *Dashymenia macgillavryi* n. sp.

Abstehend, ziemlich kurz hell behaart; glänzend; ziemlich gedrungen. Schwarz; der Kopf, ein kleines Fleckchen in der Mitte des Apicalrandes auf dem Corium und die Fühler gelb; ein schmaler Ring vor der Basis auf dem ersten Fühlergliede und das zweite braun; das letztgenannte nach der Basis zu heller; die Basis des dritten, die Basis und die Spitze des letzten schwarzbraun; der Hinterkörper unten vorne in der Mitte braungelb; die Hüften rot (die Beine übrigens und das Rostrum mutiliert). Der Kopf ist fast vertical, viel breiter als lang; die Stirn ziemlich breit gerandet und ausserdem breit, aber kurz der Länge nach gefurcht, kaum gewölbt, beim ♀ etwas mehr als doppelt so breit wie der Durchmesser des Auges. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend; die Wangen mässig hoch; die Kehle ganz kurz. Die Augen ziemlich gross, hervorspringend, glatt, etwas nach hinten gezogen, rotbraun. Die Fühler sind mässig lang, halb abstehend behaart; die drei letzten Glieder ausserdem mit einzelnen, langen, abstehenden Haaren bekleidet; das erste Glied schwach verdickt, etwa $\frac{1}{4}$ kürzer als die Stirn zwischen den Augen breit (♀); das zweite nach der Spitze zu nicht verdickt, kaum dünner, nicht voll viermal so lang wie das erste; die zwei letzten ganz dünn; das dritte etwas $\frac{1}{3}$ länger als das erste, kaum länger als das letzte. Der Halsschild ist fast um die Hälfte kürzer als am Basalrande breit; der letztgenannte gerade abgeschnitten, jederseits schief abgestutzt, innerhalb der Hinterecken flach eingedrückt, etwa dreimal so breit wie der Vorderrand. Die