

ist flach. Die Hemielytren beim ♀ etwas länger als der Hinterkörper.

Long. 3, lat. 1 mm.

Nahe mit *F. variegatus* POPPIUS verwandt, die Farbe ist aber eine andere, die Stirn beim ♀ ist etwas breiter, das zweite Fühlerglied deutlich länger und die Halsschildseiten sind mehr ausgeschweift.

Java: Banjuwangi, MC GILLAVRY, 1 ♀, (Museum Helsingfors).

BRYOCORINAE REUTER

48. *Helopeltis bradyi* WATERHOUSE.

WATERHOUSE, Trans. Ent. Soc. London, 1886, p. 454, T. II, Fig. 1, 2.

Java: Semarang, IX. 1909; Nongkodjadjar, I. 1911, E. JACOBSON; ist bekannt als ein schlimmer Beschädiger der Theeplantagen und ist stellenweise auf Java sehr häufig.

49. *Helopeltis romundei* WATERHOUSE.

WATERHOUSE, l. c., 1888, p. 207.

Java.

50. *Helopeltis elegans* n. sp.

Gelbrot; die Spitze des Coriums bis zum Embolium buckelförmig aufgetrieben, braunschwarz; die Spitze des Hinterkörpers braun; die Füße gelb; das letzte Glied schwarz, das erste Fühlerglied gelbrot; das zweite gelbbraun; das dritte schwarz; das letzte gelbweiss mit schwarzer Basis.

Der Kopf ist fast vertical mit kräftig hervortretendem Clypeus; die der Länge nach gefurchte Stirn etwas mehr wie dreimal so breit wie der Durchmesser des Auges (♂, ♀); die Augen ziemlich klein, hervorspringend. Das Rostrum fast die Mittelhüften erreichend; das erste Glied nicht bis zur Kopfbasis sich erstreckend. Das erste Fühlerglied an der