

67. *Lamprocranium unguiculare* REUTER.

REUTER, Rev. d'Ent., 1891, p. 134.

Java: Tengger-Gebirge, (Museum Helsingfors).

HETEROTOMINAE REUTER.

Div. HETEROTOMARIA REUTER.

68. *Cyrtorrhinus lividipennis* REUTER.

REUTER, Ent. Tidskr. Stockh., 1888, p. 199. — DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 476, fig. 308.

Java: Batavia, 2. VI. 1898, BIRÓ (Museum Hung.); Semarang, III. 1910, E. JACOBSON. — Birma, Ceylon, Nicobaren.

69. *Cyrtorrhinus mundulus* BREDDIN.*Periscopus mundulus* BREDDIN, Deutsche Ent. Zeit., 1896, p. 106. — *Breddiniessa* id. KIRKALDY, Wien. Ent. Zeit., XXII, 1903, p. 13.

Java, (spec. typ. in Museum Hung.).

70. *Pilophorus javanus* n. sp.

Mässig lang; ziemlich anliegend gelblich behaart; Kopf, Halsschild und Schildchen glänzend. Schwarz; der Kopf vorne braun; die Unterseite des Hinterkörpers braunschwarz; das Rostrum und das erste Fühlerglied gelb; die Basis des erstgenannten braun; das erste Fühlerglied und die Basis der zwei letzten Glieder schmal, die Vorder- und die Hinterhüften, sowie die äusserste Spitze der Mittelhüften (die Beine übrigens mutiliert) gelbweis; auf dem Corium eine Querbinde vor und eine andere hinter der Mitte aus silberweissen Schuppen; die hintere Querbinde gerade, sich auf den Clavus fortsetzend; die Membran rauchig braunschwarz, nach der Spitze zu breit heller.

Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen etwas länger